

Prospecto: Información para el usuario

Aciclovir Accord 200 mg comprimidos
Aciclovir Accord 400 mg comprimidos
Aciclovir Accord 800 mg comprimidos
aciclovir

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna pregunta adicional, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solo a usted. No lo pase a otras personas. Puede perjudicarles, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este prospecto. Ver sección 4.

Qué contiene este prospecto

1. Qué es Aciclovir Accord y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Aciclovir Accord
3. Cómo tomar Aciclovir Accord
4. Posibles efectos adversos
5. Cómo conservar Aciclovir Accord
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Aciclovir Accord y para qué se utiliza

Aciclovir Accord contiene la sustancia activa aciclovir. Aciclovir pertenece a un grupo de medicamentos llamados antivirales. Detiene el crecimiento de ciertos virus.

Aciclovir Accord 200 mg y 400 mg se puede utilizar:

- para tratar la varicela y el herpes zóster; en el herpes zóster este medicamento también ayuda a reducir el dolor nervioso que puede permanecer después de que la erupción haya desaparecido;
- para tratar el herpes labial, el herpes genital y otras infecciones causadas por el virus del herpes simple;
- para prevenir la recurrencia del herpes labial, el herpes genital y otras infecciones por el virus del herpes simple después de haberlas tenido;
- para prevenir infecciones por el virus del herpes simple en personas con un sistema inmunológico debilitado, que son menos capaces de combatir infecciones.

Aciclovir Accord 800 mg se puede utilizar:

- para tratar el herpes zóster (herpes zoster);
- para tratar la varicela (varicela);
- para prevenir el herpes zóster y la varicela en personas con un sistema inmunológico gravemente debilitado.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Aciclovir Accord

No tome Aciclovir Accord

- si es alérgico a aciclovir, valaciclovir o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

No tome este medicamento si alguna de las situaciones anteriores le aplica. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico antes de tomar Aciclovir Accord si:

- tiene problemas renales;
- tiene más de 65 años de edad.

Si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted, hable con su médico. Su médico puede necesitar reducir su dosis.

Es importante beber muchos líquidos mientras toma este medicamento.

Si no está seguro de si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted, hable con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Otros medicamentos y Aciclovir Accord

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar otros medicamentos, especialmente:

- probenecid, utilizado para tratar la gota;
- cimetidina, utilizada para tratar las úlceras de estómago;
- micofenolato mofetilo, utilizado para prevenir el rechazo de órganos después de un trasplante;
- valproato y fenitoína, utilizados para tratar la epilepsia (convulsiones);
- teofilina, un medicamento para enfermedades de las vías respiratorias.

Embarazo y lactancia

Este medicamento no se recomienda normalmente durante el embarazo. Si está embarazada, cree que podría estarlo, planea tener un bebé o está amamantando, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. Su médico sopesará los beneficios del tratamiento frente a los posibles riesgos para su hijo.

La sustancia activa de este medicamento puede pasar a la leche materna. Si está amamantando, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

No se sabe si este medicamento afecta la fertilidad en mujeres.

Conducción y uso de máquinas

Algunos efectos secundarios, como la somnolencia, pueden afectar su capacidad para concentrarse y reaccionar. Asegúrese de no estar afectado antes de conducir o manejar maquinaria.

Aciclovir Accord contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por tableta, es decir, esencialmente 'libre de sodio'.

3. Cómo tomar Aciclovir Accord

Tome siempre este medicamento exactamente como su médico le ha indicado. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

Su médico le indicará la dosis correcta para usted, cómo tomar este medicamento y cuánto tiempo tomarlo, dependiendo de:

- el tipo de infección;
- si la infección está siendo tratada o se está previniendo su recurrencia.

La dosis habitual para el tratamiento de infecciones por herpes simple en adultos es de 200 mg, cinco veces al día, con aproximadamente 4 horas entre dosis. No se toma ninguna dosis por la noche. El tratamiento generalmente dura 5 días, pero puede ser más largo en infecciones severas.

Los niños de 2 años en adelante generalmente reciben la misma dosis que los adultos.

La dosis habitual para prevenir la recurrencia de infecciones por herpes simple en adultos es de 200 mg, cuatro veces al día, con aproximadamente 4 horas entre dosis. No se toma ninguna dosis por la noche.

La dosis habitual para el tratamiento de la varicela y el herpes zóster en adultos es de 800 mg, cinco veces al día, con aproximadamente 4 horas entre dosis. No se toma ninguna dosis por la noche. El tratamiento generalmente dura 7 días.

Los niños mayores de 6 años generalmente reciben 800 mg cuatro veces al día; los niños de 2 a 6 años generalmente reciben 400 mg cuatro veces al día; los niños menores de 2 años generalmente reciben 200 mg cuatro veces al día.

Si sus riñones no funcionan correctamente, su médico ajustará su dosis.

Tomar este medicamento

- Tome este medicamento por vía oral.
- Trague las tabletas enteras con abundante agua.
- Intente tomar este medicamento a las mismas horas cada día.
- Tome este medicamento exactamente como le indique su médico o farmacéutico.
- Los pacientes que tienen dificultad para tragar tabletas pueden disolverlas en al menos 50 ml de agua. Revuelva bien antes de beber.

Si toma más Aciclovir Accord del que debería

Este medicamento no suele ser perjudicial a menos que se tomen grandes cantidades durante varios días. Si toma demasiado, informe a su médico. Lleve el paquete con usted.

Si olvida tomar Aciclovir Accord

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si ya casi es hora de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada.

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

Efectos secundarios graves – busque ayuda médica de inmediato

Las reacciones alérgicas graves (anafilaxia) son raras (afectan a menos de 1 de cada 1,000 personas). Los síntomas pueden incluir:

- erupción cutánea con picazón (urticaria);
- hinchazón de los labios, cara, cuello o garganta que causa dificultad para respirar (angioedema);
- presión arterial baja que lleva a desmayos.

Deje de tomar este medicamento y busque ayuda médica de inmediato si experimenta una reacción alérgica.

Efectos secundarios comunes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- dolor de cabeza;
- mareos;
- náuseas o vómitos;
- diarrea;
- dolor de estómago;
- picazón;
- reacción cutánea después de la exposición al sol (fotosensibilidad);
- cansancio;
- fiebre.

Efectos secundarios poco comunes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- urticaria;
- pérdida de cabello.

Efectos secundarios raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas)

- dificultad para respirar;
- resultados anormales en análisis de sangre;

- angioedema;
- niveles elevados de enzimas hepáticas.

Efectos secundarios muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10,000 personas)

- confusión o agitación;
- temblores;
- marcha inestable y falta de coordinación (ataxia);
- habla lenta o arrastrada;
- ver u oír cosas que no están presentes (alucinaciones);
- trastornos psicóticos;
- convulsiones epilépticas;
- somnolencia;
- trastorno cerebral (encefalopatía);
- inconsciencia (coma);
- coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), hepatitis;
- dolor en la parte baja de la espalda o alrededor de los riñones (dolor renal);
- función renal reducida (insuficiencia renal).

Efectos secundarios muy raros detectados en análisis de sangre

- reducción de glóbulos rojos (anemia);
- reducción de glóbulos blancos (leucopenia);
- reducción de plaquetas (trombocitopenia).

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede notificar efectos secundarios a través del Centro de Farmacovigilancia de los Países Bajos Lareb (www.lareb.nl). La notificación de efectos secundarios ayuda a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar Aciclovir Accord

- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Este medicamento no requiere condiciones especiales de almacenamiento.
- No use este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase después de EXP.

No deseche los medicamentos a través de aguas residuales o residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudan a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Qué contiene Aciclovir Accord

- La sustancia activa es aciclovir 200 mg, 400 mg o 800 mg por tableta.

- Los otros ingredientes son celulosa microcristalina (PH 101) (E460), glicolato de almidón sódico (Tipo A), povidona K25 (E1201), sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio (E470b).

Cómo es Aciclovir Accord y contenido del envase

Las tabletas de Aciclovir Accord se suministran en blísteres de PVC/aluminio.

Tamaños de envase:

- 200 mg: 25 y 30 tabletas
- 400 mg: 25, 28, 30, 35 y 60 tabletas
- 800 mg: 25, 30 o 35 tabletas

Es posible que no todos los tamaños de envase estén comercializados.

Descripción de la tableta:

- 200 mg: tabletas redondas, blancas a blanquecinas, con bordes biselados, marcadas con "LG1" en un lado.
- 400 mg: tabletas redondas, blancas a blanquecinas, con bordes biselados, ranuradas, marcadas con "LG" encima de la ranura y "2" debajo.
- 800 mg: tabletas ovaladas, biconvexas, blancas a blanquecinas, ranuradas, marcadas con "LG" y "3".

La línea de ranura es solo para facilitar la deglución y no para dividir la tableta en dosis iguales.

Titular de la Autorización de Comercialización

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Países Bajos

Fabricante

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Lutomska 50
95-200 Pabianice
Polonia

Números de Autorización de Comercialización:

- Aciclovir Accord 200 mg tabletas: RVG 128332
- Aciclovir Accord 400 mg tabletas: RVG 128333
- Aciclovir Accord 800 mg tabletas: RVG 128334

Este medicamento está autorizado en el EEE bajo los siguientes nombres:

Países Bajos: Aciclovir Accord 200/400/800 mg tabletas

Austria: Aciclovir Accord 200/400/800 mg Tablette

Letonia: Aciclovirum Accord 200/400/800 mg tabletas
Lituania: Aciclovirum Accord 200/400/800 mg tabletės
Bulgaria: Aciclovir Accord 400 mg tabletas
Croacia: Aciklovir Accord 200/400 mg tablete
Polonia: Aciclovir Accord

Este prospecto fue aprobado por última vez en julio de 2024.

Transtoyou