

Notice : Information pour l'utilisateur

Aciclovir Accord 200 mg comprimés
Aciclovir Accord 400 mg comprimés
Aciclovir Accord 800 mg comprimés
aciclovir

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut tout effet indésirable possible non mentionné dans cette notice. Voir section 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Aciclovir Accord et dans quel cas est-il utilisé
2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Aciclovir Accord
3. Comment prendre Aciclovir Accord
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aciclovir Accord
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Aciclovir Accord et dans quel cas est-il utilisé

Aciclovir Accord contient la substance active aciclovir. L'aciclovir appartient à un groupe de médicaments appelés antiviraux. Il arrête la croissance de certains virus.

Aciclovir Accord 200 mg et 400 mg peuvent être utilisés :

- pour traiter la varicelle et le zona ; dans le cas du zona, ce médicament aide également à réduire la douleur nerveuse qui peut persister après la disparition de l'éruption cutanée ;
- pour traiter les boutons de fièvre, l'herpès génital et d'autres infections causées par le virus de l'herpès simplex ;
- pour prévenir la récurrence des boutons de fièvre, de l'herpès génital et d'autres infections par le virus de l'herpès simplex après que vous les ayez eues ;
- pour prévenir les infections par le virus de l'herpès simplex chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui sont moins capables de combattre les infections.

Aciclovir Accord 800 mg peut être utilisé :

- pour traiter le zona (herpès zoster) ;
- pour traiter la varicelle (varicella) ;
- pour prévenir le zona et la varicelle chez les personnes dont le système immunitaire est sévèrement affaibli.

2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Aciclovir Accord

Ne prenez pas Aciclovir Accord

- si vous êtes allergique à l'aciclovir, au valaciclovir ou à l'un des autres composants de ce médicament (mentionnés à la section 6).

Ne prenez pas ce médicament si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin avant de prendre Aciclovir Accord si :

- vous avez des problèmes rénaux ;
- vous avez plus de 65 ans.

Si l'un des éléments ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin. Votre médecin pourrait avoir besoin de réduire votre dose.

Il est important de boire beaucoup de liquides pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des éléments ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et Aciclovir Accord

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments, en particulier :

- probénécide, utilisé pour traiter la goutte ;
- cimétidine, utilisée pour traiter les ulcères d'estomac ;
- mycophénolate mofétil, utilisé pour prévenir le rejet d'organes après une transplantation ;
- valproate et phénytoïne, utilisés pour traiter l'épilepsie (convulsions) ;
- théophylline, un médicament pour les maladies des voies respiratoires.

Grossesse et allaitement

Ce médicament n'est généralement pas recommandé pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte, pensez que vous pourriez être enceinte, prévoyez d'avoir un bébé ou allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin évaluera les bénéfices du traitement par rapport aux risques possibles pour votre enfant.

La substance active de ce médicament peut passer dans le lait maternel. Si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

On ne sait pas si ce médicament affecte la fertilité chez les femmes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Certains effets secondaires, tels que la somnolence, peuvent affecter votre capacité à vous concentrer et à réagir. Assurez-vous de ne pas être affecté avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Aciclovir Accord contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Aciclovir Accord

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Votre médecin vous indiquera la dose correcte pour vous, comment prendre ce médicament et combien de temps le prendre, en fonction de :

- le type d'infection ;
- si l'infection est traitée ou prévenue de récurrence.

La dose habituelle pour le traitement des infections à herpès simplex chez les adultes est de 200 mg, cinq fois par jour, avec environ 4 heures entre les doses. Aucune dose n'est prise la nuit. Le traitement dure généralement 5 jours, mais peut être plus long dans les infections sévères.

Les enfants âgés de 2 ans et plus reçoivent généralement la même dose que les adultes.

La dose habituelle pour prévenir la récurrence des infections à herpès simplex chez les adultes est de 200 mg, quatre fois par jour, avec environ 4 heures entre les doses. Aucune dose n'est prise la nuit.

La dose habituelle pour le traitement de la varicelle et du zona chez les adultes est de 800 mg, cinq fois par jour, avec environ 4 heures entre les doses. Aucune dose n'est prise la nuit. Le traitement dure généralement 7 jours.

Les enfants de plus de 6 ans reçoivent généralement 800 mg quatre fois par jour ; les enfants âgés de 2 à 6 ans reçoivent généralement 400 mg quatre fois par jour ; les enfants de moins de 2 ans reçoivent généralement 200 mg quatre fois par jour.

Si vos reins ne fonctionnent pas correctement, votre médecin ajustera votre dose.

Prendre ce médicament

- Prenez ce médicament par voie orale.
- Avalez les comprimés entiers avec beaucoup d'eau.
- Essayez de prendre ce médicament aux mêmes heures chaque jour.
- Prenez ce médicament exactement comme indiqué par votre médecin ou votre pharmacien.

- Les patients qui ont des difficultés à avaler les comprimés peuvent dissoudre les comprimés dans au moins 50 ml d'eau. Remuez bien avant de boire.

Si vous prenez plus d'Aciclovir Accord que vous ne devriez

Ce médicament n'est généralement pas nocif à moins que de grandes quantités ne soient prises sur plusieurs jours. Si vous en prenez trop, informez votre médecin. Emportez l'emballage avec vous.

Si vous oubliez de prendre Aciclovir Accord

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. S'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets secondaires graves – consultez immédiatement un médecin

Les réactions allergiques sévères (anaphylaxie) sont rares (affectant moins de 1 personne sur 1 000). Les symptômes peuvent inclure :

- éruption cutanée prurigineuse (urticaire) ;
- gonflement des lèvres, du visage, du cou ou de la gorge entraînant des difficultés respiratoires (angio-œdème) ;
- baisse de la pression artérielle entraînant des évanouissements.

Arrêtez de prendre ce médicament et consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une réaction allergique.

Effets secondaires fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- maux de tête ;
- vertiges ;
- nausées ou vomissements ;
- diarrhée ;
- douleurs à l'estomac ;
- démangeaisons ;
- réaction cutanée après exposition au soleil (photosensibilité) ;
- fatigue ;
- fièvre.

Effets secondaires peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- urticaire ;
- perte de cheveux.

Effets secondaires rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- difficulté à respirer ;
- résultats anormaux des tests sanguins ;
- angio-œdème ;
- augmentation des niveaux d'enzymes hépatiques.

Effets secondaires très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- confusion ou agitation ;
- tremblements ;
- marche instable et manque de coordination (ataxie) ;
- parole lente ou indistincte ;
- voir ou entendre des choses qui ne sont pas là (hallucinations) ;
- troubles psychotiques ;
- crises d'épilepsie ;
- somnolence ;
- trouble cérébral (encéphalopathie) ;
- perte de conscience (coma) ;
- jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse), hépatite ;
- douleur dans le bas du dos ou autour des reins (douleur rénale) ;
- fonction rénale réduite (insuffisance rénale).

Effets secondaires très rares détectés lors des analyses de sang

- réduction des globules rouges (anémie) ;
- réduction des globules blancs (leucopénie) ;
- réduction des plaquettes (thrombocytopénie).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Cela inclut tout effet secondaire non mentionné dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires via le Centre de Pharmacovigilance des Pays-Bas Lareb (www.lareb.nl). La déclaration des effets secondaires contribue à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Aciclovir Accord

- Conservez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ce médicament ne nécessite pas de conditions de conservation particulières.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.

Ne jetez pas les médicaments dans les eaux usées ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aident à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Aciclovir Accord

- La substance active est l'aciclovir 200 mg, 400 mg ou 800 mg par comprimé.
- Les autres ingrédients sont cellulose microcristalline (PH 101) (E460), glycolate d'amidon sodique (Type A), povidone K25 (E1201), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium (E470b).

Aspect d'Aciclovir Accord et contenu de l'emballage

Les comprimés d'Aciclovir Accord sont fournis en plaquettes thermoformées PVC/aluminium.

Tailles des emballages :

- 200 mg : 25 et 30 comprimés
- 400 mg : 25, 28, 30, 35 et 60 comprimés
- 800 mg : 25, 30 ou 35 comprimés

Toutes les tailles d'emballage peuvent ne pas être commercialisées.

Description des comprimés :

- 200 mg : comprimés ronds, blancs à blanc cassé, avec bords biseautés, marqués « LG1 » sur une face.
- 400 mg : comprimés ronds, blancs à blanc cassé, avec bords biseautés, sécables, marqués « LG » au-dessus de la barre de sécabilité et « 2 » en dessous.
- 800 mg : comprimés ovales, biconvexes, blancs à blanc cassé, sécables, marqués « LG » et « 3 ».

La barre de sécabilité est uniquement pour faciliter l'ingestion et non pour diviser le comprimé en doses égales.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Pays-Bas

Fabricant

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Lutomińska 50
95-200 Pabianice
Pologne

Numéros d'Autorisation de Mise sur le Marché :

- Aciclovir Accord 200 mg comprimés : RVG 128332
- Aciclovir Accord 400 mg comprimés : RVG 128333
- Aciclovir Accord 800 mg comprimés : RVG 128334

Ce médicament est autorisé dans l'EEE sous les noms suivants :

Pays-Bas : Aciclovir Accord 200/400/800 mg comprimés
Autriche : Aciclovir Accord 200/400/800 mg Tablette
Lettonie : Aciclovirum Accord 200/400/800 mg comprimés
Lituanie : Aciclovirum Accord 200/400/800 mg tabletés
Bulgarie : Aciclovir Accord 400 mg comprimés
Croatie : Aciklovir Accord 200/400 mg tablete
Pologne : Aciclovir Accord

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en juillet 2024.

Transtoyou