

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Aciclovir Accord 200 mg tabletten
Aciclovir Accord 400 mg tabletten
Aciclovir Accord 800 mg tabletten
aciclovir

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel, want het bevat belangrijke informatie voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Heeft u nog vragen, stel deze dan aan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, ook al hebben zij dezelfde symptomen als u.
- Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Wat er in deze bijsluiter staat

1. Wat Aciclovir Accord is en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Aciclovir Accord inneemt
3. Hoe neemt u Aciclovir Accord in
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aciclovir Accord
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat Aciclovir Accord is en waarvoor het wordt gebruikt

Aciclovir Accord bevat de werkzame stof aciclovir. Aciclovir behoort tot een groep geneesmiddelen die antivirale middelen worden genoemd. Het stopt de groei van bepaalde virussen.

Aciclovir Accord 200 mg en 400 mg kan worden gebruikt:

- voor de behandeling van waterpokken en gordelroos; bij gordelroos helpt dit geneesmiddel ook om zenuwpijn te verminderen die kan aanhouden nadat de uitslag is verdwenen;
- voor de behandeling van koortslippen, genitale herpes en andere infecties veroorzaakt door het herpes simplex virus;
- om het terugkeren van koortslippen, genitale herpes en andere herpes simplex virusinfecties te voorkomen nadat u ze heeft gehad;
- om herpes simplex virusinfecties te voorkomen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, die minder goed in staat zijn infecties te bestrijden.

Aciclovir Accord 800 mg kan worden gebruikt:

- voor de behandeling van gordelroos (herpes zoster);
- voor de behandeling van waterpokken (varicella);
- om gordelroos en waterpokken te voorkomen bij mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem.

2. Wat u moet weten voordat u Aciclovir Accord inneemt

Neem Aciclovir Accord niet in

- als u allergisch bent voor aciclovir, valaciclovir of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).

Neem dit geneesmiddel niet in als een van de bovenstaande op u van toepassing is. Als u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Praat met uw arts voordat u Aciclovir Accord inneemt als:

- u nierproblemen heeft;
- u ouder bent dan 65 jaar.

Als een van de bovenstaande op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan uw dosis moeten verlagen.

Het is belangrijk om veel vocht te drinken terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Andere geneesmiddelen en Aciclovir Accord

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken, vooral:

- probenecide, gebruikt om jicht te behandelen;
- cimetidine, gebruikt om maagzweren te behandelen;
- mycofenolaatmofetil, gebruikt om orgaanafstoting na transplantatie te voorkomen;
- valproaat en fenytoïne, gebruikt om epilepsie (aanvallen) te behandelen;
- theofylline, een geneesmiddel voor aandoeningen van de luchtwegen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel wordt normaal gesproken niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent, van plan bent een baby te krijgen of borstvoeding geeft, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Uw arts zal de voordelen van de behandeling afwegen tegen de mogelijke risico's voor uw kind.

De werkzame stof van dit geneesmiddel kan in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel de vruchtbaarheid bij vrouwen beïnvloedt.

Autorijden en het gebruik van machines

Sommige bijwerkingen, zoals slaperigheid, kunnen uw vermogen om te concentreren en te reageren beïnvloeden. Zorg ervoor dat u niet beïnvloed bent voordat u gaat autorijden of machines bedient.

Aciclovir Accord bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen in wezen 'natriumvrij'.

3. Hoe Aciclovir Accord in te nemen

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Uw arts zal u de juiste dosis vertellen, hoe u dit geneesmiddel moet innemen en hoe lang u het moet innemen, afhankelijk van:

- het type infectie;
- of de infectie wordt behandeld of wordt voorkomen dat deze terugkeert.

De gebruikelijke dosis voor de behandeling van herpes simplex-infecties bij volwassenen is 200 mg, vijf keer per dag, met ongeveer 4 uur tussen de doses. Er wordt 's nachts geen dosis ingenomen. De behandeling duurt meestal 5 dagen, maar kan langer zijn bij ernstige infecties.

Kinderen van 2 jaar en ouder krijgen meestal dezelfde dosis als volwassenen.

De gebruikelijke dosis om herhaling van herpes simplex-infecties bij volwassenen te voorkomen is 200 mg, vier keer per dag, met ongeveer 4 uur tussen de doses. Er wordt 's nachts geen dosis ingenomen.

De gebruikelijke dosis voor de behandeling van waterpokken en gordelroos bij volwassenen is 800 mg, vijf keer per dag, met ongeveer 4 uur tussen de doses. Er wordt 's nachts geen dosis ingenomen. De behandeling duurt meestal 7 dagen.

Kinderen ouder dan 6 jaar krijgen meestal 800 mg vier keer per dag; kinderen van 2 tot 6 jaar krijgen meestal 400 mg vier keer per dag; kinderen jonger dan 2 jaar krijgen meestal 200 mg vier keer per dag.

Als uw nieren niet goed werken, zal uw arts uw dosis aanpassen.

Dit geneesmiddel innemen

- Neem dit geneesmiddel via de mond in.
- Slik de tabletten heel door met veel water.
- Probeer dit geneesmiddel elke dag op dezelfde tijden in te nemen.
- Neem dit geneesmiddel precies in zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker.
- Patiënten die moeite hebben met het slikken van tabletten kunnen de tabletten oplossen in ten minste 50 ml water. Roer goed voor het drinken.

Als u meer Aciclovir Accord inneemt dan u zou moeten

Dit geneesmiddel is meestal niet schadelijk tenzij grote hoeveelheden gedurende meerdere dagen worden ingenomen. Als u te veel inneemt, vertel het dan aan uw arts. Neem de verpakking mee.

Als u vergeet Aciclovir Accord in te nemen

Als u vergeet een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen – zoek onmiddellijk medische hulp

Ernstige allergische reacties (anafylaxie) zijn zeldzaam (treffen minder dan 1 op de 1.000 mensen). Symptomen kunnen zijn:

- jeukende uitslag (netelroos);
- zwelling van de lippen, het gezicht, de nek of de keel die ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt (angio-oedeem);
- lage bloeddruk die leidt tot flauwvallen.

Stop met het innemen van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als u een allergische reactie ervaart.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 10 mensen treffen)

- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- misselijkheid of braken;
- diarree;
- buikpijn;
- jeuk;
- huidreactie na blootstelling aan zonlicht (fotosensitiviteit);
- vermoeidheid;
- koorts.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 100 mensen treffen)

- netelroos;
- haaruitval.

Zeldzame bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 1.000 mensen treffen)

- ademhalingsmoeilijkheden;
- abnormale bloedtestresultaten;

- angio-oedeem;
- verhoogde leverenzymwaarden.

Zeer zeldzame bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 10.000 mensen treffen)

- verwarring of agitatie;
- tremoren;
- onvast lopen en gebrek aan coördinatie (ataxie);
- langzaam of onduidelijk spreken;
- dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties);
- psychotische stoornissen;
- epileptische aanvallen;
- slaperigheid;
- hersenstoornis (encefalopathie);
- bewusteloosheid (coma);
- vergeling van de huid of ogen (geelzucht), hepatitis;
- pijn in de onderrug of rond de nieren (nierpijn);
- verminderde nierfunctie (nierfalen).

Zeer zeldzame bijwerkingen gedetecteerd in bloedonderzoeken

- verminderde rode bloedcellen (bloedarmoede);
- verminderde witte bloedcellen (leukopenie);
- verminderde bloedplaatjes (trombocytopenie).

Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat alle bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Het melden van bijwerkingen helpt om meer informatie te geven over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Aciclovir Accord

- Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.
- Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld na EXP.

Gooi geneesmiddelen niet weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt, kunt weggooien. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat bevat Aciclovir Accord

- De werkzame stof is aciclovir 200 mg, 400 mg of 800 mg per tablet.
- De andere ingrediënten zijn microkristallijne cellulose (PH 101) (E460), natriumzetmeelglycolaat (Type A), povidon K25 (E1201), colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Aciclovir Accord eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Aciclovir Accord tabletten worden geleverd in PVC/aluminium blisterverpakkingen.

Verpakkingsgroottes:

- 200 mg: 25 en 30 tabletten
- 400 mg: 25, 28, 30, 35 en 60 tabletten
- 800 mg: 25, 30 of 35 tabletten

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Tablet beschrijving:

- 200 mg: witte tot gebroken witte, ronde tabletten met afgeschuinde randen, gemarkeerd met "LG1" aan één kant.
- 400 mg: witte tot gebroken witte, ronde tabletten met afgeschuinde randen, gescoord, gemarkeerd met "LG" boven de breukstreep en "2" eronder.
- 800 mg: witte tot gebroken witte, ovale, biconvexe tabletten, gescoord, gemarkeerd met "LG" en "3".

De breukstreep is alleen om het slikken te vergemakkelijken en niet om de tablet in gelijke doses te verdelen.

Vergunninghouder

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland

Fabrikant

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice
Polen

Vergunningsnummers:

- Aciclovir Accord 200 mg tabletten: RVG 128332
- Aciclovir Accord 400 mg tabletten: RVG 128333
- Aciclovir Accord 800 mg tabletten: RVG 128334

Dit geneesmiddel is in de EER onder de volgende namen toegelaten:

Nederland: Aciclovir Accord 200/400/800 mg tabletten

Oostenrijk: Aciclovir Accord 200/400/800 mg Tablette

Letland: Aciclovirum Accord 200/400/800 mg tabletten

Litouwen: Aciclovirum Accord 200/400/800 mg tabletės

Bulgarije: Aciclovir Accord 400 mg tabletten
Kroatië: Aciklovir Accord 200/400 mg tablete
Polen: Aciclovir Accord

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2024.

Transtoyou