

## Bipacksedel: Information till användaren

Aciclovir Accord 200 mg tabletter  
Aciclovir Accord 400 mg tabletter  
Aciclovir Accord 800 mg tabletter  
aciclovir

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras symtom på sjukdom är desamma som dina.
- Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Vad denna bipacksedel innehåller

1. Vad Aciclovir Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Accord
3. Hur du tar Aciclovir Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aciclovir Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### 1. Vad Aciclovir Accord är och vad det används för

Aciclovir Accord innehåller den aktiva substansen aciklovir. Aciklovir tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det stoppar tillväxten av vissa virus.

Aciclovir Accord 200 mg och 400 mg kan användas:

- för att behandla vattkoppor och bältros; vid bältros hjälper detta läkemedel också till att minska nervsmärta som kan kvarstå efter att utslagen har försvunnit;
- för att behandla munsår, genital herpes och andra infektioner orsakade av herpes simplex-virus;
- för att förhindra återkommande munsår, genital herpes och andra herpes simplex-virusinfektioner efter att du har haft dem;
- för att förhindra herpes simplex-virusinfektioner hos personer med ett försvagat immunsystem, som har svårare att bekämpa infektioner.

Aciclovir Accord 800 mg kan användas:

- för att behandla bältros (herpes zoster);
- för att behandla vattkoppor (varicella);
- för att förhindra bältros och vattkoppor hos personer med ett kraftigt försvagat immunsystem.

### 2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Accord

## Ta inte Aciclovir Accord

- om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något av de andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

## Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Aciclovir Accord om:

- du har njurproblem;
- du är över 65 år gammal.

Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare. Din läkare kan behöva minska din dos.

Det är viktigt att dricka mycket vätska medan du tar denna medicin.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar denna medicin.

## Andra läkemedel och Aciclovir Accord

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel, särskilt:

- probenecid, som används för att behandla gikt;
- cimetidin, som används för att behandla magsår;
- mykofenolatmofetil, som används för att förhindra organavstötning efter transplantation;
- valproat och fenytoin, som används för att behandla epilepsi (anfall);
- teofyllin, ett läkemedel för luftvägssjukdomar.

## Graviditet och amning

Detta läkemedel rekommenderas normalt inte under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid, planerar att skaffa barn eller ammar, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att väga fördelarna med behandlingen mot de möjliga riskerna för ditt barn.

Den aktiva substansen i detta läkemedel kan passera över i bröstmjolk. Om du ammar, fråga din läkare om råd innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar fertiliteten hos kvinnor.

## Körning och användning av maskiner

Vissa biverkningar, såsom dåsighet, kan påverka din förmåga att koncentrera dig och reagera. Se till att du inte är påverkad innan du kör eller använder maskiner.

Aciclovir Accord innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip 'natriumfritt'.

### 3. Hur du tar Aciclovir Accord

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att tala om för dig rätt dos för dig, hur du ska ta detta läkemedel och hur länge du ska ta det, beroende på:

- typen av infektion;
- om infektionen behandlas eller förhindras från att återkomma.

Den vanliga dosen för behandling av herpes simplex-infektioner hos vuxna är 200 mg, fem gånger om dagen, med cirka 4 timmar mellan doserna. Ingen dos tas på natten. Behandlingen varar vanligtvis 5 dagar, men kan vara längre vid svåra infektioner.

Barn över 2 år får vanligtvis samma dos som vuxna.

Den vanliga dosen för att förhindra återkommande herpes simplex-infektioner hos vuxna är 200 mg, fyra gånger om dagen, med cirka 4 timmar mellan doserna. Ingen dos tas på natten.

Den vanliga dosen för behandling av vattkoppor och bältros hos vuxna är 800 mg, fem gånger om dagen, med cirka 4 timmar mellan doserna. Ingen dos tas på natten. Behandlingen varar vanligtvis 7 dagar.

Barn över 6 år får vanligtvis 800 mg fyra gånger om dagen; barn i åldern 2 till 6 år får vanligtvis 400 mg fyra gånger om dagen; barn under 2 år får vanligtvis 200 mg fyra gånger om dagen.

Om dina njurar inte fungerar ordentligt, kommer din läkare att justera din dos.

Ta detta läkemedel

- Ta detta läkemedel genom munnen.
- Svälj tabletterna hela med mycket vatten.
- Försök att ta detta läkemedel vid samma tidpunkter varje dag.
- Ta detta läkemedel exakt enligt anvisningarna från din läkare eller apotekspersonal.
- Patienter som har svårt att svälja tabletter kan lösa upp tabletterna i minst 50 ml vatten. Rör om väl innan du dricker.

Om du tar mer Aciclovir Accord än du borde

Detta läkemedel är vanligtvis inte skadligt om inte stora mängder tas under flera dagar. Om du tar för mycket, tala om för din läkare. Ta med förpackningen.

Om du glömmer att ta Aciclovir Accord

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

#### 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar – sök omedelbart medicinsk hjälp

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) är sällsynta (påverkar färre än 1 av 1 000 personer).

Symtom kan inkludera:

- klåda utslag (nässelutslag);
- svullnad av läppar, ansikte, hals eller svalg som orsakar andningssvårigheter (angioödem);
- lågt blodtryck som leder till svimning.

Sluta ta detta läkemedel och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever en allergisk reaktion.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

- huvudvärk;
- yrsel;
- illamående eller kräkningar;
- diarré;
- magont;
- klåda;
- hudreaktion efter exponering för solljus (fotosensitivitet);
- trötthet;
- feber.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

- nässelutslag;
- håravfall.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

- andningssvårigheter;
- onormala blodprovresultat;
- angioödem;
- förhöjda leverenzymnivåer.

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

- förvirring eller agitation;
- tremor;

- ostadig gång och brist på koordination (ataxi);
- långsam eller sluddrigt tal;
- se eller höra saker som inte finns (hallucinationer);
- psykotiska störningar;
- epileptiska anfall;
- dåsighet;
- hjärnsjukdom (encefalopati);
- medvetslöshet (koma);
- gulning av huden eller ögonen (gulsot), hepatit;
- smärta i nedre delen av ryggen eller runt njurarna (njursmärta);
- nedsatt njurfunktion (njursvikt).

Mycket sällsynta biverkningar upptäckta i blodprover

- minskat antal röda blodkroppar (anemi);
- minskat antal vita blodkroppar (leukopeni);
- minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar via LäkeMedelsverket ([www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)). Rapportering av biverkningar hjälper till att ge mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur Aciclovir Accord ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.
- Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter EXP.

Kassera inte läkemedel via avlopp eller hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Aciclovir Accord innehåller

- Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg eller 800 mg per tablett.
- De övriga ingredienserna är mikrokristallin cellulosa (PH 101) (E460), natriumstärkelseglykolat (Typ A), povidon K25 (E1201), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b).

Hur Aciclovir Accord ser ut och förpackningens innehåll

Aciclovir Accord tablett levereras i PVC/aluminium blisterförpackningar.

Förpackningsstorlekar:

- 200 mg: 25 och 30 tablett

- 400 mg: 25, 28, 30, 35 och 60 tabletter
- 800 mg: 25, 30 eller 35 tabletter

Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs.

**Tablettbeskrivning:**

- 200 mg: vita till benvita, runda tabletter med fasade kanter, märkta "LG1" på ena sidan.
- 400 mg: vita till benvita, runda tabletter med fasade kanter, skårade, märkta "LG" ovanför skåran och "2" nedanför.
- 800 mg: vita till benvita, ovala, bikonvexa tabletter, skårade, märkta "LG" och "3".

Skåran är endast för att underlätta sväljning och inte för att dela tabletten i lika doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.  
Winthontlaan 200  
3526 KV Utrecht  
Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
ul. Lutomierska 50  
95-200 Pabianice  
Polen

Godkännandenummer för försäljning:

- Aciklovir Accord 200 mg tabletter: RVG 128332
- Aciklovir Accord 400 mg tabletter: RVG 128333
- Aciklovir Accord 800 mg tabletter: RVG 128334

Detta läkemedel är godkänt i EES under följande namn:  
Nederländerna: Aciklovir Accord 200/400/800 mg tabletter  
Österrike: Aciklovir Accord 200/400/800 mg Tablette  
Lettland: Aciklovirum Accord 200/400/800 mg tabletter  
Litauen: Aciklovirum Accord 200/400/800 mg tabletės  
Bulgarien: Aciklovir Accord 400 mg tabletter  
Kroatien: Aciklovir Accord 200/400 mg tablete  
Polen: Aciklovir Accord

Denna bipacksedel godkändes senast i juli 2024.