

Prospecto: información para el usuario

Crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g, crema aciclovir

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Este medicamento se puede obtener sin receta. Pero úselo con cuidado para obtener el mejor resultado.

- Conserve este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
- ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con su farmacéutico.
- ¿Su problema no mejora después de 10 días, o incluso empeora? Entonces, póngase en contacto con su médico.
- ¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es la crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g y para qué se utiliza?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es la crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g y para qué se utiliza?

La crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g contiene aciclovir, un medicamento contra los virus del herpes y previene la multiplicación de los virus del herpes en la piel.

La crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g se utiliza para el tratamiento del herpes labial causado por un virus del herpes.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

- Si es alérgico a la sustancia activa aciclovir, valaciclovir, propilenglicol o a cualquiera de los otros componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Al aplicar la crema. Evite cualquier contacto con las membranas mucosas, como la boca, el ojo o la vagina, ya que podría causar irritación.

Debe evitarse la administración accidental en el ojo.

Si tiene un sistema inmunológico gravemente comprometido (por ejemplo, si es paciente con SIDA o si es receptor de un trasplante de médula ósea). Es posible que deba ser tratado con tabletas de Aciclovir. Consulte a su médico sobre el tratamiento de cualquier infección.

El excipiente propilenglicol puede causar irritaciones en la piel y el excipiente alcohol cetílico puede causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, dermatitis de contacto).

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

¿Está usando otros medicamentos?

No se conocen interacciones con otros medicamentos.

¿Está usando además de Koortslipcrème HTP Aciclovir 50 mg/g otros medicamentos, lo ha hecho recientemente o existe la posibilidad de que use otros medicamentos en un futuro cercano? Informe a su médico o farmacéutico.

Embarazo y lactancia

Embarazo

No se esperan efectos perjudiciales para su salud o la de su hijo no nacido al usar este medicamento durante el embarazo.

Lactancia

Si está amamantando, solo debe usar este medicamento después de consultar con el médico. La sustancia activa se excreta en la leche materna. Sin embargo, la cantidad que los bebés pueden ingerir es insignificante.

Debido al riesgo de contagio del bebé, debe tener especial cuidado al amamantar durante un brote de herpes labial. Dado que el sistema inmunológico de los bebés aún no está completamente desarrollado, las infecciones por herpes pueden ser muy severas en ellos. Por lo tanto, es muy importante lavarse las manos de antemano y usar una mascarilla durante la alimentación y el cuidado de su bebé. Las mismas reglas se aplican a su pareja y familiares.

¿Está embarazada, cree que podría estarlo, desea quedar embarazada o está amamantando?

Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Capacidad para conducir y uso de máquinas

Hasta donde se sabe, este medicamento no afecta la capacidad para conducir o usar máquinas.

Crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g contiene propilenglicol

Este medicamento contiene 150 mg de propilenglicol por gramo de crema. El propilenglicol puede causar irritación en la piel. No use este medicamento en recién nacidos menores de 4 semanas con heridas abiertas o grandes superficies de piel dañada (como quemaduras) sin consultar primero a su médico o farmacéutico.

Crema para herpes labial HTP Aciclovir 50 mg/g contiene alcohol cetílico

El alcohol cetílico puede causar reacciones locales en la piel (por ejemplo, dermatitis de contacto).

3. ¿Cómo usar este medicamento?

Cuando note que partes de sus labios se vuelven dolorosas, insensibles, arden o pican, estos son signos precursores de ampollas de herpes labial. Si sufre regularmente de ampollas de herpes labial, reconocerá estos signos y podrá sentir que se avecina un brote. Aplique la crema de Aciclovir en estas ampollas lo antes posible según la prescripción. Sin embargo, el tratamiento también puede iniciarse en una fase posterior.

Use este medicamento siempre exactamente como se describe en este prospecto o como le haya indicado su médico o farmacéutico. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Dosificación

Adultos y niños

Aplique la crema cinco veces al día con intervalos de aproximadamente 4 horas. No es necesario aplicar crema por la noche.

Comience el tratamiento lo antes posible al inicio del herpes labial. Continúe el tratamiento durante al menos 4 días. Si la curación no es completa después de diez días desde el inicio del tratamiento, se le aconseja consultar a un médico.

Modo de uso

- Aplique la crema de Aciclovir exprimiendo un poco de crema en la punta de su dedo y luego aplíquela en las áreas afectadas. Las áreas afectadas son aquellas, incluso de los labios, donde la infección está activa, es decir, donde las ampollas van a aparecer o ya han aparecido.
- Para evitar la transmisión del virus a otras partes del cuerpo (por ejemplo, los ojos) o a otras personas (por ejemplo, al besar), es importante evitar tocar las ampollas tanto como sea posible y lavarse las manos después de haber tocado las ampollas.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

Si ha usado demasiado de este medicamento, probablemente no experimentará efectos no deseados.

¿Olvidó usar este medicamento?

Aplique este medicamento de todos modos y continúe con el tratamiento como se indica arriba.

Si deja de usar este medicamento

Puede dejar de usar este medicamento sin consecuencias adversas.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

Un efecto secundario ocurre con más frecuencia que otro. Por eso, los efectos secundarios a continuación se dividen en las siguientes categorías:

Muy frecuentes: ocurren en más de 1 de cada 10 usuarios Frecuentes: ocurren en menos de 1 de cada 10 usuarios A veces: ocurren en menos de 1 de cada 100 usuarios Raras: ocurren en menos de 1 de cada 1000 usuarios Muy raras: ocurren en menos de 1 de cada 10,000 usuarios

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

A veces

- Sensación leve de ardor o escozor en el lugar de aplicación
- Una forma leve de piel seca o descamación
- Picazón

Rara vez

- Enrojecimiento de la piel
- Inflamación de la piel por hipersensibilidad al aciclovir o a uno de los demás componentes de la crema
- Trastornos del sistema inmunológico

Muy rara vez

- Reacción de hipersensibilidad incluyendo angioedema (acumulación repentina de líquido en la piel y mucosas (por ejemplo, garganta o lengua), dificultades respiratorias y/o picazón y erupción cutánea, a menudo como reacción alérgica).

Si se presentan dificultades respiratorias, suspenda el uso de la crema de Aciclovir y contacte inmediatamente a su médico.

- Erupción cutánea con picazón intensa (urticaria) y formación de ronchas (habones) (urticaria)

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, contacte a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través del Centro de Efectos Secundarios de los Países Bajos Lareb, sitio web: www.lareb.nl. Al informar de los efectos secundarios, puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 25°C. No conservar en el refrigerador o congelador.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad. Esta se encuentra en la caja o el tubo después de "No usar después de" o "EXP". Se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.

Después de abrir el tubo, este medicamento es válido por 12 meses.

No tire los medicamentos por el desagüe o en el inodoro y no los deseche en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Serán destruidos de manera responsable y no llegarán al medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional ¿Qué sustancias contiene este medicamento?

- El principio activo de este medicamento es aciclovir. Un gramo de crema contiene 50 mg de aciclovir.

- Los otros componentes de este medicamento son: PEG-5-estearato de glicerol, dimeticona, alcohol cetílico, parafina líquida, vaselina, propilenglicol (E1520), agua purificada.

¿Cómo se presenta la Crema para Herpes Labial HTP Aciclovir 50 mg/g y cuánto contiene un envase? La Crema para Herpes Labial HTP Aciclovir 50 mg/g es un medicamento en forma de crema blanca a blanquecina.

La Crema para Herpes Labial HTP Aciclovir 50 mg/g se suministra en un tubo de aluminio con tapón de polietileno. Los tubos contienen 2 o 3 gramos de crema.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Países Bajos

Fabricante

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Países Bajos

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Alemania

Inscrito en el registro bajo:

RVG 21578=21247 Crema para Herpes Labial HTP Aciclovir 50 mg/g, crema

Este prospecto fue aprobado por última vez en abril de 2021