

## Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g, voide asikloviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman reseptiä. Käytä sitä kuitenkin huolellisesti, jotta saat parhaan tuloksen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä apteekkiisi.
- Jos oireesi eivät lieydy 10 päivän kuluessa tai ne pahenevat, ota yhteyttä lääkäriisi.
- Jos saat jonkin haittavaikutuksen, joka mainitaan kohdassa 4, tai haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### 1. Mitä Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g on ja mihin sitä käytetään?

Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g sisältää asikloviiria, joka on herpesviruksia vastaan ja estää herpesvirusten lisääntymistä ihosta.

Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g käytetään herpesviruksen aiheuttaman huuliherpeksen hoitoon.

### 2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- Jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle asikloviiri, valasikloviiri, propyleeniglykoli tai jollekin muulle tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.

Milloin sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Kun levität voidetta. Vältä kosketusta limakalvojen, kuten suun, silmän tai emättimen kanssa, koska se voi aiheuttaa ärsytystä.

Tahaton annostelu silmään on vältettävä.

Jos sinulla on vakavaheikentynyt immuunijärjestelmän toiminta (esimerkiksi jos olet AIDS-potilas tai jos olet luuydinsiirteen vastaanottaja). Saatat tarvita hoitoa asikloviiritableteilla.

Keskustele lääkärisi kanssa jokaisen infektion hoidosta.

Apuaine propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä ja apuaine setyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketushottumaa).

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Muita lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Käytätkö Herpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tämän lääkkeen käytön aikana raskauden aikana ei odoteta haitallisia vaikutuksia sinun tai syntymättömän lapsesi terveyteen.

Imetys

Jos imetät, voit käyttää tätä lääkettä vain lääkärin kanssa neuvoteltuasi. Vaikuttava aine erittyy äidinmaitoon. Kuitenkin määrä, jonka vauvat voivat saada, on merkityksetön.

Koska vauvan tartuntariski on olemassa, sinun tulee olla erityisen varovainen imettäessäsi huuliherpeksen aikana. Koska vauvojen immuunijärjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt, herpesinfektiot voivat olla heillä erittäin voimakkaita. On siis erittäin tärkeää pestä kädet etukäteen ja käyttää kasvomaskia imettäessäsi ja hoitaessasi vauvaasi. Samat säännöt koskevat kumppaniasi ja perheenjäseniäsi.

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajokyky ja koneiden käyttö

Tämänhetkisten tietojen mukaan tällä lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääke sisältää 150 mg propyleeniglykolia per gramma voidetta. Propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä. Älä käytä tätä lääkettä vastasyntyneille, jotka ovat alle 4 viikon ikäisiä ja joilla on avoimia haavoja tai laajoja vaurioituneita ihoalueita (kuten palovammoja) ilman, että ensin neuvottelet lääkärisi tai apteekkisi kanssa.

Huuliherpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g sisältää setyylialkoholia

Setyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten käytät tätä lääkettä?

Kun huomaat, että huuliesi osat ovat kipeitä, tunnottomia, kuumottavat tai kutisevat, nämä ovat huuliherpeksen esioireita. Jos sinulla on säännöllisesti huuliherpestä, tunnistat nämä merkit ja voit tuntea hyökkäyksen tulevan. Levitä sitten mahdollisimman pian näille rakkuloille Asikloviiri-voidetta ohjeen mukaan. Hoito voidaan kuitenkin aloittaa myös myöhemmässä vaiheessa.

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkärisi tai apteekkisi on kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Annostus

## Aikuiset ja lapset

Levitä voidetta viisi kertaa päivässä noin 4 tunnin välein. Yöllä ei tarvitse levittää voidetta.

Aloita hoito mahdollisimman pian huuliherpeksen alkaessa. Jatka hoitoa vähintään 4 päivää. Jos parantuminen ei ole täydellistä kymmenen päivän kuluttua hoidon alusta, on suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen.

## Käyttötapa

- Levitä Asikloviiri-voidetta puristamalla hieman voidetta sormenpäähän ja levittämällä se sitten vaurioituneille alueille. Vaurioituneet alueet ovat niitä, myös huulilla, joissa infektio on aktiivinen, eli joissa rakkuloita on muodostumassa tai jo ilmestynyt.
- Viruksen leviämisen estämiseksi muihin kehon osiin (esim. silmiin) tai muihin henkilöihin (esim. suudellessa) on tärkeää välttää rakkuloiden koskettamista mahdollisimman paljon ja pestä kädet rakkuloiden koskettamisen jälkeen.

## Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Jos käytät tätä lääkettä liikaa, et todennäköisesti koe ei-toivottuja vaikutuksia.

## Unohditko käyttää tätä lääkettä?

Levitä tämä lääke silti ja jatka hoitoa yllä kuvatulla tavalla.

## Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Voit lopettaa tämän lääkkeen käytön ilman haitallisia seurauksia.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

## 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan.

Yksi haittavaikutus on yleisempi kuin toinen. Siksi alla olevat haittavaikutukset on jaettu seuraaviin luokkiin:

Hyvin yleinen: esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä Yleinen: esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä  
Joskus: esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta Harvinainen: esiintyy alle 1 käyttäjällä 1000:sta  
Hyvin harvinainen: esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta

## Iho- ja ihonalaiset sairaudet

### Joskus

- Lievä polttava tai pistävä tunne levityskohdassa
- Lievä kuivan ihon tai hilseilyn muoto
- Kutina

### Harvoin

- Ihon punoitus
- Ihon tulehdus yliherkkyyden vuoksi asikloviirille tai jollekin muulle voiteen ainesosalle
- Immuunijärjestelmän häiriöt

### Hyvin harvoin

- Yliherkkyysoireet, mukaan lukien angioedeema (äkillinen nesteen kertyminen ihoon ja limakalvoihin (esim. kurkku tai kieli), hengitysvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma, usein allergisena reaktiona).

Jos hengitysvaikeuksia ilmenee, lopeta asikloviirivoiteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

- Ihottuma, johon liittyy voimakasta kutinaa (nokkosihottuma) ja paukamien muodostumista (urtikaria)

#### Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, verkkosivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi). Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

#### 5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Säilytä alle 25°C. Ei saa säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta tai tuubista merkinnän "Ei saa käyttää jälkeen" tai "EXP" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Tuubin avaamisen jälkeen tämä lääke on käyttökelpoinen 12 kuukautta.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekistasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, eivätkä ne päädy ympäristöön.

#### 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Vaikuttava aine tässä valmisteessa on asikloviiri. Yksi gramma voidetta sisältää 50 mg asikloviiria.
- Muut aineet tässä valmisteessa ovat: PEG-5-glyserolistearaatti, dimetikoni, setyylialkoholi, nestemäinen parafiini, vaseliini, propyleeniglykoli (E1520), puhdistettu vesi.

Miltä Herpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Herpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g on lääkevalmiste valkoisena tai murtovalkoisena voiteena.

Herpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g toimitetaan alumiiniputkessa, jossa on polyeteenikorkki.

Putket sisältävät 2 tai 3 grammaa voidetta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Alankomaat

Valmistaja

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Alankomaat

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel Saksa

Rekisteröity seuraavasti:  
RVG 21578=21247 Herpesvoide HTP Asikloviiri 50 mg/g, voide

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty huhtikuussa 2021

Transtoyou