

Notice : information pour l'utilisateur

Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g, crème aciclovir

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance. Mais utilisez-le avec soin pour obtenir le meilleur résultat.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre pharmacien.
- Votre symptôme ne s'améliore pas après 10 jours, ou s'aggrave-t-il ? Contactez alors votre médecin.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable non mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que la Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables possibles
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que la Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g et dans quel cas est-elle utilisée ?

La Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g contient de l'aciclovir, un agent contre les virus de l'herpès, et empêche la multiplication des virus de l'herpès dans la peau.

La Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g est utilisée pour le traitement d'un bouton de fièvre causé par un virus de l'herpès.

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ?

- Si vous êtes allergique à la substance active aciclovir, valaciclovir, propylène glycol ou à l'un des autres composants de ce médicament. Vous trouverez ces substances à la rubrique 6.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?

Lors de l'application de la crème. Évitez tout contact avec les muqueuses, comme la bouche, l'œil ou le vagin, car cela pourrait provoquer une irritation.

L'administration involontaire dans l'œil doit être évitée.

Si vous avez une réaction sévère La substance auxiliaire propylène glycol peut provoquer des irritations cutanées et la substance auxiliaire alcool cétylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, une dermatite de contact).
Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Utilisez-vous d'autres médicaments?

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue.
Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue.
Utilisez-vous d'autres médicaments en plus de Crème pour l'Herpès Labial HTP Aciclovir 50 mg/g, en avez-vous utilisé récemment ou est-il possible que vous utilisiez d'autres médicaments dans un avenir proche ? Informez-en alors votre médecin ou pharmacien.

Grossesse

Grossesse

Lors de l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse, aucun effet nocif sur votre santé ou celle de votre enfant à naître n'est à prévoir.

Allaitement

Si vous allaitez, vous ne devez utiliser ce médicament qu'après consultation avec le médecin. La substance active est excrétée dans le lait maternel. Cependant, la quantité que les bébés peuvent ainsi ingérer est négligeable.
En raison du risque de contamination du bébé, vous devez faire particulièrement attention lors de l'allaitement pendant une poussée d'herpès labial. Comme le système immunitaire des bébés n'est pas encore complètement développé, les infections herpétiques peuvent être très sévères chez eux. Il est donc très important de se laver les mains à l'avance et de porter un masque pendant l'alimentation et les soins de votre bébé. Les mêmes règles s'appliquent à votre partenaire et aux membres de votre famille.

Êtes-vous enceinte, pensez-vous l'être, souhaitez-vous le devenir ou allaitez-vous ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Autant que l'on sache, ce médicament n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g contient du propylène glycol
Ce médicament contient 150 mg de propylène glycol par gramme de crème. Le propylène glycol peut provoquer une irritation cutanée. N'utilisez pas ce médicament chez les nouveau-nés de moins de 4 semaines avec des plaies ouvertes ou de grandes surfaces cutanées endommagées (comme des brûlures) sans d'abord consulter votre médecin ou pharmacien.

Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g contient de l'alcool cétylique
L'alcool cétylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, une dermatite de contact).

3. Comment utiliser ce médicament ?

Lorsque vous remarquez que certaines parties de vos lèvres deviennent douloureuses, engourdies, brûlantes ou démangent, ce sont des signes avant-coureurs de boutons de fièvre. Si vous souffrez régulièrement de boutons de fièvre, vous reconnaîtrez ces signes et pourrez sentir l'attaque arriver. Appliquez alors la crème Aciclovir sur ces boutons dès que possible selon la prescription. Cependant, le traitement peut également être commencé à un stade ultérieur.

Utilisez toujours ce médicament exactement comme décrit dans cette notice ou comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Posologie

Adultes et enfants

Appliquez la crème cinq fois par jour à des intervalles d'environ 4 heures. La nuit, vous n'avez pas besoin d'appliquer de crème.

Commencez le traitement dès que possible au début du bouton de fièvre. Poursuivez le traitement pendant au moins 4 jours. Si la guérison n'est pas complète après dix jours, à compter du début du traitement, il est conseillé de consulter un médecin.

Mode d'emploi

- Appliquez la crème Aciclovir en pressant un peu de crème sur le bout de votre doigt et en l'appliquant ensuite sur les zones affectées. Les zones affectées sont celles, y compris des lèvres, où l'infection est active, c'est-à-dire où des boutons vont apparaître ou sont déjà apparus.
- Pour éviter la transmission du virus à d'autres parties du corps (par exemple, les yeux) ou à d'autres personnes (par exemple, par un baiser), il est important d'éviter autant que possible de toucher les boutons et de se laver les mains après avoir touché les boutons.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Si vous avez utilisé trop de ce médicament, vous ne ressentirez probablement pas d'effets indésirables.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

Appliquez ce médicament quand même et continuez le traitement comme indiqué ci-dessus.

Si vous arrêtez d'utiliser ce médicament

Vous pouvez arrêter d'utiliser ce médicament sans conséquences néfastes.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Un effet indésirable est plus fréquent qu'un autre. C'est pourquoi les effets indésirables ci-dessous sont répartis dans les catégories suivantes :

Très fréquent : surviennent chez plus de 1 utilisateur sur 10
Fréquent : surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10
Parfois : surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 100
Rare : surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 1 000
Très rare : surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10 000

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Parfois

- Sensation légère de brûlure ou de picotement au site d'application
- Une forme légère de peau sèche ou de desquamation
- Démangeaisons

Rarement

- Rougeur de la peau
- Inflammation de la peau due à une hypersensibilité à l'aciclovir ou à l'un des autres composants de la crème
- Affections du système immunitaire

Très rarement

- Réaction d'hypersensibilité incluant un angio-œdème (accumulation soudaine de liquide dans la peau et les muqueuses (par exemple, gorge ou langue), difficultés respiratoires et/ou démangeaisons et éruptions cutanées, souvent en tant que réaction allergique).

En cas de difficultés respiratoires, arrêtez d'utiliser la crème d'Aciclovir et contactez immédiatement votre médecin.

- Éruption cutanée avec démangeaisons intenses (urticaire) et formation de bosses (papules) (urticaire)

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets indésirables possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web : www.lareb.nl. En signalant les effets indésirables, vous nous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à une température inférieure à 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur ou au congélateur.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Elle est indiquée sur la boîte ou le tube après "Ne pas utiliser après" ou "EXP". Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Après ouverture du tube, ce médicament est valable 12 mois.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Ils seront alors détruits de manière responsable et ne se retrouveront pas dans l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations Quelles substances contient ce médicament ?

- La substance active de ce médicament est l'aciclovir. Un gramme de crème contient 50 mg d'aciclovir.
- Les autres substances de ce médicament sont : PEG-5-stéarate de glycérol, diméthicone, alcool cétyle, paraffine liquide, vaseline, propylène glycol (E1520), eau purifiée.

À quoi ressemble la Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g et combien y en a-t-il dans un emballage ? La Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g est un médicament sous forme de crème blanche à blanc cassé.

La Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g est fournie dans un tube en aluminium avec un bouchon en polyéthylène. Les tubes contiennent 2 ou 3 grammes de crème.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Pays-Bas

Fabricant

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Pays-Bas

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Allemagne

Enregistré sous :

RVG 21578=21247 Crème pour bouton de fièvre HTP Aciclovir 50 mg/g, crème

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en avril 2021