

Kasutusjuhend: Teave patsientidele

Advantan 0,1 % kreem

Metüülprednisoloonatseponaat

Lugege see pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet.

- Hoidke infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.
- See ravim on teile isiklikult välja kirjutatud. Ärge andke seda teistele. See võib teistele inimestele kahju teha, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kui te märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida ei ole selles pakendi infolehes nimetatud. Vt lõik 4. Mis on selles pakendi infolehes

Mis on selles pakendi infolehes kirjas

1. Mis on Advantan 0,1 % kreem ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peaksite teadma enne Advantan 0,1 % kreemi kasutamist?
3. Kuidas Advantan 0,1 % kreemi kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed võivad esineda? Kuidas Advantan 0,1 % kreemi säilitada? Pakendi sisu ja lisainformatsioon
5. Pakendi sisu ja muu teave

1. ,1,1 % kreem ja milleks seda kasutatakse?

Advantan 0,1 % kreem sisaldab toimeainet metüülprednisoloonatseponaat. Advantan 0,1 % kreem on ravim põletike raviks (kortikosteroid), mis on mõeldud nahale kandmiseks.

Advantan 0,1 % kreemi kasutatakse endogeense ekseemi (atoopiline dermatiit, neurodermatiit), kontaktdermatiidi, degeneratiivse ekseemi ja nummulaarse ekseemi korral.

2. Mida peaksite teadma enne Advantan 0,1 % kreemi kasutamist?

Advantan 0,1 % kreemi ei tohi kasutada

- kui olete allergiline metüülprednisoloonatseponaadi või lõigus 6. nimetatudmuude selle ravimi koostisosade suhtes. kui teil esinevad järgmised haigused:
- tuberkuloossed või süfiliitilised protsessid
 - tuberkuloossed või süfiliitilised protsessid
 - Viirusnakkused (nt herpes, tuulerõuged (varicella))
 - punane või roosakas nahapõletik (rosaatsea)
 - põletikud suuümbruse nahal (perioraalne dermatiit)
 - haavandid (ulcus)
 - tavaline akne
 - naha hõrenemine (atroofiline nahahaigus)
 - vaktsiinireaktsioonid ravipiirkonnas
 - nahainfektsioonid bakterite või seente poolt (vt hoiatused ja ettevaatusabinõud) ja ettevaatusabinõud)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun rääkige oma arsti või apteekriga enne, kui kasutate Advantan 0,1 % kreemi.

Võtke Advantan 0 kasutamisel erimeetmeid, 1 % kreemi, kui teie arst on tuvastanud kaasneva nahainfektsiooni bakterite ja/või seente poolt. Siis peate samuti kasutama selle infektsiooni jaoks välja kirjutatud ravimeid, vastasel juhul võib teie infektsioon süveneda.

Põletikuvastased ravimid (kortikosteroidid), kuhu kuulub ka toimeaine metüülprednisoloonatseponaat Advantan 0,1 % kreemis, omavad tugevat mõju kehale. Seetõttu ei soovitata Advantan 0,1 % kreemi suurtele nahapindadele või pikema aja jooksul kasutada, kuna see suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski.

Kõrvaltoimete riski vähendamiseks:

- Kasutage Advantan 0,1 % kreemi nii säästlikult kui võimalik, eriti lastel.
- Kasutage Advantan 0,1 % kreemi ainult nii kaua, kui see on absoluutselt vajalik, et ravida oma nahahaigust.
- Advantan 0,1 % kreem ei tohi sattuda silma, sügavatesse avatud haavadesse ega limaskestadele.
- Advantan 0,1 % kreemi ei tohiks kasutada õhu- ja veekindlate materjalide all, kui arst pole seda määranud. Nende hulka kuuluvad näiteks sidemed, tihedalt istuvad sidemed või kitsas riietus ning mähkmed.

Kohalikud nahainfektsioonid võivad paiksete kortikosteroidide kasutamisel tugevneda.

WiNagu kõigi teiste kortikosteroidide puhul, võib Advantan 0,1% kreemi kasutamine muudel kui ettenähtud haigustel varjata nende tunnuseid (sümptomeid) ning takistada õiget diagnoosi ja ravi.

Nagu on teada sisemiselt manustatud (süsteemsete) kortikosteroidide puhul, võib ka paiksete kortikosteroidide kasutamisel tekkida roheline kae (glaukoom) (nt pärast kõrge doosilist või ulatuslikku kasutamist pikema aja jooksul, pärast oklusioonisidemete kasutamist või pärast kasutamist silmade lähedal nahal).

Lapsed ja noorukid

Kasutage nii vähe Advantan 0,1 % kreemi kui vajalik, et vältida kõrvaltoimeid. Advantan 0,1% kreemi ei tohiks kasutada õhu- ja veekindlate materjalide, nt mähkmete all.

Advantan 0,1 % kreemi ei soovitata kasutada alla 3-aastastel lastel, kuna puuduvad andmed ohutuse kohta.

Advantan 0,1 % kreemi kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoime Advantan 0,1% kreemi koostoime teiste ravimitega ei ole seni teada.

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate/kasutate teisi ravimeid, olete hiljuti võtnud/kasutanud teisi ravimeid või kavatsete võtta/kasutada teisi ravimeid. ravimeid võtta/kasutada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase või toidate last rinnaga või kui kahtlustate, et olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. selle ravimi kasutamist oma arsti või apteekriga. Advantan 0,1% kreemi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Loomkatsetes näitas Advantan 0,1% kreemi toimeaine (metüülprednisoloonatseponaat) lootele kahjulikku toimet. seedimist soodustav toime.

Suulaelõhede tekkeks vastsündinutel. Raseduse esimese 3 kuu jooksul ei tohiks üldiselt kasutada kortikosteroide sisaldavaid preparaate välispidiseks kasutamiseks.

Rasedad ja imetavad naised peaksid Advantan 0 rasedad ja imetavad naised peaksid Advantan 0% kreemi kasutama ainult pärast arsti hoolikat riski-kasu hindamist. Advantan Okasutada ainult pärast arsti hoolikat riski-kasu hindamist.

% kreemi, 1 % kreemi ei tohi kasutada suurematel aladel, pikema aja jooksul ega sideme all (oklusiivsed tingimused), kuna see võib põhjustada koormust sündimata lapsele. Koormus, sündinud lapsele viia. % kreemi kasutada rindade piirkonnas. Eriti ei tohi rinnaga toitmise ajal kasutada Advantan 01 % kreemi suurematel aladel, pikema aja jooksul ega sideme all (oklusiivsed tingimused). Puuduvad andmed metüülprednisoloonatseponaadi mõju kohta viljakusele. Liiklusohutus ja masinate käsitlemise võime ei ole teada. Kasutamine raseduse ajal peab toimuma ainult arsti järelevalve all. Kreemi ei tohi kasutada silmade ümbruses. Kreemi ei tohi alla neelata.

Kreemi tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Kreemi ei tohi kasutada, kui olete allergiline mõne koostisosa suhtes. Kreemi ei tohi kasutada kahjustatud nahal.

Kreemi ei tohi kasutada koos teiste paiksete kortikosteroididega.

Advantan 0,1 % kreem eimõjuta autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

Olulised andmed teatudmuude koostisosade kohta
Advantan 0,1 % kreem

Advantan 0,1 % kreemis sisalduvad muud koostisosad, nagu tsetüülstearüülalkohol ja butüülhüdrosütolueen, võivad põhjustada kohalikku nahka ärritust (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdrosütolueen võib lisaks põhjustada silmade ja limaskestade ärritust. õli ja butüülhüdrosütolueen võivad kohapeal piiratud nahärritusi (nt kontaktdermatiit) esile kutsuda. Butüülhüdrosütolueen võib lisaks põhjustada silmade ja limaskestade ärritust.

3. ,1% kreemi kasutada? Kasutage

Kasutage võtke seda ravimit alati täpselt vastavalt oma arsti juhistele või Küsige oma arstilt või apteekrilt, kui te pole kindel.

Kui arst ei ole teisiti määranud, Advantan 0,1 % kreemi kasutatakse üks kord päevas.

Advantan 0,1 % kreemi kantakse õhukese kihina kahjustatud nahapiirkondadele ja hõõrutakse kergelt sisse.

Kasutusaeg ei tohiks üldiselt ületada 6 nädalat täiskasvanutel ja 3 nädalat üle 3-aastastel lastel.

Kui Advantan 0,1% kreemi pikaajalisel kasutamisel nahk liiga kuivaks muutub, tuleks üle minna suurema rasvasisaldusega preparaadile (Advantan salv või rasvasalv). Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on tunne, et

Advantan 0 Advantani toime 0% kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk. Kasutamine lastel ja noorukitel

Advantan 0

Advantan 0,1 % kreemi ei soovitata kasutada alla 3-aastastel lastel andmete puudumise tõttu ohutuse kohta.

Lastele Advantan 0,1 % kreemi kasutamisel üle 3-aastastel lastel ei ole vaja annust kohandada. Üldiselt ei tohiks kasutusaeg lastel ületada 3 nädalat.

Kui olete kasutanud suuremat kogust Advantan 0,1 % kreemi, kui peaksite kasutanud, kui peaksite

Kui olete unustanud Advantan O ulatuslik kasutamine soodsates tingimustes naha imendumiseks) või juhuslik allaneelamine.

% kreemi kasutamise Kui olete eelneva kasutamise unustanud, ärge kandke suuremat kogust Advantan 0

Kui unustasite eelneva manustamise, ärge kandke topeltannust. % kreemi kui tavaliselt, vaid jätkake ravi, nagu arstiga kokku lepitud. Kui olete unustanud Advantan 0 % kreemi nagu tavaliselt, vaid jätkake ravi vastavalt arsti juhistele.

Kui te kasutate Advantan 0,1 % kreemi katkestada

Kui lõpetate Advantan 0,1 % kreemi ravi enneaegselt, võib see põhjustada haiguse süvenemist. Seetõttu rääkige oma arstiga, enne kui katkestate või lõpetate ravi omal algatusel.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse järgmisi sageduse määratlusi :

Sage: võib kuni 1-l 10-st ravitavast esineda.

Aeg-ajalt: võib kuni kuni 1-l 100-st ravitavast.

Harva: võib kuni kuni 1-l 1000-st ravitavast.

Teadmata: sagedust olemasolevate andmete alusel ei saa hinnata.

Sageli võib Advantan 0,1% kreemi kasutamisel esineda põletustunne ja sügelus manustamiskohas.

Aeg-ajalt võib esineda ülitundlikkust toimeaine suhtes ja kohalikke kaasnevaid nähtusi nagu naha kuivus, naha punetus, villid, karvanääpsupõletik (follikuliit), lööve ja naha tundlikkuse häired (paresteesiad).

Harva võib esineda pustuloosne lööve (püodermia), nahalõhed, naha veresoonte laienemine (teleangiiektaasiad), naha õhenemine (naha atroofia), nahaseeneinfektsioon, akne ja manustamiskoha piirkonnas tselluliit, turse ja nahaärritus.

Teadmata sagedus: võib esineda venitusarme (striiad), suurenenud karvakasvu (hüpertrichoos), suuümbruse naha põletikku (perioraalne dermatiit), naha värvimuutust ja allergilisi nahareaktsioone.

Võib esineda sisemisi (süsteemseid) toimeid, mis tulenevad kortikosteroidide sisaldavate ravimite välispidisest kasutamisest ja nende imendumisest kehasse.

Kõrvaltoimete

teatamine Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti poole

Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti poole või Apteeker. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles pakendi infolehes ei ole märgitud. on.

Te võite kõrvaltoimetest teatada ka otse Saksamaa Föderaalsetele Ravimiametileja Meditsiiniseadmete Instituudile, osakond Farmakovigilants, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, veebisait: www.bfarm.de.

Kõrvaltoimetest teatades saate aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkemate andmete kättesaadavaks tegemisele. olemasolevaks tehtud.

5. ,1% kreemi säilitada? Hoidke seda ravimit lastele

kättesaamatus kohas. Lapsed „Kõlblik kuni

“ kuupäeva möödumist. Kõlblikkusaeg viitab märgitud kuu viimasele päevale. Säilitamistingimused Ärge hoidke üle 25 °C.

Säilitamistingimused

Ärge hoidke üle 25 °C.

Märkus säilivuse kohta pärast avamist

Pärast tuubi avamist on Advantan 0,1 % kreem 3 kuud säiliv.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas ravimit hävitada, kui te seda enam ei kasuta. Sellega aitate kaasa keskkonna kaitsmisele.

6. Pakendi sisu ja lisainfoMida Advantan O

,1% kreem sisaldab Toimeaine

on metüülprednisoloonatseponaat. 1 g kreemi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati (0,1 %).

Muud koostisosad on:

bensüülalkohol,

- Bensüülalkohol,
- Butüülhüdroksütolueen (Ph. Eur.),
- Tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur.),
- Detsüüloleaat, puhastatud vesi,
- Glütserool 85%,
- Glütseroolmonostearaat 40-55,
- Glütserooltrialkanoaat (C₈-C₁₈),
- Tahkerasv, makrogoolstearaat 2000
- Naatriumedetaat (Ph. Eur.).

Kuidas Advantan 0,1 % kreem välja näeb ja pakendi sisu Advantan O

,1% kreem on valge kuni kollakas läbipaistmatu emulsioon. Advantan 0,1 % kreem on saadaval 15 g, 25 g, 50 g ja 100 g tuubides. Ravimi müügiloo hoidja

Ravimiettevõtja

Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Straße 15
07745 Jena
Saksamaa
Telefon: 03641 648888
Telefaks: 03641 648889
E-post: hautgesundheit@jenapharm.de

Tootja

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
20090 Segrate (Milano)
Itaalia

Seda pakendi infolehte uuendati viimati veebruaris 2014.

Transtoyou