

Informacja o stosowaniu: Informacja dla pacjentów

Advantan 0,1 % Krem
Methylprednisolonaceponat

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

- Zachowaj tę ulotkę. Może zechcesz przeczytać ją ponownie.
- Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Ten lek został przepisany wyłącznie tobie. Nie przekazuj go innym osobom. Może zaszkodzić innym, nawet jeśli mają takie same objawy jak ty.
- Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Patrz punkt 4.

Co zawiera ta ulotka

1. Co to jest Advantan 0,1 % krem i w jakim celu się go stosuje?
2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem Advantan 0,1 % krem?
3. Jak stosować Advantan 0,1 % krem?
4. Jakie działania niepożądane są możliwe?
5. Jak przechowywać Advantan 0,1 % krem?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Advantan 0,1 % krem i do czego jest stosowany?

Advantan 0,1 % krem zawiera substancję czynną aceponian metyloprednizolonu. Advantan 0,1 % krem to lek stosowany w leczeniu stanów zapalnych (kortykosteroid), przeznaczony do stosowania na skórę.

Advantan 0,1 % krem stosuje się w przypadku wyprysku endogennego (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), wyprysku kontaktowego, degeneracyjnego wyprysku i wyprysku pienneżkowego.

2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem Advantan 0,1 % kremu?

Advantan 0,1 % kremu nie należy stosować

- jeśli jesteś uczulony na aceponian metyloprednizolonu lub którykolwiek z wymienionych w punkcie 6. pozostałych składników tego leku.
- jeśli występują u Ciebie następujące schorzenia:
 - procesy gruźlicze lub kiłowe
 - Infekcje wirusowe (np. opryszczka, ospa wietrzna (varicella))
 - czerwone lub różowe zapalenie skóry (trądzik różowaty)
 - zapalenie skóry wokół ust (dermatitis perioralis)
 - wrzody (ulcus)
 - zwykły trądzik
 - ścienczenie skóry (choroby skóry zanikowe)
 - reakcje poszczepienne w obszarze leczenia
 - infekcje skóry wywołane przez bakterie lub grzyby (patrz ostrzeżenia i środki ostrożności) i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Proszę porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem Advantan 0,1 % kremu.

Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu Advantan 0,1 % kremu, jeśli lekarz stwierdził towarzyszącą infekcję skóry wywołaną przez bakterie i/lub grzyby. W takim przypadku należy również stosować leki przepisane na tę infekcję, w przeciwnym razie infekcja może się pogorszyć.

Leki przeciwzapalne (kortykosteroidy), do których należy również substancja czynna metyloprednizolon aceponian w Advantan 0,1% kremie, mają silne działanie na organizm. Dlatego nie zaleca się stosowania Advantan 0,1 % kremu na dużych powierzchniach skóry lub przez dłuższy czas, ponieważ to znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych:

- Stosuj Advantan 0,1 % kremu tak oszczędnie, jak to możliwe, zwłaszcza u dzieci.
- Stosuj Advantan 0,1 % kremu tylko tak długo, jak to absolutnie konieczne, aby leczyć swoją chorobę skóry.
- Advantan 0,1 % kremu nie może dostać się do oczu, na głębokie otwarte rany ani na błony śluzowe.
- Advantan 0,1 % kremu nie powinien być stosowany pod materiałami nieprzepuszczającymi powietrza i wody, chyba że zostało to zalecone przez lekarza. Do takich materiałów należą na przykład bandaże, ciasno przylegające opatrunkinie zostało przepisane przez lekarza. Należą do nich na przykład bandaże, ciasno przylegające opatrunki obcisła odzież oraz pieluchy. ciasna odzież oraz pieluchy.

Lokalne infekcje skóry mogą być potencjalnie nasilone przez zewnętrzne stosowanie kortykosteroidów.

WiJak w przypadku wszystkich innych kortykosteroidów, stosowanie kremu Advantan 0,1% do innych niż zamierzone schorzeń może maskować ich objawy oraz utrudniać prawidłową diagnozę i terapię.

Jak wiadomo w przypadku kortykosteroidów podawanych wewnątrznie (systemowych), również po zewnętrznym stosowaniu kortykosteroidów może rozwinąć się jaskra (glaukom) (np. po wysokiej dawce lub długotrwałym stosowaniu na dużą powierzchnię, po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych lub po aplikacji na skórę w pobliżu oczu).

Dzieci i młodzież

Używaj tak mało kremu Advantan 0,1 % jak to konieczne, aby uniknąć działań niepożądanych. Krem Advantan 0,1% nie powinien być stosowany pod materiałami nieprzepuszczającymi powietrza i wody, np. pieluchami.

Krem Advantan 0,1 % nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 3 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa.

Stosowanie kremu Advantan 0,1 % razem z innymi lekami

Interakcje z Advantan 0,1% kremu z innymi lekami nie są dotychczas znane.

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz/stosujesz inne leki, niedawno przyjmowałeś/stosowałeś inne leki lub zamierzasz przyjmować/stosować inne leki.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, lub jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem tego leku zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty. tego leku zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty. skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

działanie teratogenne. działanie trawienne.

wystąpienia rozszczepu podniebienia u noworodków. W pierwszych 3 miesiącach ciąży zasadniczo nie należy stosować preparatów zawierających kortykosteroidy do użytku zewnętrznego.

W ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży nie należy stosować preparatów zawierających kortykosteroidy do użytku zewnętrznego. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny stosować krem Advantan 0,1 % tylko po starannej ocenie ryzyka i korzyści przez lekarza.

Advantan 0,1 % krem nie może być stosowany na większych powierzchniach, przez dłuższy czas lub pod opatrunkiem (warunki okluzyjne), ponieważ może to prowadzić do obciążenia nienarodzonego dziecka. Podczas okresu karmienia piersią Advantan 0,1 % krem nie wolno stosować na większych powierzchniach, przez dłuższy czas lub pod opatrunkiem (warunki okluzyjne). lub pod osłoną opatrunku (warunki okluzyjne) odbywać się.

są dostępne dane dotyczące wpływu aceponianu metyloprednizolonu na płodność. Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Advantan 0,1 % krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Advantan 0,1 % krem

Inne składniki zawarte w Advantan 0,1 % krem, takie jak alkohol cetylostearylowy i butylohydroksytoluen, mogą powodować miejscowe podrażnienia skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Butylohydroksytoluen może ponadto powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych. olej i butylohydroksytoluen mogą miejscowo powodować podrażnienia skóry (np.

kontaktowe zapalenie skóry). Butylohydroksytoluen może ponadto powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych.

3. ,1% krem? Stosuj

Zastosuj ten lek zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub Skonsultuj się z farmaceutą. Zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli nie jesteś pewien.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, Advantan 0,1 % krem stosuje się raz dziennie.

Advantan 0,1 % krem nakłada się cienko na chorobowo zmienione partie skóry i delikatnie wciera.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 6 tygodni u dorosłych i 3 tygodni u dzieci powyżej 3 lat.

Jeśli podczas dłuższego stosowania Advantan 0,1 % krem skóra staje się zbyt sucha, należy przejść na preparat o wyższej zawartości tłuszczu (Advantan maść lub maść tłusta).

Proszę skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz wrażenie, że działanie Advantan 0,1 % krem jest zbyt silne lub zbyt słabe.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Advantan 0,1 % krem nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 3 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa.

Dla stosowania Advantan 0,1 % kremu u dzieci powyżej 3 lat nie jest wymagana zmiana dawkowania. Ogólnie czas stosowania u dzieci nie powinien przekraczać 3 tygodni.

Jeśli zastosowano większą ilość Advantan 0,1 % kremu niż zalecanastosowali, niż powinni

Jeśli zapomniano o zastosowaniu Advantan Ostosowanie na dużą powierzchnię skóry w sprzyjających warunkach do wchłaniania przez skórę) lub przypadkowe spożycie.

% kremu Jeśli zapomniano o poprzednim zastosowaniu, nie nakładaj większej ilości Advantan 0 % kremu zapomnieliście

% kremu niż zwykle, lecz kontynuuj leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli zapomniano o zastosowaniu Advantan 0,1 % kremu jak zwykle, lecz kontynuuj leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeśli stosujesz Advantan 0,1 % krem przerwać

Jeśli przerwiesz leczenie Advantan 0,1 % krem przedwcześnie, może to prowadzić do pogorszenia obrazu klinicznego. Dlatego skonsultuj się z lekarzem, zanim samodzielnie przerwiesz lub zakończysz leczenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania tego leku, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak wszystkie leki, ten lek może powodować działania niepożądane, które jednak nie muszą wystąpić u każdego.

Przy ocenie działań niepożądanych stosuje się następujące określenia częstości: Często: może

dotyczyć do 1 na 10 leczonych. Sporadycznie: może

dotyczyć do 1 na 100 leczonych osób.

Rzadko: może do 1 na 1000 leczonych osób.

Nieznana: Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Często podczas leczenia kremem Advantan 0,1% może wystąpić pieczenie i swędzenie w miejscu podania.

Czasami może wystąpić nadwrażliwość na substancję czynną i miejscowe objawy towarzyszące, takie jak suchość skóry, zaczerwienienie skóry, pęcherze, zapalenie mieszków włosowych (zapalenie mieszków włosowych), wysypka i parestezje skóry.

Rzadko może wystąpić wysypka krostkowa (pyodermia), pęknięcia skóry, rozszerzenie naczyń skórnych (teleangiektazje), ścieńczenie skóry (atrofia skóry), infekcja grzybicza skóry, trądzik, a w miejscu podania może wystąpić cellulitis, obrzęk i podrażnienie skóry.

Nieznana częstość: Może wystąpić powstawanie rozstępów (striae), nadmierny wzrost włosów (hipertrichoza), zapalenie skóry wokół ust (perioralna zapalenie skóry), przebarwienia skóry i reakcje alergiczne skóry.

Może dojść do wewnętrznych (systemowych) efektów w wyniku wchłaniania do organizmu (resorpcja) po zewnętrznym zastosowaniu leków zawierających kortykosteroidy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub Aptekarz. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce są.

Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Federalnego Instytutu ds. Leków Wyrobów Medycznych, Dział Farmakowigilancji, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, strona internetowa: www.bfarm.de.

Zgłaszając działania niepożądane, można przyczynić się do dostarczenia większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa tego leku do dyspozycji.

5. Jak przechowywać Advantan 0,1 % krem?

Przechowywać ten lek w miejscu niedostępnym dla dzieci. niedostępny.

„Termin ważności ” podanym,, podanych Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Informacja o trwałości po otwarciu

Po otwarciu tuby Advantan 0,1 % krem jest trwały przez 3 miesiące. Wyrzucaj leki nie do ścieków

Nie wyrzucaj leków do ścieków do odpadów domowych. Zapytaj farmaceutę, jak pozbyć się leku, jeśli go już nie używasz. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska. Odpady domowe. Zapytaj farmaceutę, jak pozbyć się leku, jeśli go już nie używasz. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska.

6. informacjeCo zawiera Advantan 0

,1% krem Substancją czynną

jest aceponian metyloprednizolonu. 1 g kremu zawiera 1 mg aceponianu metyloprednizolonu (0,1%).

Pozostałe składniki to:

alkohol benzylowy,

- Benzylowy alkohol,
- Butylohydroksytoluen (Ph. Eur.),
- Cetylostearoalkohol (Ph. Eur.),
- Decyloleinian, oczyszczona woda,
- Glicerol 85%,
- Monostearynian glicerolu 40-55,
- Trialkanoat glicerolu (C₈-C₁₈),
- Tłuszcz stały, stearynian makrogolu 2000
- Edetynian sodu (Ph. Eur.).

Jak wygląda Advantan 0,1 % krem i zawartość opakowania

Advantan 0,1 % krem to biała do żółtawej, nieprzezroczysta emulsja. Advantan 0,1 % krem jest dostępny w tubkach po 15 g, 25 g, 50 g i 100 g.

Podmiot odpowiedzialny

Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Straße 15
07745 Jena
Niemcy

Telefon: 03641 648888

Faks: 03641 648889

E-Mail: hautgesundheits@jenapharm.de

Producent

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

Ta ulotka została ostatnio zaktualizowana w lutym 2014.

Transtoyou