

Prospecto: información para el usuario
Aldara 5 % crema
Imiquimod

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
- ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- No comparta este medicamento con otras personas, ya que está prescrito solo para usted. Podría ser perjudicial para otros, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
- ¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Contenido de este prospecto:

1. ¿Qué es Aldara crema y para qué se utiliza?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios.
5. ¿Cómo almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Aldara crema y para qué se utiliza?

Aldara crema puede usarse para tres afecciones diferentes. Su médico puede prescribir Aldara crema para el tratamiento de:

● Verrugas (condilomas acuminados) que se encuentran en el exterior de los genitales y alrededor del ano (entre las nalgas).

● En carcinoma basocelular superficial.

Esta es una forma común y de crecimiento lento de cáncer de piel que es particularmente improbable que se disemine a otras partes del cuerpo. Generalmente, esta afección ocurre en personas de mediana edad y en personas mayores, especialmente en pacientes con piel clara. La enfermedad es causada por la exposición excesiva al sol. Si el carcinoma de células basales no se trata, puede causar deformidades, especialmente en la cara. Por esta razón, es importante que la afección se detecte y trate a tiempo.

● Queratosis actínica

Las queratosis actínicas son manchas ásperas en la piel que han estado excesivamente expuestas al sol durante la vida del paciente. Las manchas pueden tener el color de la piel, pero también pueden ser grises, rosadas, rojas o marrones. Las manchas pueden ser ásperas, escamosas, duras, verrugosas, planas o estar al nivel de la piel. Aldara solo puede usarse en queratosis actínicas planas en la cara o el cuero cabelludo. El paciente debe tener un sistema inmunológico saludable y el médico debe haber determinado que Aldara es el tratamiento más adecuado para usted. La crema Aldara ayuda al sistema inmunológico de su cuerpo a producir sustancias naturales que ayudan a combatir su carcinoma de células basales, queratosis actínica o el virus que ha causado sus verrugas.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

- Es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

o Si ha usado anteriormente crema Aldara u otros medicamentos similares para el tratamiento, debe informar a su médico antes de comenzar este tratamiento.

o Si tiene un trastorno del sistema inmunológico.

o Si ha tenido un trasplante de órgano.

o Use la crema Aldara solo cuando el área a tratar haya sanado después de un tratamiento previo con medicamentos o una intervención quirúrgica.

o Evite el contacto con los ojos, labios y fosas nasales. En caso de contacto accidental, retire la crema enjuagando con agua.

Evite el contacto con los ojos, labios y fosas nasales. En caso de contacto accidental, retire el enjuagar la crema con agua.

o No aplique la crema internamente.

o No use más crema de la que su médico ha recomendado.

o No cubra la zona tratada con apósitos o vendajes después de aplicar la crema Aldara.

o Si el área tratada le causa demasiadas molestias, debe lavar la crema con agua y jabón suave.

Una vez que las reacciones cutáneas hayan desaparecido, puede reanudar el tratamiento.

o Informe a su médico si tiene resultados anormales en los análisis de sangre.

Debido al mecanismo de acción de Aldara, existe la posibilidad de que la crema agrave una inflamación existente en el área tratada.

● Si está siendo tratado por verrugas genitales, tome estas precauciones adicionales:

- Los hombres que deseen tratar verrugas bajo el prepucio deben retraer el prepucio diariamente
- y lavar esta área de la piel. Si el prepucio no se lava diariamente, existe el riesgo de estrechamiento, hinchazón o adelgazamiento del prepucio, o se vuelve cada vez más difícil retraerlo. Si uno o más de estos síntomas ocurren, debe interrumpir el tratamiento inmediatamente y consultar a su médico.
- Si tiene úlceras abiertas: No use la crema Aldara en áreas de la piel donde haya úlceras abiertas hasta que estas hayan sanado.
- Si tiene verrugas internas: No use la crema Aldara en la uretra (el conducto urinario), la vagina (el canal de parto), el cuello uterino (órgano reproductor interno en la mujer) o en cualquier parte del ano.

Si tiene problemas graves con su sistema inmunológico debido a una enfermedad o a los medicamentos que está tomando, solo debe someterse a un tratamiento con crema Aldara. Si cree que este es su caso, consulte a su médico. Si es VIH positivo, debe informar a su médico ya que se ha demostrado que la crema Aldara es menos efectiva en estos pacientes. Si decide tener

relaciones sexuales mientras aún tiene verrugas, aplique la crema Aldara después de la actividad sexual, no antes.

La crema Aldara puede afectar los condones y los diafragmas, por lo tanto, la crema no debe permanecer durante la actividad sexual. Recuerde que la crema Aldara no protege contra la posible transmisión del VIH u otras enfermedades de transmisión sexual a otra persona.

● Si está siendo tratado por carcinoma basocelular o queratosis actínica, tome estas precauciones adicionales:

No se exponga al sol o a camas de bronceado y evite la luz solar tanto como sea posible durante el tratamiento con crema Aldara. Use ropa protectora y un sombrero de ala ancha cuando esté al aire libre. Durante el uso de la crema Aldara y hasta que ocurra la curación, el área a tratar se verá notablemente diferente de la piel normal.

Niños y adolescentes hasta 18 años

No se recomienda el uso en niños y adolescentes.

¿Está usando otros medicamentos?

¿Está usando otros medicamentos además de la crema Aldara, los ha usado recientemente o existe la posibilidad de que pronto use otros medicamentos? Informe a su médico o farmacéutico.

No se conocen medicamentos que sean incompatibles con la crema Aldara.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento.

¿Está embarazada, cree que podría estarlo, desea quedar embarazada o está amamantando?

Comuníquese con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento. Su médico discutirá los riesgos y beneficios del uso de la crema Aldara durante el embarazo con usted. Los resultados de estudios en animales no indican un efecto perjudicial directo o indirecto durante el embarazo.

No amamante mientras use la crema Aldara, ya que no se sabe si el imiquimod se excreta en la leche materna.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento no tiene o tiene una influencia insignificante en la capacidad para conducir y usar máquinas.

La crema Aldara contiene metilhidroxibenzoato, propilhidroxibenzoato (E216), alcohol cetílico, alcohol estearílico y alcohol bencílico. El metilhidroxibenzoato (E 218) y el propilhidroxibenzoato (E 216) pueden causar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). El alcohol cetílico y el alcohol estearílico pueden causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, dermatitis). Este medicamento contiene 5 mg de alcohol bencílico en cada sobre. El alcohol bencílico puede causar reacciones alérgicas e irritación local leve.

3. ¿Cómo usar este medicamento?

Niños y adolescentes menores de 18 años:

No se recomienda el uso en niños y adolescentes.

Adultos:

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico le haya indicado.

¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Comuníquese con su médico o farmacéutico.

Lávese las manos cuidadosamente antes y después de aplicar la crema. No cubra el área tratada con vendajes u otros apósitos después de haber aplicado la crema Aldara.

Use un nuevo sobre cada vez que aplique la crema. Deseche la crema sobrante después de la aplicación. No guarde el sobre abierto para otro día.

La frecuencia y duración del tratamiento para verrugas genitales, carcinoma basocelular y queratosis actínica difieren entre sí (vea las instrucciones específicas para cada indicación).

Instrucciones para la aplicación de la crema Aldara

● Cuando esté siendo tratado por verrugas genitales:

Instrucciones para la aplicación – (lu, mié y vie)

1. Antes de irse a la cama, lávese las manos y el área a tratar con jabón suave y agua. Seque bien.
2. Oabra un nuevo sobre y exprima un poco de crema en la punta de su dedo
3. Frote una capa delgada de crema Aldara sobre las verrugas limpias y secas y frote suavemente hasta que la crema se haya absorbido en la verruga.
4. Deseche el sobre abierto después de aplicar la crema y lávese las manos con agua y jabón.
5. Deje la crema Aldara en las verrugas durante 6 a 10 horas. No tome un baño o ducha durante este tiempo.
6. Después de 6 a 10 horas, la piel donde se aplicó la crema debe ser limpiada con agua y jabón suave.

Aplicar crema Aldara tres veces por semana. Por ejemplo, aplique la crema el lunes, miércoles y viernes. Un sobre contiene suficiente crema para cubrir un área de piel con verrugas del tamaño de 20 cm². cubrir.

(ver sección 2 “¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?”) Continúe usando la crema Aldara hasta que sus verrugas hayan desaparecido por completo (en la mitad de las mujeres

todas las verrugas desaparecerán en 8 semanas, en la mitad de los hombres en 12 semanas, en ciertos pacientes las verrugas pueden desaparecer ya en 4 semanas). No use la crema Aldara por más de 16 semanas para cada tratamiento (nuevo) de verrugas.

Si tiene la impresión de que el efecto de la crema Aldara es demasiado fuerte o demasiado débil, discútalos con su médico o farmacéutico. ● Cuando esté siendo tratado por carcinoma basocelular:

Instrucciones de uso – (lu, ma, mi, ju y vi)

Antes de acostarse, lave sus manos y el área a tratar con agua y jabón suave.

1. Seque bien. Secar a fondo.
2. Frote una capa delgada de crema Aldara en el área afectada y 1 cm alrededor. Frote suavemente hasta que la
3. crema se haya absorbido en la piel. crema en la piel se ha absorbido.
4. Deseche el sobre abierto después de aplicar la crema y lávese las manos con agua y jabón.
5. Ldeje la crema Aldara en la piel durante aproximadamente 8 horas. No se bañe ni duche durante este tiempo.
6. Después de 8 horas, lave la piel donde se aplicó la crema con agua y jabón suave.

Aplice suficiente crema Aldara diariamente durante cinco días consecutivos cada semana durante seis semanas para cubrir el área a tratar y 1 centímetro alrededor del área a tratar. Aplique la crema por ejemplo, de lunes a viernes. El sábado y el domingo no aplique crema.

● Cuando esté siendo tratado por queratosis actínica:

Instrucciones de uso – (lu, mié, vie)

1. Antes de acostarse, lávese las manos y el área a tratar con agua y jabón suave. Seque bien.
2. Abra un nuevo sobre y exprima un poco de crema en la punta de su dedo.
3. Frote una capa delgada de crema Aldara en el área afectada. Frote suavemente hasta que la crema se absorba en la piel. se ha extraído.
4. Tire el sobre abierto después de aplicar la crema y lávese las manos con agua y Deje la crema Aldara en la piel durante aproximadamente 8 horas. No se bañe ni
5. duche durante este tiempo. ducha.
6. Lave la piel donde se aplicó la crema después de 8 horas con jabón suave y agua.

Aplice la crema Aldara tres veces por semana. Aplique la crema, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes. Un sobre es suficiente para cubrir un área de piel del tamaño de 25 cm². Continúe usando la crema durante cuatro semanas. Cuatro semanas después de finalizar este primer tratamiento, su médico evaluará su piel. Si no han desaparecido todas las lesiones, puede ser necesario un tratamiento adicional de cuatro semanas. necesario.

Enjuague el exceso de crema con jabón suave y agua. Una vez que la reacción cutánea haya desaparecido, puede reanudar el tratamiento. Si accidentalmente ingiere la crema Aldara, debe contactar a su médico de inmediato.

¿Olvidó usar este medicamento?

Si olvida una dosis, debe aplicarla tan pronto como lo recuerde, y luego continuar con su esquema normal.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios o farmacéutico.

Efectos secundarios muy comunes (probablemente ocurren en más de 1 de cada 10 pacientes)

Efectos secundarios comunes (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 10 pacientes)

Efectos secundarios poco comunes (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 100 pacientes)

Efectos secundarios comunes (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 10 pacientes)

A veces efectos secundarios (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 100 pacientes)

Efectos secundarios poco frecuentes (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 1000 pacientes)

Efectos secundarios muy raros (probablemente ocurren en menos de 1 de cada 10,000 pacientes).

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todos los sufran.

Informe a su médico o farmacéutico lo antes posible si no se siente bien durante el período en el que está usando la crema Aldara.

En algunos pacientes se observaron cambios en el color de la piel en el área donde se aplicó la crema Aldara. Aunque estos cambios generalmente disminuyen con el tiempo, reducir, de la crema Aldara, debe suspender el tratamiento, lavar el área tratada con jabón suave y agua, y contactar a su médico o farmacéutico. En algunos pacientes se ha observado una ligera disminución de las plaquetas. Una disminución de las

plaquetas puede hacerle más susceptible a infecciones o a tener moretones con facilidad. También puede aparecer fatiga. Informe a su médico si aparecen estos síntomas. En algunos pacientes con un trastorno inmunológico, su enfermedad puede empeorar. ¿Tiene un trastorno inmunológico

y está usando la crema Aldara? Informe a su médico si hay cambios. Se han reportado raramente reacciones cutáneas graves. Si encuentra pequeñas heridas en su piel o pequeñas manchas rojas que se desarrollan más, posiblemente con síntomas como picazón, fiebre, sensación de gripe pequeñas manchas que se desarrollan más, posiblemente con síntomas como picazón, fiebre, sensación gripal sensación, articulaciones dolorosas, problemas de visión, dolor al tragar, dolor o picazón en los ojos o llagas en la boca, contacte inmediatamente a su médico.

Un pequeño número de pacientes experimenta pérdida de cabello en o alrededor del área tratada.

● Cuando se le trata por verrugas genitales:

Muchas de las reacciones adversas de la crema Aldara son causadas por la acción local en su piel.

Las reacciones adversas muy comunes son enrojecimiento (61 % de los pacientes), adelgazamiento de la piel (30 % de los pacientes), descamación e hinchazón. Endurecimiento bajo la piel, pequeñas heridas abiertas, costras como las que se forman durante la cicatrización normal y pequeñas ampollas bajo la piel pueden ocurrir. Después de aplicar la crema Aldara, puede experimentar picazón (32 % de los pacientes), una sensación de ardor (26 % de los pacientes) o dolor (8% de los pacientes) en las áreas donde aplicó la crema. La mayoría de estas reacciones cutáneas son leves y la piel se recuperará aproximadamente dos semanas después de la interrupción del tratamiento.

A menudo, algunos pacientes (4 % o menos) tienen dolor de cabeza, a veces fiebre y síntomas similares a los de la gripe, dolor en las articulaciones y músculos, prolapso uterino; en mujeres, dolor durante el coito; disfunción eréctil; aumento de la sudoración; náuseas; problemas gástricos e intestinales; zumbido en los oídos; rubor; fatiga; mareos; migraña; extremidades adormecidas; insomnio; depresión; disminución del apetito; glándulas inflamadas; infecciones bacterianas, virales y fúngicas (por ejemplo, llagas); infección vaginal con flujo blanco; tos y resfriado con dolor de garganta reportados.

Muy raramente se han producido reacciones graves y dolorosas, especialmente cuando se ha aplicado más crema de la recomendada. En casos muy raros, fue difícil para las mujeres mujeres difícil de buscar atención médica de inmediato. ● Cuando esté siendo tratado por carcinoma basocelular:

Muchas de las reacciones adversas de la crema Aldara son causadas por la acción local en la piel.

Las reacciones locales en la piel pueden ser una señal de que el medicamento está funcionando como se espera. Un efecto secundario muy común es que la piel tratada pica ligeramente.

Los efectos secundarios comunes son extremidades adormecidas, pequeñas hinchazones en la piel, dolor,

sensación de ardor, irritación, sangrado, enrojecimiento o erupción. Si una reacción cutánea durante el tratamiento se vuelve demasiado incómoda, hable con su médico. Él/Ella puede aconsejarle que deje de usar la crema Aldara durante unos días (es decir, para establecer una breve pausa en el tratamiento). Si hay pus (pus) u otro síntoma que indique infección, discútalos con su médico. Además de las reacciones cutáneas, otros efectos secundarios comunes son glándulas inflamadas y dolor de espalda. A veces, algunos pacientes experimentan cambios en el lugar de aplicación (secreción, inflamación,

hinchazón, formación de costras, descomposición de la piel, ampollas, dermatitis) o irritabilidad, náuseas, boca seca, síntomas similares a la gripe y fatiga. ● Cuando esté siendo tratado por queratosis actínica:

● Cuando se le trate por queratosis actínica:

Muchas de las reacciones adversas de la crema Aldara son causadas por la acción local en la piel. Las reacciones cutáneas locales pueden ser un signo de que el medicamento está funcionando como se pretende.

Un efecto secundario muy común es que la piel tratada pica ligeramente.

Los efectos secundarios comunes son dolor, sensación de ardor, irritación o enrojecimiento. Si una reacción cutánea durante el tratamiento se vuelve demasiado desagradable, hable con su médico. Él/ella puede aconsejarle que suspenda el uso de la crema Aldara durante unos días (es decir, para establecer una breve pausa en el tratamiento).

Si hay presencia de pus (pus) u otro síntoma que indique infección, discútalo con su médico. Además de las reacciones cutáneas, otros efectos secundarios comunes son dolor de cabeza, anorexia, náuseas, dolor muscular, dolor articular y fatiga.

A veces, algunos pacientes experimentan cambios en el lugar de aplicación (sangrado, inflamación, secreción, sensibilidad, hinchazón, pequeñas áreas hinchadas de la piel, extremidades adormecidas, descamación, cicatrización, úlceras o una sensación de calor o malestar) o inflamación del interior de la nariz, secreción nasal, gripe o síntomas similares a la gripe, depresión, irritación ocular, párpado hinchado, dolor de garganta, diarrea, queratosis actínica, enrojecimiento, cara hinchada, úlceras, dolor en las extremidades, fiebre, debilidad o escalofríos.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través de nosotros ayudar a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento. el sistema nacional de notificación como se menciona en el apéndice V. Al notificar efectos secundarios, puede

5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 25°C.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad. Esta se encuentra en la caja y la etiqueta después de "EXP". Allí se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad. Los sobres abiertos no deben reutilizarse. No tire los medicamentos por el desagüe ni los arroje a la basura.

Consulte a su farmacéutico sobre qué hacer con los medicamentos que ya no utiliza. Si desecha los medicamentos de manera adecuada, se destruirán de manera responsable y no llegarán al medio ambiente. correcto.

¿Qué contienen este medicamento?

La sustancia activa de este medicamento es imiquimod. Cada sobre contiene 250 mg de crema (100 mg de crema

- El principio activo de este medicamento es imiquimod. Cada sobre contiene 250 mg de crema (100 mg de crema contiene 5 mg de imiquimod).
- Los otros componentes de este medicamento son ácido isostearico, alcohol bencílico, alcohol cetílico, alcohol estearílico, parafina blanca suave, polisorbato 60, estearato de sorbitán, glicerol, nmetilhidroxibenzoato (E218), propilhidroxibenzoato (E216), goma xantana, agua purificada. (Ver también la sección 2 "La crema Aldara contiene metilhidroxibenzoato, propilhidroxibenzoato (E216), alcohol cetílico, y alcohol estearílico y alcohol bencílico")
- ¿Cómo se ve la crema Aldara y cuánto contiene un paquete?

Cada sobre de crema Aldara al 5% contiene 250 mg de una crema blanca a amarilla clara.

- Cada caja contiene 12 o 24 sobres de poliéster/aluminio para un solo uso. Puede ser
- Cada caja contiene 12 o 24 sobres de poliéster/aluminio para un solo uso. Puede ser que no todos los tamaños de envase estén en el mercado. Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de comercialización

Viatrix Healthcare Limited
Parque Industrial Damastown
Mulhuddart
Dublín 15
DUBLÍN
Irlanda
Irlanda

Fabricante
Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Alemania

Para toda la información relacionada con este medicamento, póngase en contacto con el representante local del titular de la autorización de comercialización:

Bélgica/Belgique/Belgien

Viatrix
Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

България
Майлан ЕООД
Тел: +359 2 44 55 400

Dinamarca
Viatrix ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Luxemburgo/Luxemburg
Viatrix
Tél/Tel: +32 2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Alemania
Viatrix Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Hungría
Viatrix Healthcare Kft.
1138 Budapest
Váci út 150
Tel: +36 1 465 2100

Países Bajos
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

República Checa
Viatrix CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Noruega
Viatrix AS
Hagaløkkveien 26

1383 Asker
33

Eesti
Viatri OÜ
Tel: +372 63 63 052
Ελλάδα
Viatri Hellas Ltd
Τηλ: +30 210 010 0002

España
Viatri Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, 5ª planta
08038 - Barcelona
Tel: +34 900 102 712

Francia
Viatri Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Tél: +33 (0)1 40 80 15 55

Croacia
Viatri Croacia d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 235 059 90

Irlanda
Viatri Limited
Tel: +353 1 8711600
Islandia
Icepharma hf
Tel: +354 540 8000

Italia
Viatri Italia
Via Vittor Pisani,
2020124 Milán
Tel: +39 (0) 2 612 46921

Chipre
CPO Pharmaceuticals Limited
Tel: +357 22863100

Letonia
Viatri SIA

101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Tāl: +371 67616137
Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich
Viatri Austria GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien
Tel: + 43 (0)1 86 390

Polska
Viatri Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Tel: +48 22 546 6400

Portugal
Viatri Healthcare, Lda.
Av. D. João II,
Edificio Atlantis, nº 44C – 7.3 y 7.4
1990-095 Lisboa
Tel: +351 214 127 200

Rumanía
BGP PRODUCTS SRL
Tel.: +40372 579 000

Eslovenia
Viatri d.o.o.
Tel: +386 1 23 63 180

República Eslovaca
Viatri Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Finlandia
Viatri Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Suecia
Viatri AB
Box 23033
104 35 Estocolmo
+46 (0) 8 630 19 00

Lituania
Viatri UAB

Calle Žalgirio 90-100
Vilna LT-09303

Tel. + 370 52051288

Este prospecto fue aprobado por última vez en
Más información sobre este medicamento está disponible en el sitio web de la Agencia Europea
de Medicamentos (<http://www.ema.europa.eu>).

Transtoyou