

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Aldara 5 % kreem
Imikvimood

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu:

1. Mis on Aldara kreem ja milleks seda kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed.
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Aldara kreem ja milleks seda kasutatakse?

Aldara kreemi võib kasutada kolme erineva seisundi raviks. Teie arst võib Aldara kreemi määrata järgmiste seisundite raviks:

● Tüükad (condylomata acuminata), mis asuvad suguelundite välispinnal ja päraku ümbruses (tuharate vahel).

● Pealiskaudne basaarakuline kartsinoom.

See on tavaline ja aeglaselt kasvav nahavähi vorm, mille puhul on eriti ebatõenäoline, et see levib teistesse kehaosadesse. Üldiselt esineb see haigus keskealistel ja vanematel inimestel, eriti heleda nahaga patsientidel. Haigus on põhjustatud liigsest päikese käes viibimisest. Kui basaarakuline kartsinoom jääb ravimata, võib see põhjustada deformatsioone, eriti näol. Seetõttu on oluline, et haigus avastatakse ja ravitakse varakult.

● Aktiiniline keratoos

Aktiinilised keratoosid on karedad laigud nahal, mis on elu jooksul liigselt päikese käes olnud. Plekid võivad olla nahavärvi, aga ka hallid, roosad, punased või pruunid. Plekid võivad olla karedad, ketendavad, kõvad, soolatüüka sarnased, lamedad või nahaga ühel tasapinnal. Aldarat võib kasutada ainult lamedate aktiiniliste keratooside puhul näol või peanahal. Patsient peab olema terve immuunsüsteemiga ja arst peab olema kindlaks teinud, et Aldara on teile kõige sobivam ravi.

Aldara kreem aitab teie keha immuunsüsteemil toota looduslikke aineid, mis aitavad võidelda teie basaarakulise kartsinoomi, aktiinilise keratoosi või viirusega, mis on põhjustanud teie soolatüükad.

2. Millal te ei tohi seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal te ei tohi seda ravimit kasutada?

- Te olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

o Kui olete varem kasutanud Aldara kreemi või muid sarnaseid ravimeid, peate sellest oma arstile teatama enne selle ravi alustamist.

o Kui teil on immuunsüsteemi häire.

o Kui teil on olnud elundi siirdamine.

o Kasutage Aldara kreemi alles siis, kui ravitav piirkond on paranenud pärast eelmist ravi ravimitega või kirurgilist sekkumist.

o Vältige kokkupuudet silmade, huulte ja ninasõõrmetega. Juhusliku kokkupuute korral eemaldage

kreem loputades veega.

o Ärge kandke kreemi sisemiselt.

o Ärge kasutage rohkem kreemi, kui arst on soovitanud.

o Ärge katke töödeldud ala plaastrite või muu sidemega pärast Aldara kreemi pealekandmist.

o Kui töödeldud piirkond tekitab teile liiga palju ebamugavust, peske kreem maha leebe seebi ja veega. Kui nahareaktsioonid on kadunud, võite ravi jätkata.

o Teavitage oma arsti, kui teil on ebanormaalsed vereanalüüside tulemused.

Aldara toimemehhanismi tõttu on võimalik, et kreem süvendab olemasolevat põletikku töödeldud piirkonnas.

● Kui teid ravitakse suguelundite tüügaste vastu, võtke arvesse järgmisi täiendavaid ettevaatusabinõusid:

- Mehed, kes soovivad ravida tüükad eesnaha all, peavad eesnaha igapäevaselt tagasi tõmbama ja seda nahapiirkonda pesema. Kui eesnaha ei pesta iga päev, on oht kitsenemisele, paistetusele või õhenemisele või muutub eesnaha tagasi tõmbamine järjest raskemaks. Kui ilmneb üks või mitu neist sümptomitest, lõpetage ravi kohe ja teavitage oma arsti.
- Kui teil on avatud haavandid: ärge kasutage Aldara kreemi nahapiirkondades, kus on avatud haavandid, kuni need on paranenud.
- Kui teil on sisemised tüükad: ärge kasutage Aldara kreemi ureetras (kusiti), tupes (sünnikanal), emakakaelas (naise sisemine suguelund) või kusagil pärakus.

Kui teil on haiguse või kasutatavate ravimite tõttu tõsiseid immuunsüsteemi probleeme, tohib Aldara kreemi kasutada ainult ühe ravikuuri. Kui arvate, et see kehtib teie kohta, konsulteerige oma arstiga. Kui olete HIV-positiivne, peate sellest oma arsti teavitama, kuna on tõestatud, et Aldara kreem on nende patsientide puhul vähem tõhus. Kui otsustate seksuaalvahekorda astuda, kui teil on endiselt tüükad, kandke Aldara kreem peale seksuaalvahekorda - mitte enne.

Aldara kreem võib kahjustada kondoomi ja pessareid,

seetõttu ei tohi kreem jääda seksuaalvahekorra ajal peale. Pidage meeles, et Aldara kreem ei kaitse HIV-i või teiste sugulisel teel levivate haiguste edasikandumise eest teisele isikule.

● Kui teid ravitakse basaalarakulise kartsinoomi või aktiinilise keratoosi vastu, võtke arvesse järgmisi täiendavaid ettevaatusabinõusid:

Ärge minge solaariumisse ega päevitage ja vältige päikesevalgust nii palju kui võimalik Aldara kreemi kasutamise ajal. Kandke kaitseriietust ja laia äärega mütsi, kui olete väljas. Aldara kreemi kasutamise ajal ja kuni paranemine on toimunud, näeb töödeldav ala märgatavalt erinev välja kui tavaline nahk.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat
Laste ja noorukite kasutamine ei ole soovitatav.

Kas te kasutate veel muid ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Aldara kreemile veel muid ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate peagi muid ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Ei ole teada ravimeid, mis oleksid Aldara kreemiga kokkusobimatud.

Rasedus ja imetamine

Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi kasutamist.

Kas olete rase, arvate, et võite olla rase, soovite rasestuda või toidate rinnaga? Võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga. Teie arst arutab teiega Aldara kreemi kasutamise riske ja kasu raseduse ajal. Loomkatsete tulemused ei viita otsesele ega kaudsele kahjulikule mõjule raseduse ajal.

Ärge andke Aldara kreemi kasutamise ajal rinnapiima, kuna ei ole teada, kas imikvimood eritub rinnapiima.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine

See ravim ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt sõiduvõimet ja masinate kasutamise võimet.

Aldara kreem sisaldab metüülhüdrosübensoaat, propüülhüdrosübensoaat (E216), setüülalkohol, steaarüülalkohol ja bensüülalkohol Metüülhüdrosübensoaat (E 218) ja propüülhüdrosübensoaat (E 216) võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik hilinenud). Setüülalkohol ja steaarüülalkohol võivad põhjustada kohalikke nahareaktsioone (nt dermatiit).

See ravim sisaldab igas kotikeses 5 mg bensüülalkoholi. Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja kerget kohalikku ärritust.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat:
Lastele ja noorukitele kasutamine ei ole soovitatav.

Täiskasvanud:

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst või apteeker on teile öelnud.

Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Peske oma käed hoolikalt enne ja pärast kreemi pealekandmist. Katke töödeldud ala mitte sidemete või muude sidemetega pärast Aldara kreemi pealekandmist.

Kasutage iga kord, kui kreemi peale kannate, uut pakendit. Visake pärast kasutamist ära kreem, mis jääb alles pärast pealekandmist. Ärge hoidke avatud pakendit teiseks päevaks. Ravimissagedus ja -kestus suguelundite tüügaste, basaarakulise kartsinoomi ja aktiinilise keratoosi puhul erinevad üksteisest (vt konkreetseid juhiseid iga näidustuse kohta).

Juhised Aldara kreemi pealekandmiseks

● Kui teid ravitakse suguelundite tüügaste vastu:

Juhised pealekandmiseks – (esmasp, kolmap ja reede)

1. Enne magamaminekut peske oma käed ja töödeldav ala leebe seebi ja veega. Kuivatage hoolikalt.
2. Avage uus pakend ja pigistage veidi kreemi oma sõrmeotsale
3. Hõõruge õhuke kiht Aldara kreemi puhastele kuivadele tüügastele ja hõõruge ettevaatlikult, kuni kreem on tüügasse imendunud.
4. Visake avatud pakend pärast kreemi pealekandmist ära ja peske oma käed vee ja seebiga.
5. Laske Aldara kreemil olla tüügastel 6 kuni 10 tundi. Selle aja jooksul ärge käige vannis ega duši all.
6. 6 kuni 10 tunni pärast tuleb kreemiga kaetud nahk puhastada leebe seebi ja veega puhastada.

Kandke Aldara kreemi kolm korda nädalas. Näiteks kandke kreemi esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Üks kotike sisaldab piisavalt kreemi, et katta 20 cm² suurune tüügastega nahapiirkond. katta.

Mehed, kellel on tüükad eesnaha all, peavad seda igapäevaselt tagasi tõmbama ja kogu piirkonda pesema (vt jaotis 2 „Millal peate selle ravimiga eriti ettevaatlik olema?“)

Jätkake Aldara kreemi kasutamist, kuni teie tüükad on täielikult kadunud (poolel naistest kaovad kõik tüükad 8 nädala jooksul, poolel meestest 12 nädala jooksul, teatud patsientidel võivad tüükad kaduda juba 4 nädala pärast).

Ärge kasutage Aldara kreemi kauem kui 16 nädalat iga (uue) tüügaste ravi puhul. Kui teil on tunne, et Aldara kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, arutage seda oma arsti või apteekriga.

● Kui teid ravitakse basaarakulise kartsinoomi vastu:

Kasutusjuhised – (esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede)

1. Enne magamaminekut peske oma käed ja ravitav piirkond leebe seebi ja veega. Kuivatage hoolikalt.
2. Avage uus kotike ja pigistage veidi kreemi oma sõrmeotsale.
3. Hõõruge õhuke kiht Aldara kreemi kahjustatud kohale ja 1 cm ümberringi. Hõõruge ettevaatlikult, kuni kreem on nahka imendunud.
4. Visake avatud kotike pärast kreemi pealekandmist ära ja peske käed vee ja seebiga.
5. Laske Aldara kreem umbes 8 tunniks nahale. Selle aja jooksul ärge käige vannis ega duši all.
6. Pärast 8 tundi peske nahk, kuhu kreem on kantud, leebe seebi ja veega.

Kandke kuue nädala jooksul iga nädal, viis päeva järjest iga päev piisavalt Aldara kreemi, et katta ravitav ala ja 1 sentimeeter ümber ravitava ala. Kandke kreem näiteks esmaspäevast reedeni. Laupäeval ja pühapäeval ärge kreemi kandke.

● Kui teid ravitakse aktiivse keratoosi vastu:

Kasutusjuhised – (esmasp, kolmap, reede)

1. Enne magamaminekut peske käed ja ravitav ala leebe seebi ja veega. Kuivatage hoolikalt.
2. Avage uus kotike ja pigistage veidi kreemi sõrmeotsale.
3. Hõõrge õhuke kiht Aldara kreemi kahjustatud kohale. Hõõrge ettevaatlikult, kuni kreem on nahka imendunud.
4. Visake avatud kotike pärast kreemi pealekandmist ära ja peske käed vee ja seebiga.
5. Laske Aldara kreem umbes 8 tunniks nahale. Selle aja jooksul ärge käige vannis ega duši all.
6. Pese 8 tunni pärast kreemi pealekandmise koht leebe seebi ja veega.

Kandke Aldara kreemi kolm korda nädalas. Näiteks kandke kreemi esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Üks kotike on piisav, et katta nahapiirkond suurusega 25 cm². Jätkake kreemi kasutamist neli nädalat. Neli nädalat pärast selle esimese ravi lõppu hindab teie arst teie nahka. Kui kõik kahjustused pole kadunud, võib olla vajalik veel neli nädalat ravi. vajalik.

Loputage üleliigne kreem leebe seebi ja veega maha. Kui nahareaktsioon on kadunud, võite ravi jätkata. Kui neelate kogemata Aldara kreemi alla, võtke kohe ühendust oma perearstiga.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Kui unustate annuse, kandke see kohe, kui meelde tuleb, ja jätkake seejärel oma tavapäraselt. Kui te unustate annuse, peate selle manustama niipea, kui te sellest aru saate, seejärel peate te ennast. Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti

või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sagedus on jaotatud järgmiselt:

Väga sagedased kõrvaltoimed (esinevad tõenäoliselt rohkem kui 1-l 10-st patsiendist)

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad tõenäoliselt vähem kui 1-l 10-st patsiendist)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad tõenäoliselt vähem kui 1-l 100-st patsiendist)

Mõnikord esinevad kõrvaltoimed (tõenäoliselt esinevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st)

Harva esinevad kõrvaltoimed (tõenäoliselt esinevad vähem kui 1-l patsiendil 1000-st)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (tõenäoliselt esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st patsiendist).

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi neid esineda.

Teavitage oma arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik, kui tunnete end halvasti perioodil, mil kasutate Aldara kreemi.

Mõnel patsiendil esinesid muutused naha värvuses piirkonnas, kuhu Aldara kreemi oli kantud. Kuigi need muutused vähenevad tavaliselt aja jooksul, vähendama, peate ravi katkestama, pesema ravipiirkonda leebe seebi ja veega ning võtma ühendust oma arsti või apteekriga. Mõnel patsiendil on täheldatud kergest trombotsüütide arvu langust. Trombotsüütide arvu langus võib

teha teid vastuvõtlikumaks infektsioonidele või kergemini tekkivatele sinikatele. Samuti võib esineda väsimust. Teavitage oma arsti, kui need sümptomid ilmnevad. Mõnel immuunpuudulikkusega patsiendil võib nende haigus süveneda. Kas teil on immuunpuudulikkus

ja kasutate Aldara kreemi? Teavitage oma arsti, kui esinevad muutused. Tõsiseid nahareaktsioone on harva teatatud. Kui leiate oma nahalt väikseid haavandeid või väikseid punaseid laike, mis arenevad edasi, võimalike sümptomitega nagu sügelus, palavik, gripilaadsed sümptomid, võtke ühendust oma arstiga. tunne, valulikud liigesed, nägemisprobleemid, valu neelamisel, valu või sügelevad silmad või haavandid suus, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Väikesel arvul patsientidel esineb juuste väljalangemist ravi piirkonnas või selle ümbruses.

● Kui teid ravitakse suguelundite tüügaste vastu:

Paljud Aldara kreemi soovimatud kõrvaltoimed on põhjustatud selle lokaalsest toimest teie nahal.

Väga sagedased kõrvaltoimed on punetus (61% patsientidest), naha õhenemine (30% patsientidest), ketendus ja turse. Nahaalune kõvenemine, väikesed avatud haavandid, koorikud nagu need, mis tekivad normaalse haavade paranemise ajal, ja väikesed villid naha all võivad esineda. Pärast Aldara kreemi pealekandmist võib teil esineda sügelus (32% patsientidest), põletustunne (26% patsientidest) või valu (8% patsientidest) kohtades, kuhu kreemi kanti. Enamik neist nahareaktsioonidest on kerged ja nahk taastub umbes kaks nädalat pärast ravi lõpetamist. Sageli esineb mõnel patsiendil (4% või vähem) peavalu, mõnikord palavik ja gripilaadsed

sümptomid, liigese- ja lihasvalu, emaka prolaps; naistel valu vahekorra ajal; erektsioonihäired; suurenenud higistamine; iiveldus; mao- ja soolehäired; tinnitus; punetus; väsimus; pearinglus; migreen; jäsemete suremine; unetus; depressioon; vähenenud söögiisu; paistes lümfisõlmed; bakteriaalsed, viiruslikud ja seeninfektsioonid (nt haavandid); tupeinfektsioon valgevoolusega; köha ja külmetus koos kurguvalu on teatatud. seeninfektsioonid (nt haavandid); tupeinfektsioon valgevoolusega; köha ja külmetus koos kurguvalu teatatud.

Väga harva on esinenud tõsiseid ja valulikke reaktsioone, eriti kui on kantud rohkem kreemi kui soovitatud. Väga harvadel juhtudel oli naistel raske naistel raske kohe pöörduma arsti poole. ● Kui teid ravitakse basaarakulise kartsinoomi vastu:

Paljud Aldara kreemi kõrvaltoimed on põhjustatud kohalikust toimest nahale.

Kohalikud nahareaktsioonid võivad olla märk sellest, et ravim toimib ettenähtud viisil. Väga sageli esinev kõrvaltoime on see, et ravitud nahk kergelt sügeleb.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on jäsemete suremine, väikesed nahaturset, valu,

põletustunne, ärritus, veritsus, punetus või lööve. Kui nahareaktsioon ravi ajal muutub liiga ebameeldivaks, rääkige oma arstiga. Tema võib soovitada Aldara kreemi kasutamise mõneks päevaks katkestada (s.t. teha lühike paus ravis). Kui esineb mäda (mäda) või mõni muu sümptom, mis viitab infektsioonile, arutage seda oma arstiga. Lisaks nahareaktsioonidele on muud sageli

esinevad kõrvaltoimed paistes lümfisõlmed ja seljavalu. Mõnikord kogevad mõned patsiendid muutusi manustamiskohas (eritised, põletik,

turse, koorikute teke, naha lagunemine, villid, dermatiit) või ärrituvust, iiveldust, suukuivust, gripilaadseid sümptomeid ja väsimust. ● Kui teid ravitakse aktiinilise keratoosi vastu: suu, gripilaadsed sümptomid ja väsimus.

● Kui teid ravitakse aktiinilise keratoosi vastu:

Paljud Aldara kreemi kõrvaltoimed on põhjustatud selle lokaalsest toimest nahale. Kohalikud nahareaktsioonid võivad olla märk sellest, et ravim toimib ettenähtud viisil.

Väga sageli esinev kõrvaltoime on see, et töödeldud nahk kergelt sügeleb.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on valu, põletustunne, ärritus või punetus. Kui nahareaktsioon ravi ajal muutub liiga ebameeldivaks, rääkige oma arstiga. Tema võib soovitada Aldara kreemi kasutamise mõneks päevaks katkestada (s.t. teha lühike paus ravis). Kui esineb mäda (mäda) või mõni muu sümptom, mis viitab infektsioonile, arutage seda oma arstiga. Lisaks nahareaktsioonidele on muud sageli esinevad kõrvaltoimed peavalu, anoreksia, iiveldus, lihasvalu, liigesevalu ja väsimus.

Mõnikord kogevad mõned patsiendid muutusi manustamiskohas (verejooks, põletik, eritised, tundlikkus, turse, väikesed paistes nahapiirkonnad, jäsemete suremine, ketendus, armistumine, haavandid või sooja- või ebamugavustunne) või nina sisemuse põletikku, nohu, grippi või gripilaadseid sümptomeid, depressiooni, silmärritust, paistes silmalaug, kurguvalu, kõhulahtisus, aktiiniline keratoos, punetus, paistes nägu, haavandid, valu jäsemetes, palavik, nõrkus või külmavärinad. Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse võimalikud kõrvaltoimed, mida selles pakendi infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest võite teatada ka otse meie kaudu aidata saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta. riiklikku teavitussüsteemi, nagu on märgitud lisas V. Tehes kõrvaltoimetest teatamisega, saate

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril alla 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud karbil ja etiketil pärast "EXP".. Seal on märgitud kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp. Avatud kotikesi ei tohi uuesti kasutada. Ärge visake ravimeid kraanikaussi ega WC-sse ning ärge visake neid prügikasti. Küsige oma

Küsige oma õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave õige.

Selle ravimi toimeaine on imikvimood. Iga kotike sisaldab 250 mg kreemi (100 mg kreemi Millised ained on selles ravimis?

- Selle ravimi toimeaine on imikvimood. Iga kotike sisaldab 250 mg kreemi (100 mg kreemi sisaldab 5 mg imikimoodi).
- Selle ravimi teised ained on koostisosad isosteariinhape, bensüülalkohol, setüülalkohol, stearüülalkohol, pehme valge parafiin, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, glütserool, nmetüülhüdrosübensoaat (E218), propüülhüdrosübensoaat (E216), ksantaankumm, puhastatud vesi. (Vt ka jaotis 2 „Aldara kreem sisaldab metüülhüdrosübensoaat,
- propüülhüdrosübensoaat (E216), setüülalkohol, ja stearüülalkohol ja bensüülalkohol“)

Kuidas Aldara kreem välja näeb ja kui palju on pakendis?

- Iga Aldara kreemi 5% kotike sisaldab 250 mg valget kuni helekollast kreemi.
- Iga karp sisaldab 12 või 24 polüester/alumiiniumfoolium kotikest ühekordseks kasutamiseks. Võib olla mitte kõik pakendi suurused ei ole turul saadaval.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Viartis Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Iirimaa

Tootja

Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Saksamaa

Kõigi selle ravimi kohta käivate küsimuste korral võtke ühendust kohaliku müügiloa hoidja esindajaga:

Belgia
Viartis
Tel: +32 2 658 61 00

Viartis
Tel: +32 2 658 61 00
(Belgia)

Bulgaaria
Mylan EOOD
Tel: +359 2 44 55 400

Ungari
Viartis Healthcare Kft.
1138 Budapest
Váci út 150

Luksemburg

Tel: +36 1 465 2100

Tšehhi Vabariik
Viatrix CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

Taani
Viatrix ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Saksamaa
Viatrix Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Holland
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

Norra
Viatrix AS
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
33

Eesti
Viatrix OÜ
Tel: +372 63 63 052
Ελλάδα
Viatrix Hellas Ltd
Τηλ: +30 210 010 0002

España
Viatrix Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, 5ª planta
08038 - Barcelona
Tel: +34 900 102 712

France
Viatrix Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Tél: +33 (0)1 40 80 15 55

Horvaatia
Viatrix Horvaatia d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 235 059 90

Iirimaa
Viatrix Limited
Tel: +353 1 8711600
Island
Icepharma hf
Tel: +354 540 8000

Itaalia
Viatrix Itaalia
Via Vittor Pisani,
2020124 Milano
Tel: +39 (0) 2 612 46921

Küpros
CPO Pharmaceuticals Limited
Tel: +357 22863100

Läti
Viatrix SIA
101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Tel: +371 67616137
Tel: +47 66 75 33 00

Austria
Viatrix Austria GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien
Tel: + 43 (0)1 86 390

Poola
Viatrix Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Tel: +48 22 546 6400

Portugal
Viatrix Healthcare, Lda.
Av. D. João II,
Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa
Tel: +351 214 127 200

Rumeenia
BGP PRODUCTS SRL
Tel.: +40372 579 000

Sloveenia
Viatriis d.o.o.
Tel: +386 1 23 63 180

Slovakkia Vabariik
Viatriis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100
Soome

Viatriis Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Rootsi
Viatriis AB
Box 23033
104 35 Stockholm
+46 (0) 8 630 19 00

Leedu
Viatriis UAB
Žalgirio str. 90-100
Vilnius LT-09303
Tel. + 370 52051288

Seda pakendi infolehte uuendati viimati
Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa veebisaidilt
Ravimiamet (<http://www.ema.europa.eu>).