

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Aldara 5 % voide

Imikimodi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka mainitaan kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Tämän pakkausselosteen sisältö:

1. Mitä Aldara-voide on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset.
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Aldara-voide on ja mihin sitä käytetään?

Aldara-voidetta voidaan käyttää kolmen eri sairauden hoitoon. Lääkärisi voi määrätä Aldara-voidetta seuraavien hoitoon:

● Syylät (condylomata acuminata), jotka sijaitsevat sukupuolielinten ulkopuolella ja peräaukon ympärillä (pakaroiden välissä).

● Pinnallinen tyvisolusyöpä.

Tämä on yleinen ja hitaasti kasvava ihosyövän muoto, joka on erityisen epätodennäköistä leviävän muihin kehon osiin. Yleensä tämä sairaus esiintyy keski-ikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä, erityisesti vaaleaihaisilla potilailla. Tauti johtuu liiallisesta altistumisesta auringolle. Jos tyvisolusyöpä jää hoitamatta, se voi aiheuttaa epämuodostumia, erityisesti kasvoissa. Tästä syystä on tärkeää, että sairaus havaitaan ja hoidetaan varhaisessa vaiheessa.

● Aktiivinen keratoosi

Aktiiviset keratoosit ovat karheita kohtia iholla, joka on altistunut liiallisesti auringolle potilaan elämän aikana. Kohdat voivat olla ihonvärisiä, mutta myös harmaa, vaaleanpunainen, punainen tai ruskea voi esiintyä. Kohdat voivat olla karheita, hilseileviä, kovia, syylämäisiä, litteitä tai ihon tasolla olevia. Aldaraa voidaan käyttää vain litteisiin aktiivisiin keratooseihin kasvoissa tai päänahassa. Potilaalla tulee olla terve immuunijärjestelmä ja lääkärin tulee olla todennut, että Aldara on sopivin hoito sinulle.

Aldara-voide auttaa kehosi immuunijärjestelmää tuottamaan luonnollisia aineita, jotka auttavat taistelemaan tyvisolusyöpää, aktiivista keratoosia tai virusta vastaan, joka on aiheuttanut syyläsi.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät kohdasta 6.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

o Jos olet aiemmin käyttänyt Aldara-voidetta tai muita vastaavia hoitoja, sinun tulee ilmoittaa siitä lääkärillesi ennen tämän hoidon aloittamista.

o Jos sinulla on immuunijärjestelmän häiriö.

o Jos olet saanut elinsiirron.

o Käytä Aldara-voidetta vasta, kun hoidettava alue on parantunut aiemman lääkehoidon tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen.

o Vältä kosketusta silmien, huulten ja sierainten kanssa. Jos kosketus tapahtuu vahingossa, poista voide huuhtelemalla vedellä.

o Älä levitä voidetta sisäisesti.

o Älä käytä enempää voidetta kuin lääkärisi on suositellut.

o Älä peitä hoidettua aluetta laastareilla tai muilla sidoksilla sen jälkeen, kun olet levittänyt Aldara-voidetta.

o Jos hoidettu alue aiheuttaa liikaa vaivaa, pese voide pois miedolla saippualla ja vedellä. Kun ihoreaktiot ovat hävinneet, voit jatkaa hoitoa.

o Kerro lääkärillesi, jos sinulla on poikkeavia verikokeiden tuloksia.

Aldaran vaikutusmekanismin vuoksi on mahdollista, että voide pahentaa olemassa olevaa tulehdusta hoidetulla alueella.

● Jos sinua hoidetaan genitaalisyylä varten, noudata näitä lisävarotoimia:

- Miehet, jotka haluavat hoitaa syyliä esinahan alla, tulee vetää esinahka taaksepäin ja pestä tämä ihoalue päivittäin.
- Jos esinahkaa ei pestä päivittäin, on riski kaventumiselle, turvonneelle tai ohenevalle esinahalle tai esinahan taakse vetämisen vaikeutumiselle. Jos yksi tai useampi näistä oireista ilmenee, lopeta hoito välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos sinulla on avohaavoja: Älä käytä Aldara-voidetta ihoalueilla, joilla on avohaavoja, ennen kuin ne ovat parantuneet.
- Jos sinulla on sisäisiä syyliä: Älä käytä Aldara-voidetta virtsaputkessa, emättimessä, kohdunkaulassa tai peräaukossa.

Jos sinulla on vakavia immuunijärjestelmän ongelmia sairauden tai käyttämiesi lääkkeiden vuoksi, saat käydä vain yhden hoidon Aldara-voiteella. Jos epäilet, että tämä koskee sinua, ota yhteys lääkäriin. Jos olet HIV-positiivinen, kerro siitä lääkärillesi, sillä on osoitettu, että Aldara-voide on vähemmän tehokas näillä potilailla. Jos päätät harrastaa seksiä, kun sinulla on vielä syyliä, levitä Aldara-voide seksuaalisen toiminnan jälkeen - ei ennen sitä.

Aldara-voide voi vaikuttaa kondomeihin ja pessareihin,

siksi voidetta ei saa jättää paikalleen seksuaalisen toiminnan aikana. Muista, että Aldara-voide ei suojaa HIV:n tai muiden sukupuolitautilien tarttumiselta toiselle henkilölle.

● Jos sinua hoidetaan tyvisolusyöpää tai aktiivista keratoosia varten, noudata näitä lisävarotoimia:

Älä mene solariumiin tai käytä aurinkolamppua ja vältä auringonvaloa mahdollisimman paljon Aldara-voiteen käytön aikana. Käytä suojavaatteita ja leveälieristä hattua ulkona ollessasi. Aldara-voiteen käytön aikana ja kunnes paraneminen on tapahtunut, hoidettu alue näyttää huomattavasti erilaiselta kuin normaali iho.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta
Lasten ja nuorten käyttöä ei suositella.

Käytättekö muita lääkkeitä?

Käytättekö Aldara-voidetta muiden lääkkeiden kanssa, oletteko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että käytätte pian muita lääkkeitä? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Ei ole tunnettuja lääkkeitä, jotka olisivat yhteensopimattomia Aldara-voiteen kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkariltasi neuvoa ennen lääkkeen käyttöä.

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekariisi ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi keskustelee kanssasi Aldara-voiteen käytön riskeistä ja hyödyistä raskauden aikana. Eläinkokeiden tulokset eivät viittaa suoraan tai epäsuoraan haitalliseen vaikutukseen raskauden aikana.

Älä imetä Aldara-voiteen käytön aikana, koska ei tiedetä, erittyykö imikimodi äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Aldara-voide sisältää metyylihydroksibentsoattia, propyylihydroksibentsoattia (E216), setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia. Metyylihydroksibentsoatti (E 218) ja propyylihydroksibentsoatti (E 216) voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). Setyylialkoholi ja stearyylialkoholi voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. ihottumaa).

Tämä valmiste sisältää 5 mg bentsyylialkoholia jokaisessa annospussissa. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallista ärsytystä.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta:

Lasten ja nuorten käyttöä ei suositella.

Aikuiset:

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi tai apteekkarisi ohjeiden mukaisesti.

Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekariisi.

Pese kätesi huolellisesti ennen voiteen levittämistä ja sen jälkeen. Peitä käsitelty alue ei siteillä tai muilla sidoksilla sen jälkeen, kun olet levittänyt Aldara-voidetta.

Käytä joka kerta, kun levität voidetta, uusi pussi. Hävitä käytön jälkeen ylimääräinen voide, joka jää levityksen jälkeen. Älä säilytä avattua pussia toista päivää varten.

Hoitojen tiheys ja kesto genitaalivilloille, tyvisolusyövälle ja aktiiniselle keratoosille eroavat toisistaan (katso erityiset ohjeet kullekin indikaatiolle).

Ohjeet Aldara-voiteen levittämiseen

● Kun sinua hoidetaan genitaalivilloille:

Ohjeet levittämiseen – (ma, ke ja pe)

1. Ennen nukkumaanmenoa pese kätesi ja hoidettava alue miedolla saippualla ja vedellä. Kuivaa huolellisesti.
2. Oavaa uusi pussi ja purista hieman voidetta sormenpäähän
3. Hiero ohut kerros Aldara-voidetta puhtaille kuiville villoille ja hiero varovasti, kunnes voide on imeytynyt villaan.
4. Hävitä avattu pussi voiteen levittämisen jälkeen ja pese kätesi vedellä ja saippualla.
5. Anna Aldara-voiteen vaikuttaa villoilla 6–10 tuntia. Älä kylve tai käy suihkussa tänä aikana. kylpy tai suihku.
6. 6–10 tunnin kuluttua iho, jolle voide on levitetty, on pestävä miedolla saippualla ja vedellä puhdistettava.

Levitä Aldara-voidetta kolme kertaa viikossa. Levitä esimerkiksi voidetta maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Yksi annospussi sisältää tarpeeksi voidetta peittämään 20 cm² kokoisen syyliäaluetta. peittämään.

Miehet, joilla on syyliä esinahan alla, tulee vetää esinahka taaksepäin päivittäin ja pestä koko alue (katso kohta 2 "Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?")

Jatka Aldara-voiteen käyttöä, kunnes syyliät ovat kokonaan hävinneet (puolella naisista kaikki syyliät häviävät 8 viikossa, puolella miehistä 12 viikossa, joillakin potilailla syyliät voivat hävitä jo 4 viikossa). Älä käytä Aldara-voidetta pidempään kuin 16 viikkoa kutakin (uutta) syyliähoitoa varten.

Jos sinusta tuntuu, että Aldara-voiteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele siitä lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. ● Kun sinua hoidetaan tyvisolusyöpään:

Käyttöohjeet – (ma, ti, ke, to ja pe)

Ennen nukkumaanmenoa pese kätesi ja hoidettava alue miedolla saippualla ja vedellä.

1. Kuivaa huolellisesti. Avaa uusi annospussi ja purista hieman voidetta sormenpäähän.
2. Hiero ohut kerros Aldara-voidetta vaurioituneelle alueelle ja 1 cm sen ympärille. Hiero varovasti, kunnes
3. voide on imeytynyt ihoon. voide on imeytynyt ihoon.
4. Hävitä avattu pussi voiteen levittämisen jälkeen ja pese kätesi vedellä ja saippualla.
5. Anna Aldara-voiteen vaikuttaa iholla noin 8 tuntia. Älä kylve tai käy suihkussa tänä aikana.
6. Pese 8 tunnin kuluttua iho, jolle voide on levitetty, miedolla saippualla ja vedellä.

Levitä kuuden viikon ajan joka viikko, viitenä peräkkäisenä päivänä päivittäin riittävästi Aldara-voidetta peittämään hoidettava alue ja 1 senttimetri hoidettavan alueen ympäriltä. Levitä voidetta esimerkiksi maanantaista perjantaihin. Lauantaina ja sunnuntaina älä levitä voidetta.

● Kun sinua hoidetaan aktiivisen keratoosin vuoksi:

Käyttöohjeet – (ma, ke, pe)

1. Ennen nukkumaanmenoa pese kätesi ja hoidettava alue miedolla saippualla ja vedellä. Kuivaa huolellisesti.
2. Avaa uusi pussi ja purista hieman voidetta sormenpäähän.
3. Hiero ohut kerros Aldara-voidetta vaurioituneelle alueelle. Hiero varovasti, kunnes voide on imeytynyt ihoon. on vedetty.
4. saippualla. Anna Aldara-voiteen vaikuttaa iholla noin 8 tuntia. Älä kylve tai
5. käy suihkussa tänä aikana. suihku.
6. Pese 8 tunnin kuluttua iho, jolle voide on levitetty, miedolla saippualla ja vedellä.

Levitä Aldara-voidetta kolme kertaa viikossa. Levitä voidetta esimerkiksi maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Yksi annospussi riittää peittämään 25 cm² kokoisen ihoalueen. Jatka voiteen käyttöä neljän viikon ajan. Neljä viikkoa tämän ensimmäisen hoidon päättymisen jälkeen lääkärisi arvioi ihosi. Jos kaikki leesiot eivät ole hävinneet, saattaa olla tarpeen jatkaa hoitoa vielä neljä viikkoa. tarvitaan.

Huuhtelee ylimääräinen voide pois miedolla saippualla ja vedellä. Kun ihoreaktio on hävinnyt, voit jatkaa hoitoa. Jos nielet vahingossa Aldara-voidetta, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohdat annoksen, levitä se heti kun muistat, ja jatka sitten normaalia aikatauluasi. Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset tai apteekkari.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyvät todennäköisesti useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät todennäköisesti harvemmallalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

Joskus haittavaikutukset (esiintyvät todennäköisesti harvemmallalla kuin 1 potilaalla 100:sta)

Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät todennäköisesti alle 1 potilaalla 10:stä)

Joskus haittavaikutuksia (esiintyy todennäköisesti alle 1 potilaalla 100:sta)

Harvinaisia sivuvaikutuksia (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 1000 potilaasta)

Erittäin harvinaisia sivuvaikutuksia (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 10 000 potilaasta).

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla sivuvaikutuksia, vaikka kaikille niitä ei ilmene. Ilmoita lääkäriillesi tai apteekkarillesi mahdollisimman pian, jos tunnet olosi huonoksi aikana, jolloin käytät Aldara-voidetta.

Joillakin potilailla on havaittu muutoksia ihon värissä alueella, johon Aldara-voidetta oli levitetty. Vaikka nämä muutokset yleensä ajan myötä vähenevät, ne voivat joillakin potilailla olla pysyviä. Jos ihosi reagoi voimakkaasti Aldara-voiteen käyttöön, sinun tulee lopettaa hoito, pestä hoitoalue miedolla saippualla ja vedellä, ja ottaa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi. Joillakin potilailla on havaittu lievää verihutaleiden laskua. Verihutaleiden lasku voi tehdä sinut alttiimmaksi infektioille tai helpommin mustelmille. Myös

väsymystä voi esiintyä. Kerro lääkärillesi, jos näitä oireita ilmenee. Joillakin potilailla, joilla on immuunijärjestelmän häiriö, heidän sairautensa voi pahentua. Onko sinulla immuunijärjestelmän häiriö ja käytät Aldara-voidetta? Kerro lääkärillesi, jos muutoksia ilmenee.

Vakavia ihoreaktioita on harvoin raportoitu. Jos huomaat pieniä haavoja ihollasi tai pieniä punaisia pieniä läiskiä, jotka kehittyvät edelleen, mahdollisesti oireina kutina, kuume, flunssan kaltainen Vakavia ihoreaktioita on raportoitu harvoin. Jos huomaat pieniä haavoja ihollasi tai pieniä punaisia pieniä kohtia, jotka kehittyvät edelleen, mahdollisesti oireina kutina, kuume, flunssan kaltainen olo tunne, kipeät nivelet, näköongelmat, kipu nielemisen yhteydessä, kipu tai kutisevat silmät tai haavaumat suussa, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Pieni määrä potilaita kärsii hiustenlähdistä hoitoalueella tai sen ympärillä.

● Kun sinua hoidetaan sukupuolielinten syyliä varten:

Monet Aldara-voiteen ei-toivotuista sivuvaikutuksista johtuvat sen paikallisesta vaikutuksesta ihollasi.

Hyvin yleisiä sivuvaikutuksia ovat punoitus (61 % potilaista), ihon oheneminen (30 % potilaista), hilseily ja turvotus. Ihon alla voi esiintyä kovettumia, pieniä avohaavoja, rupia kuten normaalin haavan paranemisen aikana ja pieniä rakkuloita ihon alla. Aldara-voiteen levittämisen jälkeen voi esiintyä kutinaa (32 % potilaista), polttavaa tunnetta (26 % potilaista) tai kipua (8 % potilaista) alueilla, joille voidetta on levitetty. Suurin osa näistä iho-oireista on lieviä ja iho paranee noin kahden viikon kuluttua hoidon lopettamisesta.

Joillakin potilailla (4 % tai vähemmän) esiintyy usein päänsärkyä, joskus kuumetta ja flunssan kaltaisia oireita, nivel- ja lihaskipuja, kohdun laskeumaa; naisilla kipua yhdynnän aikana; erektiohäiriöitä; lisääntynyttä hikoilua; pahoinvointia; maha- ja suolisto-ongelmia; korvien soimista; punastumista; väsymystä; huimausta; migreeniä; puutuneita raajoja; unettomuutta; masennusta; ruokahaluttomuutta; turvonneita rauhasia; bakteeri-, virus- ja sieni-infektioita (esim. haavaumia); emätintulehdus valkovuodolla; yskää ja vilustumista kurkkukivulla raportoitu. kurkkukipu raportoitu.

Hyvin harvoin on esiintynyt vakavia ja kivuliaita reaktioita, erityisesti kun voidetta on levitetty enemmän kuin suositellaan. Hyvin harvinaisissa tapauksissa oli naisilla vaikeuksia virtsata kivuliaiden ihoreaktioiden vuoksi emättimen aukon alueella. Jos näin on, sinun tulee hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

● Kun sinua hoidetaan tyvisolusyövän vuoksi:

Monet Aldara-voiteen sivuvaikutuksista johtuvat paikallisesta vaikutuksesta ihoon. Paikalliset ihoreaktiot voivat olla merkki siitä, että lääke toimii tarkoitetulla tavalla.

Hyvin yleinen sivuvaikutus on, että hoidettu iho kutisee hieman.

Yleisiä sivuvaikutuksia ovat raajojen puutuminen, pienet ihon turvotukset, kipu, polttava tunne, ärsytys, verenvuoto, punoitus tai ihottuma. Jos ihoreaktio hoidon aikana muuttuu liian epämiellyttäväksi, keskustele lääkärisi kanssa. Hän voi neuvoa sinua lopettamaan Aldara-voiteen käytön muutamaksi päiväksi (eli pitämään lyhyen tauon hoidossa). Jos esiintyy märkää (mätä) tai muuta oiretta, joka viittaa infekioon, keskustele siitä lääkärisi kanssa. Ihoreaktioiden lisäksi muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat turvonneet imusolmukkeet ja selkäkipu. Joskus jotkut potilaat kokevat muutoksia levityskohdassa (erite, tulehdus,

turvotus, rupi, ihon hajoaminen, rakkulat, ihottuma) tai ärtyneisyyttä, pahoinvointia, suun kuivumista, flunssan kaltaisia oireita ja väsymystä. ● Kun sinua hoidetaan aktiivisen keratoosin vuoksi: suu, flunssan kaltaiset oireet ja väsymys.

● Kun sinua hoidetaan aktiiviselle keratoosille:

Monet Aldara-voiteen sivuvaikutuksista johtuvat paikallisesta vaikutuksesta ihoon. Paikalliset ihoreaktiot voivat olla merkki siitä, että lääke toimii tarkoitetulla tavalla.

Hyvin yleinen sivuvaikutus on, että käsitelty iho kutisee hieman.

Yleisiä sivuvaikutuksia ovat kipu, polttava tunne, ärsytys tai punoitus.

Jos ihoreaktio hoidon aikana muuttuu liian epämiellyttäväksi, keskustele lääkärisi kanssa. Hän voi neuvoa sinua lopettamaan Aldara-voiteen käytön muutamaksi päiväksi (eli pitämään lyhyen tauon hoidossa).

Jos esiintyy märkää (mätä) tai muuta infektion oiretta, keskustele tästä lääkärisi kanssa.

Ihoreaktioiden lisäksi muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat päänsärky, anoreksia, pahoinvointi, lihaskipu, nivelkipu ja väsymys.

Joskus jotkut potilaat kokevat muutoksia levityskohdassa (verenvuoto, tulehdus, erityy, arkuus, turvotus, pienet turvonneet ihoalueet, raajojen puutuminen, hilseily, arpeutumisen, haavaumat tai lämmön tai epämukavuuden tunne) tai nenän sisäosan tulehdus, vuotava nenä, flunssa tai flunssan kaltaiset oireet, masentuneisuus, silmä-ärsytys, turvonnut silmäluomi, kurkkukipu, ripuli, aktiivinen keratoosi, punoitus, turvonnut kasvot, haavaumat, kipu raajoissa, kuume, heikkous tai vilunväristykset.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta. kansalliseen ilmoitusjärjestelmään, kuten liitteessä V on mainittu. Ilmoittamalla haittavaikutuksista, voitte

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta ja etiketistä merkinnän "EXP" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä. Avaamisen jälkeen pusseja ei saa käyttää uudelleen. Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin.

Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeet oikealla tavalla, ne tuhotaan vastuullisesti eikä niitä päädy ympäristöön. oikein.

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on imikimodi. Jokainen pussi sisältää 250 mg voidetta (100 mg voidetta

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on imikimodi. Jokainen annospussi sisältää 250 mg voidetta (100 mg voidetta sisältää 5 mg imikimodia).
- Tämän lääkkeen muut aineet ovat isosteariinihappo, bentsyylialkoholi,
- setyylialkoholi, stearyylialkoholi, pehmeä valkoinen parafiini, polysorbaatti 60, sorbitaanistearaatti, glyseroli, n-metyyli parahydroksibentsoaatti (E218), propyyli parahydroksibentsoaatti (E216), ksantaanikumi, puhdistettu vesi. (Katso myös kohta 2 "Aldara-voide sisältää metyyli parahydroksibentsoaattia,
- propyyli parahydroksibentsoaattia (E216), setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia")

Miltä Aldara-voide näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

- Jokainen Aldara-voide 5% -sachet sisältää 250 mg valkoista tai vaaleankeltaista voidetta.
- Jokainen laatikko sisältää 12 tai 24 polyesteri/alumiinifolio-sachettia kertakäyttöön. On mahdollista, että kaikkia pakkauskokoja ei ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlanti

Valmistaja
Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Saksa

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiluvan haltijan edustajaan saadaksesi lisätietoja tästä lääkkeestä:

Belgia
Viatris

Puh: +32 2 658 61 00

Bulgaria
Mylan EOOD
Puh: +359 2 44 55 400

Luxemburg
Viatri
Puh: +32 2 658 61 00
(Belgia)

Unkari
Viatri Healthcare Kft.
1138 Budapest
Váci út 150
Tel: +36 1 465 2100

Tšekin tasavalta
Viatri CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

Tanska
Viatri ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Saksa
Viatri Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Alankomaat
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

Norja
Viatri AS
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
33

Eesti
Viatri OÜ
Puh: +372 63 63 052
Ελλάδα

Viatri Hellas Ltd
Puh: +30 210 010 0002

España
Viatri Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, 5ª planta
08038 - Barcelona
Puh: +34 900 102 712

Ranska
Viatri Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Puh: +33 (0)1 40 80 15 55

Kroatia
Viatri Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagreb
Puh: +385 1 235 059 90

Irlanti
Viatri Limited
Puh: +353 1 8711600
Islanti
Icepharma hf
Puh: +354 540 8000

Italia
Viatri Italia
Via Vittor Pisani,
2020124 Milano
Puh: +39 (0) 2 612 46921

Kypros
CPO Pharmaceuticals Limited
Puh: +357 22863100

Latvia
Viatri SIA
101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Puh: +371 67616137
Puh: +47 66 75 33 00

Itävalta
Viatri Austria GmbH

Guglgasse 15
1110 Wien
Puh: + 43 (0)1 86 390

Puola
Viatri Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Varsova
Puh: +48 22 546 6400

Portugali
Viatri Healthcare, Lda.
Av. D. João II,
Edifício Atlantis, n° 44C – 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa
Tel: +351 214 127 200

România
BGP PRODUCTS SRL
Tel.: +40372 579 000

Slovenija

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty
Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla Euroopan
lääkeviraston verkkosivustolla (<http://www.ema.europa.eu>).

Viatri d.o.o.
Tel: +386 1 23 63 180

Slovenská republika
Viatri Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100
Suomi/Finland
Viatri Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Sverige
Viatri AB
Box 23033
104 35 Stockholm
+46 (0) 8 630 19 00

Liettua
Viatri UAB
Žalgirio str. 90-100
Vilna LT-09303
Puh. + 370 52051288