

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Aldara 5 % kremas

Imikvimodas

Atidžiai perskaitykite visą šį pakuotės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jeigu turite klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, apie kurį nėra paminėta 4 skyriuje, arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys:

1. Kas yra Aldara kremas ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis.
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Aldara kremas ir kam jis vartojamas?

Aldara kremas gali būti naudojamas trims skirtingoms ligoms gydyti. Jūsų gydytojas gali skirti Aldara kremą gydyti:

● Karpos (condylomata acuminata), esančios išoriniuose lytiniuose organuose ir aplink išangę (tarp sėdmenų).

● Paviršinis bazalinių ląstelių karcinoma.

Tai yra dažna ir lėtai auganti odos vėžio forma, kuri labai retai išplinta į kitas kūno dalis. Paprastai ši liga pasireiškia vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonėms, ypač pacientams su šviesia oda. Liga sukelia per didelį saulės poveikį. Jei bazalinių ląstelių karcinoma nėra gydoma, ji gali sukelti deformacijas, ypač veide. Dėl šios priežasties svarbu, kad liga būtų anksti aptikta ir gydoma.

● Aktininė keratozė

Aktinės keratozės yra šiurkštūs odos plotai, kurie buvo per daug veikiami saulės per paciento gyvenimą. Plotai gali būti odos spalvos, bet taip pat gali būti pilki, rožiniai, raudoni arba rudi. Plotai gali būti šiurkštūs, pleiskanojantys, kieti, karpų pavidalo, plokšti arba ant odos paviršiaus. Aldara gali būti naudojama tik plokščioms aktininėms keratozėms ant veido ar galvos odos. Pacientas turi turėti sveiką imuninę sistemą, o gydytojas turi nustatyti, kad Aldara yra tinkamiausias gydymas jums.

Aldara kremas padeda jūsų kūno imuninės sistemos gaminti natūralias medžiagas, kurios padeda kovoti su jūsų bazalinių ląstelių karcinoma, aktinine keratoze arba virusu, kuris sukėlė jūsų karpos.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Jūs esate alergiškas bet kuriai šio vaisto sudedamajai daliai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Kada reikia būti ypač atsargiems su šiuo vaistu?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

o Jei anksčiau vartojote Aldara kremą ar kitus panašius vaistus gydymui, praneškite apie tai savo gydytojui prieš pradėdant šį gydymą.

o Jei turite imuninės sistemos sutrikimą.

o Jei jums buvo atlikta organų transplantacija.

o Naudokite Aldara kremą tik tada, kai gydoma sritis yra išgijusi po ankstesnio gydymo vaistais ar chirurginės procedūros.

o Venkite kontakto su akimis, lūpomis ir nosies šnervėmis. Atsitiktinio kontakto atveju, nuplaukite kremą vandeniu.

o Netepkite kremo viduje.

o Nenaudokite daugiau kremo, nei rekomendavo jūsų gydytojas.

o Užtepus Aldara kremą, negalima uždengti gydomos vietos pleistrais ar kitais tvarsčiais.

o Jei gydoma sritis jums sukelia per daug diskomforto, nuplaukite kremą švelniu muilu ir vandeniu.

Kai odos reakcijos išnyks, galite atnaujinti gydymą.

o Praneškite savo gydytojui, jei turite nenormalių kraujo tyrimų rezultatų.

Dėl Aldara veikimo mechanizmo yra tikimybė, kad kremas gali pabloginti esamą uždegimą gydomoje srityje.

● Jei esate gydomas dėl genitalijų karpų, laikykitės šių papildomų atsargumo priemonių:

- Vyrų, norintys gydyti karpas po apyvarpe, turėtų kasdien apyvarpę
- Jei turite atvirų opų: Aldara kremo nenaudokite ant odos vietų, kur yra atviros opos, kol jos neužgis.
- Jei turite vidinių karpų: Aldara kremo nenaudokite šlaplėje (šlapimo kanale), makštyje (gimdymo kanale), gimdos kaklelyje (vidiniame moters lytiniame organe) ar bet kurioje išangės vietoje.
- Jei dėl ligos ar vartojamų vaistų turite rimtų imuninės sistemos problemų, galite atlikti tik vieną gydymą Aldara kremu. Jei manote, kad tai jums tinka, pasitarkite su gydytoju.

Jei esate ŽIV teigiamas, turite apie tai pranešti savo gydytojui, nes įrodyta, kad Aldara kremas šiems pacientams yra mažiau veiksmingas. Jei nusprendžiate turėti lytinius santykius, kol vis dar turite karpų, tepkite Aldara kremą po lytinio akto, o ne prieš jį. Aldara kremas gali paveikti prezervatyvus ir pessarius,

todėl kremas neturėtų likti ant odos lytinio akto metu. Atminkite, kad Aldara kremas neapsaugo nuo galimo ŽIV ar kitų lytiškai plintančių ligų perdavimo kitam asmeniui.

● Jei esate gydomas dėl bazalinių ląstelių karcinomos ar aktininės keratozės, laikykitės šių papildomų atsargumo priemonių:

Nesideginkite saulėje ar soliariume ir venkite saulės šviesos kiek įmanoma gydymo Aldara kremu metu. Dėvėkite apsauginius drabužius ir plačiakraštę skrybėlę, kai esate lauke. Naudojant Aldara kremą ir kol

nebus pasiektas gijimas, gydoma sritis atrodoys pastebimai kitaip nei normali oda. Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama.
Vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Aldara kremo, ar neseniai vartojote, ar planuojate vartoti kitus vaistus artimiausiu metu? Pasakykite apie tai savo gydytojui arba vaistininkui.

Nėra žinomų vaistų, kurie būtų nesuderinami su Aldara kremu.

Nėštumas ir žindymas

Prieš vartodami bet kokį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar žindote kūdikį? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Jūsų gydytojas aptars su jumis Aldara kremo vartojimo nėštumo metu riziką ir naudą. Gyvūnų tyrimų rezultatai nerodo tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumo metu.

Vartodami Aldara kremą, nežindykite, nes nežinoma, ar imikvimodas išsiskiria į motinos pieną.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas neturi arba turi nereikšmingą poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Aldara kremas sudėtyje turi metilhidroksibenzoato, propilhidroksibenzoato (E216), cetilo alkoholio, stearilo alkoholio ir benzilo alkoholio Metilhidroksibenzoatas (E 218) ir propilhidroksibenzoatas (E 216) gali sukelti alergines reakcijas (galimai uždelstas). Cetilo alkoholis ir stearilo alkoholis gali sukelti vietines odos reakcijas (pvz., dermatitą).

Šiame preparate yra 5 mg benzilo alkoholio kiekviename paketėlyje. Benzilo alkoholis gali sukelti alergines reakcijas ir lengvą vietinį dirginimą.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų:

Vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama.

Suaugusieji:

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Abejotina dėl teisingo vartojimo? Pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Prieš ir po kremo užtepimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Uždenkite gydomą vietą ne tvarsčiais ar kitais tvarstais po to, kai užtepėte Aldara kremą.

Kiekvieną kartą, kai tepate kremą, naudokite naują paketėlį. Po naudojimo išmeskite kremą, kuris liko po užtepimo. Neužlaikykite atidaryto paketėlio kitai dienai.

Gydymo dažnumas ir trukmė genitalijų karpoms, bazalinių ląstelių karcinomai ir aktininei keratozei skiriasi (žr. specifines instrukcijas kiekvienai indikacijai).

Instrukcijos Aldara kremo užtepimui

● Kai gydotės genitalijų karpas:

Instrukcijos užtepimui – (pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį)

1. Prieš eidami miegoti, nusiplaukite rankas ir gydomą vietą su švelniu muilu ir vandeniu. Kruopščiai nusauskite.
2. Atidarykite naują paketėlį ir išspauskite šiek tiek kremo ant pirštų galiuko
3. Įtrinkite ploną Aldara kremo sluoksnį ant švarių sausų karpų ir švelniai įtrinkite, kol kremas įsigers į karpą.
4. Po kremo užtepimo išmeskite atidarytą paketėlį ir nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu.
5. Palikite Aldara kremą ant karpų 6–10 valandų. Šiuo metu nesimaudykite vonioje ar duše.
6. Po 6–10 valandų odą, ant kurios buvo užteptas kremas, reikia nuplauti švelniu muilu ir vandeniu nuvalyti.

Aldara kremą tepkite tris kartus per savaitę. Pavyzdžiui, tepkite kremą pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Viename paketėlyje yra pakankamai kremo, kad padengtų karpų paveiktą odos plotą, kurio dydis yra 20 cm². padengti.

Vyrai, turintys karpų po apyvarpe, turėtų ją kasdien atitraukti ir nuplauti visą plotą (žr. 2 skyrių „Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?“)

Tęskite Aldara kremo naudojimą, kol jūsų karpas visiškai išnyks (pusėje moterų visos karpas išnyks per 8 savaites, pusėje vyrų per 12 savaičių, kai kuriems pacientams karpas gali išnykti jau po 4 savaičių).

Aldara kremo nenaudokite ilgiau nei 16 savaičių kiekvienam (naujam) karpų gydymui. Jei manote, kad Aldara kremo poveikis yra per stiprus arba per silpnas, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

● Kai esate gydomas dėl bazalinių ląstelių karcinomos:

Naudojimo instrukcijos – (pirm, antr, treč, ketv ir penkt)

1. Prieš eidami miegoti, nusiplaukite rankas ir gydomą vietą švelniu muilu ir vandeniu. Gerai nusauskite.
2. Atidarykite naują paketėlį ir išspauskite šiek tiek kremo ant pirštų galiuko.
3. Įtrinkite ploną Aldara kremo sluoksnį ant pažeistos vietos ir 1 cm aplink ją. Švelniai įtrinkite, kol kremas įsigers į odą.
4. Išmeskite atidarytą paketėlį užtepus kremą ir nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.
5. Leiskite Aldara kremui būti ant odos apie 8 valandas. Šiuo metu nesimaudykite vonioje ar duše.
6. Po 8 valandų nuplaukite odą, ant kurios buvo užteptas kremas, švelniu muilu ir vandeniu.

Šešias savaites kiekvieną savaitę, penkias dienas iš eilės, kasdien užtepkite pakankamai Aldara kremo, kad padengtumėte gydomą vietą ir 1 centimetrą aplink ją. Pavyzdžiui, tepkite kremą nuo pirmadienio iki penktadienio. Šeštadienį ir sekmadienį kremo netepkite. ● Kai gydotės aktinines keratozes:

Naudojimo instrukcijos – (pirmadienis, trečiadienis, penktadienis)

Prieš eidami miegoti, nusiplaukite rankas ir gydomą vietą švelniu muilu ir vandeniu.

1. Gerai nusausinkite. Kruopščiai nusausinti.
2. Įtrinkite ploną Aldara kremo sluoksnį ant pažeistos vietos. Švelniai įtrinkite, kol kremas įsigers į odą.
3. Išmeskite atidarytą paketėlį užtepus kremą ir nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.
4. Leiskite Aldara kremui būti ant odos apie 8 valandas. Šiuo metu nesimaudykite vonioje ar duše.
5. Palikite Aldara kremą ant odos maždaug 8 valandas. Šiuo metu nesimaudykite vonioje ar dušas.
6. Nuplaukite odą, ant kurios buvo užteptas kremas, po 8 valandų su švelniu muilu ir vandeniu.

Tepkite Aldara kremą tris kartus per savaitę. Pavyzdžiui, tepkite kremą pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Vienas paketėlis yra pakankamas, kad padengtų odos plotą, kurio dydis yra 25 cm². Toliau naudokite kremą keturias savaites. Po šio pirmojo gydymo kurso, po keturių savaičių, jūsų gydytojas įvertins jūsų odą. Jei ne visi pažeidimai išnyko, gali prireikti dar keturių savaičių gydymo. reikalinga.

Nuplaukite perteklinį kremą su švelniu muilu ir vandeniu. Kai odos reakcija išnyks, galite tęsti gydymą. Jei netyčia praryjate Aldara kremą, nedelsdami susisieki su savo šeimos gydytoju.

Ar pamiršote panaudoti šį vaistą?

Jei pamiršote dozę, turite ją užtepti, kai tik prisiminsite, po to galite toliau laikytis savo įprasto grafiko. Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Tada susisieki su savo gydytoju

arba vaistininku. 4. Galimas šalutinis poveikis

Šalutinio poveikio dažnis yra suskirstytas taip:

Labai dažnas šalutinis poveikis (tikėtina, kad pasireišk daugiau nei 1 iš 10 pacientų)

Dažnas šalutinis poveikis (tikėtina, kad pasireišk mažiau nei 1 iš 10 pacientų)

Kartais šalutinis poveikis (tikėtina, kad pasireišk mažiau nei 1 iš 100 pacientų)

Kartais šalutinis poveikis (tikėtina, kad pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 pacientų)

Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (tikėtina, kad pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 pacientų)

Labai retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (tikėtina, kad pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų).

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinių poveikių, nors ne kiekvienas juos patiria. Įspėkite savo gydytoją arba vaistininką kuo greičiau, jei jaučiatės blogai per laikotarpį, kai naudojate Aldara kremą.

Kai kuriems pacientams pasireiškė odos spalvos pokyčiai toje vietoje, kur buvo užteptas Aldara kremas. Nors šie pokyčiai paprastai laikui bėgant sumažėja, kai kuriems pacientams jie gali būti ilgalaikiai. Jei jūsų oda stipriai reaguoja į Aldara kremo naudojimą, turite nutraukti gydymą, nuplauti gydomą vietą švelniu muilu ir vandeniu, ir susisiekti su savo gydytoju arba vaistininku. Kai kuriems pacientams pastebėtas nedidelis trombocitų sumažėjimas. Dėl trombocitų sumažėjimo galite būti jautresni infekcijoms arba lengviau atsirasti mėlynės. Taip pat gali

pasireikšti nuovargis. Pasakykite savo gydytojui, jei pasireiškia šie simptomai. Kai kuriems pacientams su imuninės sistemos sutrikimais jų liga gali pablogėti. Ar turite imuninės sistemos sutrikimą ir naudojate Aldara kremą? Pasakykite savo gydytojui, jei yra pokyčių.

Rimtos odos reakcijos retai buvo praneštos. Jei pastebite mažas žaizdeles ant odos arba mažas raudonas dėmelės, kurios toliau vystosi, galbūt su tokiais simptomais kaip niežulys, karščiavimas, gripas

Rimtos odos reakcijos retai buvo praneštos. Jei pastebite mažas žaizdeles ant odos arba mažus raudonus mažos dėmelės, kurios toliau vystosi, galbūt su tokiais simptomais kaip niežulys, karščiavimas, gripo požymiai jausmas, skausmingi sąnariai, regėjimo problemos, skausmas ryjant, skausmas ar niežtinčios akys arba žaizdelės burnoje, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją.

Nedidelis skaičius pacientų patiria plaukų slinkimą ant ar aplink gydymo vietą.

● Kai esate gydomas dėl genitalijų karpų:

Daug nepageidaujamų Aldara kremo poveikių sukelia vietinis poveikis jūsų odai.

Labai dažni šalutiniai poveikiai yra paraudimas (61 % pacientų), odos plonėjimas (30 % pacientų), pleiskanojimas ir patinimas. Kietėjimas po oda, mažos atviros žaizdelės, šašai, kaip tie, kurie atsiranda normaliai gyjant žaizdoms, ir maži pūsleliai po oda gali pasireikšti. Po Aldara kremo užtepimo galite jausti niežulį (32 % pacientų), deginimo pojūtį (26 % pacientų) arba skausmą (8% pacientų) tose vietose, kur užtepėte kremą. Dauguma šių odos reakcijų yra lengvos ir oda maždaug po dviejų savaitių nuo gydymo nutraukimo vėl atsigaus. Dažnai kai kurie pacientai (4 % ar mažiau) patiria galvos skausmą, kartais karščiavimą ir gripo tipo

simptomus, sąnarių ir raumenų skausmą, gimdos prolapsą; moterims skausmą lytinių santykių metu; erekcijos sutrikimus; padidėjusį prakaitavimą; pykinimą; skrandžio ir žarnyno sutrikimus; spengimą ausyse; paraudimą; nuovargį; galvos svaigimą; migreną; tirpstančias galūnes;

nemigą; depresiją; sumažėjusį apetitą; patinusius limfmazgius; bakterines, virusines ir grybelines infekcijas (pvz., opas); makšties infekciją su baltomis išskyromis; kosulį ir peršalimą su gerklės skausmu pranešta. grybelinės infekcijos (pvz., opos); makšties infekcija su baltomis išskyromis; kosulys ir peršalimas su gerklės skausmas praneštas.

Labai retai pasitaikė rimtų ir skausmingų reakcijų, ypač kai buvo užtepta daugiau kremo nei rekomenduojama. Labai retais atvejais moterims buvo sunku moterims sunku nedelsiant kreiptis į gydytoją. ● Kai esate gydomas dėl bazalinių ląstelių karcinomos:

Dauguma Aldara kremo šalutinių poveikių atsiranda dėl vietinio poveikio odai.

Vietinės odos reakcijos gali būti ženklas, kad vaistas veikia kaip numatyta. Labai dažnas šalutinis poveikis yra tai, kad gydoma oda šiek tiek niežti.

Dažni šalutiniai poveikiai yra galūnių tirpimas, nedideli odos patinimai, skausmas,

deginimo pojūtis, dirginimas, kraujavimas, paraudimas ar bėrimas. Jei odos reakcija gydymo metu tampa per daug nemaloni, pasitarkite su savo gydytoju. Jis/ji gali patarti nutraukti Aldara kremo naudojimą kelioms dienoms (t. y. padaryti trumpą pertrauką gydyme). Jei atsiranda pūlių (pūlinys) ar kitas simptomas, rodantis infekciją, aptarkite tai su savo gydytoju. Be odos reakcijų, kiti dažni šalutiniai poveikiai yra patinę limfmazgiai ir nugaros skausmas. Kartais kai kurie pacientai patiria pokyčius taikymo vietoje (išskyros, uždegimas,

patinimas, šašai, odos irimas, pūslės, dermatitas) arba dirglumą, pykinimą, sausą burną, gripo simptomus ir nuovargį. ● Kai esate gydomas dėl aktinės keratozės:

● Kai jums taikomas aktinės keratozės gydymas:

Daug šalutinių Aldara kremo poveikių sukelia vietinis poveikis odai. Vietinės odos reakcijos gali būti ženklas, kad vaistas veikia kaip numatyta.

Labai dažnas šalutinis poveikis yra tai, kad gydoma oda šiek tiek niežti.

Dažni šalutiniai poveikiai yra skausmas, deginimo pojūtis, dirginimas ar paraudimas. Jei odos reakcija gydymo metu tampa per daug nemaloni, pasitarkite su savo gydytoju. Jis/ji gali patarti keletą dienų nutraukti Aldara kremo naudojimą (t. y. padaryti trumpą pertrauką gydyme). Jei atsiranda pūlių (pūliai) ar kitas simptomas, rodantis infekciją, aptarkite tai su savo gydytoju. Be odos reakcijų, kiti dažni šalutiniai poveikiai yra galvos skausmas, anoreksija, pykinimas, raumenų skausmas, sąnarių skausmas ir nuovargis.

Kartais kai kurie pacientai patiria pokyčius taikymo vietoje (kraujavimas, uždegimas, išskyros, jautrumas, patinimas, maži patinę odos plotai, nutirpę galūnės, pleiskanojimas, randai, opos ar šilumos ar diskomforto pojūtis) arba nosies vidaus uždegimas, sloga, gripas ar gripo simptomai, depresija, akių dirginimas, patinęs vokas, gerklės skausmas, viduriavimas, aktinė keratozė, paraudimas, patinęs veidas, opos, skausmas galūnėse, karščiavimas, silpnumas ar šaltkrėtis.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, susisieki su savo gydytoju ar vaistininku. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinį poveikį padeda mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą, nacionalinę pranešimų sistemą, kaip nurodyta priede V. Pranešdami apie šalutinius poveikius, galite

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui. Jį rasite ant dėžutės ir etiketės po „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data. Atidarytų paketėlių negalima naudoti pakartotinai. Vaistų neišpilkite į kriauklę ar tualetą ir nemeskite į šiukšliadėžę.

Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jei vaistus tinkamai išmesite, jie bus atsakingai sunaikinti ir nepateks į aplinką. teisingai.

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra imikvimodas. Kiekviename paketėlyje yra 250 mg kremo (100 mg kremo

- Veiklioji šio vaisto medžiaga yra imikvimodas. Kiekviename paketėlyje yra 250 mg kremo (100 mg kremo sudėtyje yra 5 mg imikvimodo).
- Kitos šio vaisto sudedamosios dalys yra izostearino rūgštis, benzilo alkoholis,
- cetilo alkoholis, stearilo alkoholis, minkštas baltas parafinas, polisorbato 60, sorbitano stearatas, glicerolis, nmetilhidroksibenzoatas (E218), propilhidroksibenzoatas (E216), ksantano guma, išgrynintas vanduo. (Taip pat žiūrėkite 2 skyrių „Aldara kremas sudėtyje yra metilhidroksibenzoato,
- propilhidroksibenzoato (E216), cetilo alkoholio, stearilo alkoholio ir benzilo alkoholio“)

Kaip atrodo Aldara kremas ir kiek jo yra pakuotėje?

- Kiekvienas Aldara kremo 5% paketėlis turi 250 mg baltos iki šviesiai geltonos spalvos kremo.
- Kiekvienoje dėžutėje yra 12 arba 24 poliesterio/aliuminio folijos vienkartinio naudojimo paketėliai. Gali būti, kad ne visos pakuotės dydžiai yra rinkoje.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Leidimo prekiauti turėtojas
Viatrix Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublinas 15
DUBLINO
Airija

Gamintojas
Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Vokietija

Dėl visos informacijos apie šį vaistą kreipkitės į vietinį leidimo prekiauti turėtojo atstovą:

Belgija
Viatrix
Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Tel: +359 2 44 55 400

Bulgarija
Mylan EOOD

Liuksemburgas
Viatrix
Tél/Tel: +32 2 658 61 00
(Belgija)

Vengrija
Viatri Healthcare Kft.
1138 Budapeštas
Váci út 150
Tel: +36 1 465 2100

Čekijos Respublika
Viatri CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

Danija
Viatri ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Vokietija
Viatri Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Nyderlandai
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

Norvegija
Viatri AS
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
33

Estija
Viatri OÜ
Tel: +372 63 63 052
Graikija
Viatri Hellas Ltd
Tel: +30 210 010 0002

Ispanija
Viatri Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, 5ª planta
08038 - Barselona
Tel: +34 900 102 712

Prancūzija
Viatri Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Tel: +33 (0)1 40 80 15 55

Kroatija
Viatri Kroatija d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagrebas
Tel: +385 1 235 059 90

Airija
Viatri Limited
Tel: +353 1 8711600
Islandija
Icepharma hf
Tel: +354 540 8000

Italija
Viatri Italija
Via Vittor Pisani,
2020124 Milanai
Tel: +39 (0) 2 612 46921

Kipras
CPO Pharmaceuticals Limited
Tel: +357 22863100

Latvija
Viatri SIA
101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Tel.: +371 67616137
Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich
Viatri Austria GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien
Tel: + 43 (0)1 86 390

Polska
Viatri Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

Tel: +48 22 546 6400

Portugal

Viatrix Healthcare, Lda.

Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Tel: +351 214 127 200

Rumunija

BGP PRODUCTS SRL

Tel.: +40372 579 000

Slovėnija

Viatrix d.o.o.

Tel: +386 1 23 63 180

Slovakijos Respublika

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Europos svetainėje

Vaistų agentūra (<http://www.ema.europa.eu>).

Viatrix Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Suomija/ Suomija

Viatrix Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Švedija

Viatrix AB

Box 23033

104 35 Stokholmas

+46 (0) 8 630 19 00

Lietuva

Viatrix UAB

Žalgirio g. 90-100

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52051288