

Ulotka: informacje dla użytkownika

Aldara 5 % krem

Imikwimod

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed użyciem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna ponownie.
- Masz pytania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest on przeznaczony wyłącznie dla Ciebie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość ulotki:

1. Co to jest krem Aldara i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest krem Aldara i w jakim celu się go stosuje?

Krem Aldara może być stosowany w leczeniu trzech różnych schorzeń. Lekarz może przepisać krem Aldara do leczenia:

● Brodawek (kłykciny kończyste) znajdujących się na zewnętrznych narządach płciowych i wokół odbytu (między pośladkami).

● W przypadku powierzchownego raka podstawnokomórkowego.

Jest to powszechny i wolno rosnący rodzaj raka skóry, który rzadko przerzutuje do innych części ciała. Zazwyczaj występuje u osób w średnim wieku i starszych, szczególnie u pacjentów o jasnej karnacji. Choroba jest spowodowana nadmierną ekspozycją na słońce. Jeśli rak podstawnokomórkowy nie jest leczony, może powodować zniekształcenia, zwłaszcza na twarzy. Z tego powodu ważne jest, aby choroba była wcześniej wykryta i leczona.

● Rogowacenie słoneczne

Rogowacenie słoneczne to szorstkie plamy na skórze, które były nadmiernie narażone na słońce przez życie pacjenta. Plamy mogą mieć kolor skóry, ale mogą też być szare, różowe, czerwone lub brązowe. Plamy mogą być szorstkie, łuszczące się, twarde, brodawkowate, płaskie lub leżące na skórze. Aldara może być stosowana tylko na płaskie rogowacenie słoneczne na twarzy lub skórze głowy. Pacjent musi mieć zdrowy układ odpornościowy, a lekarz musi stwierdzić, że Aldara jest najodpowiedniejszym leczeniem dla Ciebie.

Krem Aldara pomaga układowi odpornościowemu Twojego ciała wytwarzać naturalne substancje, które pomagają zwalczać raka podstawnokomórkowego, rogowacenie słoneczne lub wirusa powodującego brodawki.

2. Kiedy nie wolno stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Kiedy nie wolno stosować tego leku?

- Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

o Jeśli wcześniej stosowałeś krem Aldara lub inne podobne środki do leczenia, powinieneś poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem tego leczenia.

o Jeśli masz zaburzenia odporności.

o Jeśli miałeś przeszczep narządu.

o Stosuj krem Aldara dopiero wtedy, gdy obszar do leczenia zagoi się po wcześniejszym leczeniu lekami lub zabiegiem chirurgicznym.

o Unikaj kontaktu z oczami, ustami i nozdrzami. W przypadku przypadkowego kontaktu, usuń krem, spłukując wodą.

o Nie stosować kremu wewnątrznie.

o Nie używaj więcej kremu niż zalecił lekarz.

o Nie przykrywaj leczonego obszaru plastrem ani innym opatrunkiem po nałożeniu kremu Aldara.

o Jeśli leczony obszar sprawia zbyt duży dyskomfort, należy zmyć krem łagodnym mydłem i wodą. Gdy reakcje skórne ustąpią, można wznowić leczenie.

o Poinformuj lekarza, jeśli masz nieprawidłowe wyniki badań krwi.

Ze względu na mechanizm działania Aldara istnieje ryzyko, że krem może pogorszyć istniejące zapalenie w leczonym obszarze.

● Jeśli jesteś leczony z powodu brodawek narządów płciowych, przestrzegaj tych dodatkowych środków ostrożności:

- Mężczyźni, którzy chcą leczyć brodawki pod napletkiem, powinni codziennie
- odciągać napletek i myć ten obszar skóry. Jeśli napletek nie jest codziennie myty, istnieje ryzyko zwężenia, obrzęku lub ścieńczenia napletka, lub coraz trudniej będzie go odciągać. Jeśli wystąpi jeden lub więcej z tych objawów, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli masz otwarte rany: Nie stosować kremu Aldara na obszary skóry z otwartymi ranami, dopóki te rany się nie zagoją.
- Jeśli masz wewnętrzne brodawki: Nie stosować kremu Aldara w cewce moczowej, pochwie, szyjce macicy ani w odbycie.

Jeśli z powodu choroby lub stosowanych leków masz poważne problemy z układem odpornościowym, możesz poddać się tylko jednemu leczeniu kremem Aldara. Jeśli uważasz, że to dotyczy Ciebie, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli jesteś HIV-pozytywny, musisz to zgłosić lekarzowi, ponieważ wykazano, że krem Aldara jest mniej skuteczny u tych pacjentów. Jeśli zdecydujesz się na kontakty seksualne, mając nadal brodawki, nałóż krem Aldara po aktywności seksualnej - a nie przed.

Krem Aldara może uszkadzać prezerwatywy i pessaria,

dlatego krem nie powinien pozostawać na skórze podczas aktywności seksualnej. Pamiętaj, że krem Aldara nie chroni przed ewentualnym przeniesieniem zakażenia HIV lub innych chorób przenoszonych drogą płciową na inną osobę.

● Jeśli jesteś leczony z powodu raka podstawnokomórkowego lub rógowacenia słonecznego, przestrzegaj tych dodatkowych środków ostrożności:

Nie korzystaj z solarium ani nie opalaj się i unikaj światła słonecznego tak bardzo, jak to możliwe podczas leczenia kremem Aldara. Noś ochronną odzież i kapelusz z szerokim rondem, gdy jesteś na zewnątrz. Podczas stosowania kremu Aldara i do czasu zagojenia się, leczony obszar będzie wyglądał zauważalnie inaczej niż normalna skóra.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Stosowanie przez dzieci i młodzież nie jest zalecane.

Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz kremu Aldara, czy robiłeś to niedawno lub istnieje możliwość, że wkrótce będziesz używać innych leków? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie. Nie są znane leki, które są niezgodne z kremem Aldara.

Ciąża i karmienie piersią

Zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę o radę przed użyciem jakiegokolwiek leku.

Czy jesteś w ciąży, myślisz, że możesz być w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią?

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku. Twój lekarz omówi z tobą ryzyko i korzyści stosowania kremu Aldara w czasie ciąży. Wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w czasie ciąży.

Nie karm piersią podczas stosowania kremu Aldara, ponieważ nie wiadomo, czy imikwimod przenika do mleka matki.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Ten lek nie ma lub ma znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Krem Aldara zawiera metylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan (E216), alkohol cetylowy,

alkohol stearylowy i alkohol benzylowy. Metylu hydroksybenzoesan (E 218) i propylu hydroksybenzoesan (E 216) mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione). Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. zapalenie skóry).

Ten środek zawiera 5 mg alkoholu benzylowego w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne i lekkie miejscowe podrażnienia.

3. Jak stosować ten lek?

Dzieci i młodzież do 18 lat:

Stosowanie przez dzieci i młodzież nie jest zalecane.

Dorośli:

Zawsze stosuj ten lek dokładnie tak, jak powiedział ci lekarz lub farmaceuta.

Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dokładnie umyj ręce przed i po nałożeniu kremu. Nie przykrywaj leczonego obszaru opatrunkami ani innymi bandażami po nałożeniu kremu Aldara.

Za każdym razem, gdy nakładasz krem, używaj nowej saszetki. Po użyciu wyrzuć krem, który pozostał po nałożeniu. Nie przechowuj otwartej saszetki na inny dzień. Częstotliwość i czas trwania leczenia brodawek narządów płciowych, raka podstawnokomórkowego i rógowacenia słonecznego różnią się od siebie (zobacz szczegółowe wskazówki dla każdej wskazania).

Wskazówki dotyczące nakładania kremu Aldara

● Kiedy jesteś leczony z powodu brodawek narządów płciowych:

Wskazówki dotyczące nakładania – (pon, śr i pt)

1. Przed pójściem spać umyj ręce i obszar do leczenia łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie osusz.
2. Otwórz nową saszetkę i wyciśnij trochę kremu na czubek palca
3. Wmasuj cienką warstwę kremu Aldara na czyste, suche brodawki i delikatnie wcieraj, aż krem wsiąknie w brodawkę.
4. Wyrzuć otwartą saszetkę po nałożeniu kremu i umyj ręce wodą i mydłem.
5. Pozostaw krem Aldara na brodawkach przez 6 do 10 godzin. W tym czasie nie bierz kąpeli ani prysznic.
6. Po 6 do 10 godzinach należy oczyścić skórę, na którą nałożono krem, łagodnym mydłem i wodą oczyścić.

Nakładać krem Aldara trzy razy w tygodniu. Na przykład, nałóż krem w poniedziałek, środę i piątek. Saszetka zawiera wystarczającą ilość kremu, aby pokryć obszar skóry z brodawkami o powierzchni 20 cm² do pokrycia.

Mężczyźni z brodawkami pod napletkiem powinni codziennie odciągać napletek i myć cały obszar (patrz punkt 2 „Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?”) Kontynuuj stosowanie kremu Aldara, aż wszystkie brodawki całkowicie znikną (u połowy kobiet wszystkie brodawki znikną w ciągu 8 tygodni, u połowy mężczyzn w ciągu 12 tygodni, u niektórych pacjentów brodawki mogą zniknąć już po 4 tygodniach).

Nie stosować kremu Aldara dłużej niż 16 tygodni na każde (nowe) leczenie brodawek. Jeśli masz wrażenie, że działanie kremu Aldara jest zbyt silne lub zbyt słabe, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

● Kiedy jesteś leczony na raka podstawnokomórkowego:

Instrukcje dotyczące stosowania – (pon, wt, śr, czw i pt)

1. Przed pójściem spać umyj ręce i obszar do leczenia łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie osusz.
2. Otwórz nową saszetkę i wyciśnij trochę kremu na opuszki palców.
3. Wetrzyj cienką warstwę kremu Aldara na zmienione miejsce i 1 cm wokół. Delikatnie wcieraj, aż krem wchłonie się w skórę.

4. Wyrzuć otwartą saszetkę po nałożeniu kremu i umyj ręce wodą i mydłem.
5. Pozostaw krem Aldara na skórze przez około 8 godzin. W tym czasie nie bierz kąpeli ani prysznic.
6. Po 8 godzinach umyj skórę, na którą nałożono krem, łagodnym mydłem i wodą.

Nakładaj wystarczającą ilość kremu Aldara codziennie przez pięć dni w tygodniu przez sześć tygodni, aby pokryć obszar do leczenia i 1 centymetr wokół niego. Na przykład nakładaj krem od poniedziałku do piątku. W sobotę i niedzielę nie nakładaj kremu.

● Gdy jesteś leczony z powodu rógowacenia słonecznego:

Instrukcje dotyczące stosowania – (pon, śr, pt)

1. Przed pójściem spać umyj ręce i obszar do leczenia łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie osusz.
2. Otwórz nową saszetkę i wyciśnij trochę kremu na opuszki palców.
3. Wmasuj cienką warstwę kremu Aldara na zmienione miejsce. Delikatnie wcieraj, aż krem wchłonie się w skórę. Jest usunięty.
4. Wyrzuć otwartą saszetkę po nałożeniu kremu i umyj ręce wodą i Pozostaw krem Aldara na skórze przez około 8 godzin. W tym czasie nie bierz kąpeli ani prysznic.
5. prysznic.
6. Umyj skórę, na którą nałożono krem, po 8 godzinach łagodnym mydłem i wodą.

Nakładaj krem Aldara trzy razy w tygodniu. Na przykład nałóż krem w poniedziałek, środę i piątek. Jedna saszetka wystarcza na pokrycie obszaru skóry o powierzchni 25 cm². Kontynuuj stosowanie kremu przez cztery tygodnie. Cztery tygodnie po zakończeniu tego pierwszego leczenia lekarz oceni Twoją skórę. Jeśli nie wszystkie zmiany zniknęły, może być konieczne dalsze leczenie przez cztery tygodnie. potrzebny.

Splucz nadmiar kremu łagodnym mydłem i wodą. Gdy reakcja skórna zniknie, możesz wznowić leczenie. wznowić leczenie.

Czy zapomniałeś użyć tego środka?

Jeśli zapomnisz dawki, nałóż ją, gdy tylko sobie o tym przypomnisz, a następnie kontynuuj zgodnie z normalnym harmonogramem. Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem

lub farmaceutą. 4. Możliwe działania niepożądane

Częstotliwość działań niepożądanych jest sklasyfikowana w następujący sposób:

Bardzo często występujące działania niepożądane (prawdopodobnie występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często występujące działania niepożądane (prawdopodobnie występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Czasami działania niepożądane (prawdopodobnie występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Czasami działania niepożądane (występują prawdopodobnie u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Rzadko występujące działania niepożądane (prawdopodobnie występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (prawdopodobnie występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Jak każdy lek, również ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. dotyczą.

Powiadom swojego lekarza lub farmaceutę jak najszybciej, gdy poczujesz się źle podczas okresu stosowania kremu Aldara.

U niektórych pacjentów wystąpiły zmiany w kolorze skóry w miejscu, gdzie nałożono krem Aldara. Chociaż te zmiany zazwyczaj z czasem ustępują, mogą być trwałe u niektórych pacjentów. Jeśli Twoja skóra silnie reaguje na stosowanie kremu Aldara, należy przerwać leczenie, umyć obszar leczenia łagodnym mydłem i wodą, i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

U niektórych pacjentów zaobserwowano niewielki spadek liczby płytek krwi. Spadek liczby płytek krwi może sprawić, że będziesz bardziej podatny na infekcje lub łatwiej pojawią się siniaki. Może również wystąpić zmęczenie. Powiedz swojemu lekarzowi, jeśli te objawy wystąpią.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami odporności ich choroba może się pogorszyć. Czy masz zaburzenia odporności i używasz kremu Aldara? Powiedz o tym swojemu lekarzowi, jeśli wystąpią zmiany.

Poważne reakcje skórne rzadko były zgłaszane. Jeśli zauważysz małe rany na skórze lub małe czerwone plamki, które się rozwijają, możliwe z objawami takimi jak swędzenie, gorączka, objawy grypopodobne uczucie, bolesne stawy, problemy ze wzrokiem, ból przy przełykaniu, ból lub swędzenie oczu lub rany w ustach, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Niewielka liczba pacjentów doświadcza wypadania włosów na lub wokół miejsca leczenia.

● Kiedy jesteś leczony na brodawki narządów płciowych:

Wiele niepożądanych skutków ubocznych kremu Aldara jest spowodowanych lokalnym działaniem na skórę.

Bardzo często występujące działania niepożądane to zaczerwienienie (61% pacjentów), ścieńczenie skóry (30 % pacjentów), łuszczenie się i obrzęk. Mogą wystąpić stwardnienia pod skórą, małe otwarte rany, strupy jak te, które powstają podczas normalnego gojenia się ran i małe pęcherzyki pod skórą. Po nałożeniu kremu Aldara możesz odczuwać swędzenie (32% pacjentów), uczucie pieczenia (26% pacjentów) lub ból (8% pacjentów) w miejscach, gdzie nałożono krem. Większość z tych reakcji skórnych ma łagodny charakter i skóra powinna się zregenerować około dwóch tygodni po zaprzestaniu leczenia.

Często niektórzy pacjenci (4% lub mniej) mają bóle głowy, czasami gorączkę i objawy grypopodobne, bóle stawów i mięśni, wypadanie macicy; u kobiet ból podczas stosunku; zaburzenia erekcji; zwiększone pocenie się; nudności; dolegliwości żołądkowo-jelitowe; szumy uszne; zaczerwienienie; zmęczenie; zawroty głowy; migrena; drętwienie kończyn;

bezsenna; depresja; zmniejszony apetyt; powiększone węzły chłonne; infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze (np. owrzodzenia); infekcja pochwy z białymi upławami; kaszel i przeziębienie z bólem gardła zgłaszane. zakażenia grzybicze (np. owrzodzenia); infekcja pochwy z białymi upławami; kaszel i przeziębienie z zgłoszono ból gardła.

Bardzo rzadko występowały poważne i bolesne reakcje, szczególnie gdy nałożono więcej kremu niż zalecano. W bardzo rzadkich przypadkach kobietom było trudno kobiety trudno aby natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. ● Gdy jesteś leczony z powodu raka podstawnokomórkowego:

Wiele działań niepożądanych kremu Aldara jest spowodowanych miejscowym działaniem na skórę.

Miejscowe reakcje skórne mogą być oznaką, że lek działa zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo często występującym działaniem niepożądanym jest lekkie swędzenie leczonej skóry.

Często występujące działania niepożądane to drętwienie kończyn, małe obrzęki skóry, ból,

pieczenie, podrażnienie, krwawienie, zaczerwienienie lub wysypka. Jeśli reakcja skórna podczas leczenia stanie się zbyt nieprzyjemna, porozmawiaj z lekarzem. On/ona może doradzić przerwanie stosowania kremu Aldara na kilka dni (tj. wprowadzenie krótkiej przerwy w leczeniu). Jeśli pojawi się ropa (ropa) lub inny objaw wskazujący na infekcję, omów to z lekarzem. Oprócz reakcji skórnych, inne często występujące działania niepożądane to powiększone węzły chłonne i ból pleców. Czasami niektórzy pacjenci doświadczają zmian w miejscu aplikacji (wydzielina, zapalenie,

obrzęk, tworzenie się strupów, rozpad skóry, pęcherze, zapalenie skóry) lub drażliwość, nudności, suchość w ustach, objawy grypopodobne i zmęczenie. ● Gdy jesteś leczony z powodu rogowacenia słonecznego:

● Gdy jesteś leczony z powodu rogowacenia słonecznego:

Wiele działań niepożądanych kremu Aldara jest spowodowanych miejscowym działaniem na skórę. Miejscowe reakcje skórne mogą być oznaką, że lek działa zgodnie z przeznaczeniem.

Bardzo często występującym działaniem niepożądanym jest lekkie swędzenie leczonej skóry.

Często występujące działania niepożądane to ból, uczucie pieczenia, podrażnienie lub zaczerwienienie.

Jeśli reakcja skórna podczas leczenia stanie się zbyt nieprzyjemna, porozmawiaj z lekarzem. On/ona może doradzić przerwanie stosowania kremu Aldara na kilka dni (tj. wprowadzenie krótkiej przerwy w leczeniu).

Jeśli pojawi się ropa (wydzielina ropna) lub inny objaw wskazujący na infekcję, omów to z lekarzem. Oprócz reakcji skórnych, inne często występujące działania niepożądane to ból głowy, anoreksja, nudności, ból mięśni, ból stawów i zmęczenie.

Czasami niektórzy pacjenci doświadczają zmian w miejscu aplikacji (krwawienie, zapalenie, wydzieliną, wrażliwość, obrzęk, małe obrzęknięte części skóry, drętwienie kończyn, łuszczenie, bliznowacenie, owrzodzenia lub uczucie ciepła lub dyskomfortu) lub zapalenie wnętrza nosa, katar, grypa lub objawy grypopodobne, depresja, podrażnienie oczu, obrzęk powieki, ból gardła, biegunka, rógowacenie słoneczne, zaczerwienienie, obrzęk twarzy, owrzodzenia, ból w kończynach, gorączka, osłabienie lub dreszcze. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również

możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio możliwe działania niepożądane, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio poprzez nas pomagają uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. krajowy system zgłaszania, jak podano w załączniku V. Przez zgłaszanie działań niepożądanych, można

5. Jak przechowywać ten lek?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na pudełku i etykiecie po „EXP”. Podana jest tam data miesiąca i roku. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności. Otwarte saszetki nie mogą być ponownie używane. Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza.

Zapytaj swojego farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Jeśli leki są prawidłowo usuwane, są niszczone w odpowiedzialny sposób i nie trafiają do środowiska .

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje zawiera ten lek?

- Substancją czynną w tym leku jest imikwimod. Każda saszetka zawiera 250 mg kremu (100 mg kremu zawiera 5 mg imikwimodu).
- Inne substancje w tym leku to składniki to kwas izostearynowy, alkohol benzylowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, miękka biała parafina, polisorbant 60, stearynian sorbitanu, glicerol, n-metylohydroksybenzoestan (E218), propylhydroksybenzoestan (E216), guma ksantanowa, oczyszczona woda. (Zobacz także punkt 2 „Krem Aldara zawiera metylohydroksybenzoestan,
- propylhydroksybenzoestan (E216), alkohol cetylowy i alkohol stearylowy oraz alkohol benzylowy”)

Jak wygląda krem Aldara i ile znajduje się w opakowaniu?

- Każda saszetka kremu Aldara 5% zawiera 250 mg białego do jasnożółtego kremu.
- Każde pudełko zawiera 12 lub 24 saszetki z poliestru/folii aluminiowej do jednorazowego użytku. Może być różnie nie wszystkie wielkości opakowań są dostępne na rynku.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlandia

Producent
Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Niemcy

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących tego leku skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Belgia
Viatris
Tel: +32 2 658 61 00

Tlf: +45 28 11 69 32

Bułgaria
Mylan EOOD
Tel: +359 2 44 55 400

Niemcy
Viatris Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Luksemburg
Viatris
Tel: +32 2 658 61 00
(Belgia)

Holandia
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

Węgry
Viatris Healthcare Kft.
1138 Budapeszt
Váci út 150
Tel: +36 1 465 2100

Norwegia
Viatris AS
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
33

Republika Czeska
Viatris CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Estonia
Viatris OÜ
Tel: +372 63 63 052

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

Grecja
Viatris Hellas Ltd
Tel: +30 210 010 0002

Dania
Viatris ApS

Hiszpania
Viatris Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, 5ª planta
08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Francja
Viatrix Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Tel: +33 (0)1 40 80 15 55

Chorwacja
Viatrix Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagrzeb
Tel: +385 1 235 059 90

Irlandia
Viatrix Limited
Tel: +353 1 8711600
Islandia
Icepharma hf
Sími: +354 540 8000

Włochy
Viatrix Italia
Via Vittor Pisani,
2020124 Mediolan
Tel: +39 (0) 2 612 46921

Cypr
CPO Pharmaceuticals Limited
Τηλ: +357 22863100

Łotwa
Viatrix SIA
101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Tāl: +371 67616137
Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich
Viatrix Austria GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390

Polska
Viatrix Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Tel: +48 22 546 6400

Portugalia
Viatrix Healthcare, Lda.
Av. D. João II,
Edifício Atlantis, n° 44C – 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa
Tel: +351 214 127 200

Rumunia
BGP PRODUCTS SRL
Tel.: +40372 579 000

Słowenia
Viatrix d.o.o.
Tel: +386 1 23 63 180

Republika Słowacka
Viatrix Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Finlandia
Viatrix Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Szwecja
Viatrix AB
Box 23033
104 35 Sztokholm
+46 (0) 8 630 19 00

Litwa
Viatrix UAB
ul. Žalgirio 90-100
Wilno LT-09303
Tel. + 370 52051288

Ulotka została ostatnio zatwierdzona w
Więcej informacji o tym leku jest dostępnych na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków (<http://www.ema.europa.eu>).