

Prospect: informații pentru utilizator
Aldara 5 % cremă
Imiquimod

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.
- Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect:

1. Ce este crema Aldara și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile.
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este crema Aldara și pentru ce se utilizează acest medicament?

Crema Aldara poate fi utilizată pentru trei afecțiuni diferite. Medicul dumneavoastră poate prescrie crema Aldara pentru tratamentul:

● Negi (condylomata acuminata) care se află pe partea exterioară a organelor genitale și în jurul anusului (între fese).

● În cazul carcinomului bazocelular superficial.

Aceasta este o formă comună și cu creștere lentă de cancer de piele, care este deosebit de puțin probabil să se răspândească la alte părți ale corpului. În general, această afecțiune apare la persoanele de vârstă mijlocie și la persoanele în vârstă, în special la pacienții cu piele deschisă. Boala este cauzată de expunerea excesivă la soare. Dacă carcinomul bazocelular rămâne netratat, poate provoca deformări, în special la nivelul feței. Din acest motiv, este important ca afecțiunea să fie descoperită și tratată devreme.

● Keratoză actinică

Keratozele actinice sunt pete aspre pe piele care au fost expuse excesiv la soare de-a lungul vieții pacientului. Petele pot avea culoarea pielii, dar pot fi și gri, roz, roșu sau maro. Petele pot fi aspre, solzoase, dure, asemănătoare negilor, plate sau la nivelul pielii. Aldara poate fi utilizat doar pentru keratozele actinice plate de pe față sau scalp. Pacientul trebuie să aibă un sistem imunitar sănătos și medicul trebuie să fi stabilit că Aldara este cel mai potrivit tratament pentru dumneavoastră.

Crema Aldara ajută sistemul imunitar al corpului dumneavoastră să producă substanțe naturale care ajută la combaterea carcinomului bazocelular, a keratozei actinice sau a virusului care a cauzat negii dumneavoastră.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

- Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

o Dacă ați utilizat anterior crema Aldara sau alte medicamente similare pentru tratament, trebuie să informați medicul înainte de a începe acest tratament.

o Dacă aveți un deficit imunitar.

o Dacă ați avut un transplant de organ.

o Utilizați crema Aldara doar după ce zona de tratament s-a vindecat în urma unui tratament anterior cu medicamente sau a unei intervenții chirurgicale.

o Evitați contactul cu ochii, buzele și nările. În caz de contact accidental, îndepărtați crema clătind cu apă.

o Nu aplicați crema intern.

o Nu folosiți mai multă cremă decât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

o Nu acoperiți zona tratată cu plasturi sau alte bandaje după ce ați aplicat crema Aldara.

o Dacă zona tratată vă provoacă prea mult disconfort, trebuie să spălați crema cu săpun blând și apă. De îndată ce reacțiile cutanate au dispărut, puteți relua tratamentul.

o Informați medicul dumneavoastră dacă aveți rezultate anormale ale testelor de sânge.

Datorită mecanismului de acțiune al Aldara, există posibilitatea ca crema să agraveze o inflamație existentă în zona tratată.

● Dacă sunteți tratat pentru negi genitali, luați aceste măsuri de precauție suplimentare:

- Bărbații care doresc să trateze negii de sub prepuț trebuie să retragă zilnic prepuțul
- și să spele această zonă a pielii. Dacă prepuțul nu este spălat zilnic, există riscul de îngustare, umflare sau subțiere a prepuțului sau devine din ce în ce mai dificil să retrageți prepuțul. Dacă apare unul sau mai multe dintre aceste simptome, trebuie să întrerupeți imediat tratamentul și să vă informați medicul.
- Dacă aveți ulcerații deschise: Nu utilizați crema Aldara pe zonele de piele unde există ulcerații deschise până când acestea nu s-au vindecat.
- Dacă aveți negi interni: Nu utilizați crema Aldara în uretră (canalul urinar), vagin (canalul de naștere), colul uterin (organ genital intern la femei) sau în anus.

Dacă, din cauza unei boli sau a medicamentelor pe care le utilizați, aveți probleme grave cu sistemul imunitar, puteți urma doar un singur tratament cu crema Aldara. Dacă credeți că acesta este cazul dumneavoastră, consultați medicul. Dacă sunteți HIV-pozitiv, trebuie să informați medicul dumneavoastră, deoarece s-a demonstrat că crema Aldara este mai puțin eficientă la acești pacienți. Dacă decideți să aveți relații sexuale în timp ce încă aveți negi, aplicați crema Aldara după activitatea sexuală - și nu înainte.

Crema Aldara poate afecta prezervativele și diafragmele,

de aceea crema nu trebuie să rămână prezentă în timpul activității sexuale. Rețineți că crema Aldara nu protejează împotriva transmiterii infecției cu HIV sau a altor boli cu transmitere sexuală către altcineva.

● Dacă sunteți tratat pentru carcinom bazocelular sau keratoză actinică, luați aceste măsuri de precauție suplimentare:

Nu vă expuneți la solar sau la lămpi de bronzat și evitați cât mai mult posibil lumina soarelui în timpul tratamentului cu crema Aldara. Purtați haine de protecție și o pălărie cu boruri largi când sunteți afară. În timpul utilizării cremei Aldara și până când vindecarea a avut loc, zona de tratament va arăta vizibil diferit de pielea normală.

Copii și adolescenți până la 18 ani

Utilizarea de către copii și adolescenți nu este recomandată.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați, pe lângă crema Aldara, și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați în curând alte medicamente? Informați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Nu sunt cunoscute medicamente care să fie incompatibile cu crema Aldara.

Sarcina și alăptarea

Cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte de a utiliza un medicament.

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră riscurile și beneficiile utilizării cremei Aldara în timpul sarcinii. Rezultatele studiilor pe animale nu indică un efect nociv direct sau indirect în timpul sarcinii.

Nu alăptați în timpul utilizării cremei Aldara, deoarece nu se știe dacă imiquimodul este excretat în laptele matern.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Acest medicament nu are sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Crema Aldara conține metilhidroxibenzoat, propilhidroxibenzoat (E216), alcool cetilic, alcool stearilic și alcool benzilic Metilhidroxibenzoatul (E 218) și propilhidroxibenzoatul (E 216) pot provoca reacții alergice (posibil întârziate). Alcoolul cetilic și alcoolul stearilic pot provoca reacții locale ale pielii (de exemplu, dermatită).

Acest produs conține 5 mg de alcool benzilic în fiecare plic. Alcoolul benzilic poate provoca reacții alergice și iritații locale ușoare.

3. Cum se utilizează acest medicament?

Copii și adolescenți până la 18 ani:

Utilizarea de către copii și adolescenți nu este recomandată.

Adulți:

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul.

Spălați-vă bine mâinile înainte și după aplicarea cremei. Acoperiți zona tratată nu cu bandaje sau alte pansamente după ce ați aplicat crema Aldara.

Folosiți de fiecare dată un nou pliculeț când aplicați crema. Aruncați crema rămasă după aplicare. Nu păstrați pliculețul deschis pentru o altă zi.

Frecvența și durata tratamentului pentru negi genitali, carcinom bazocelular și keratoză actinică diferă între ele (vezi instrucțiunile specifice pentru fiecare indicație).

Instrucțiuni pentru aplicarea cremei Aldara

● Când sunteți tratat pentru negi genitali:

Instrucțiuni pentru aplicare – (lu, mi și vi)

1. Înainte de a merge la culcare, spălați-vă mâinile și zona de tratat cu săpun blând și apă. Uscăți bine.
2. Odeschideți un nou pliculeț și stoarceți puțină cremă pe vârful degetului
3. Frecați un strat subțire de cremă Aldara pe negii curați și uscați și frecați ușor până când crema a fost absorbită în neg.
4. Aruncați pliculețul deschis după aplicarea cremei și spălați-vă mâinile cu apă și săpun.
5. Lăsați crema Aldara pe negi timp de 6 până la 10 ore. Nu faceți baie sau duș în acest timp. cadă sau duș.
6. După 6 până la 10 ore, pielea pe care a fost aplicată crema trebuie curățată cu săpun blând și apă curățată.

Aplicați crema Aldara de trei ori pe săptămână. De exemplu, aplicați crema luni, miercuri și vineri. Un plic conține suficientă cremă pentru a acoperi o zonă de piele cu negi de mărimea de 20 cm² pentru a acoperi.

Bărbații cu negi sub prepuț trebuie să-l retragă zilnic și să spele întreaga zonă (vezi secțiunea 2 „Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?”)

Continuați să utilizați crema Aldara până când negii dumneavoastră au dispărut complet (la jumătate dintre femei toți negii vor dispărea în 8 săptămâni, la jumătate dintre bărbați în 12 săptămâni, la anumiți pacienți negii pot dispărea deja după 4 săptămâni).

Nu utilizați crema Aldara mai mult de 16 săptămâni pentru fiecare tratament (nou) al negilor. Dacă aveți impresia că efectul cremei Aldara este prea puternic sau prea slab, discutați acest lucru cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

● Când sunteți tratat pentru carcinom bazocelular:

Instrucțiuni de utilizare – (lu, ma, mi, jo și vi)

1. Înainte de a merge la culcare, spălați-vă mâinile și zona de tratat cu săpun blând și apă. Uscăți bine.
2. Deschideți un nou plic și stoarceți puțină cremă pe vârful degetului.
3. Frecați un strat subțire de cremă Aldara pe locul afectat și 1 cm în jur. Frecați ușor până când crema este absorbită în piele.

4. Aruncați pliculețul deschis după aplicarea cremei și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.
5. Lăsați crema Aldara pe piele aproximativ 8 ore. Nu faceți baie sau duș în acest timp.
6. După 8 ore, spălați pielea pe care a fost aplicată crema cu săpun blând și apă.

Aplicați crema Aldara suficient pentru a acoperi zona de tratat și 1 centimetru în jurul acesteia, timp de șase săptămâni, cinci zile la rând în fiecare săptămână. Aplicați crema, de exemplu, de luni până vineri. Sâmbătă și duminică nu aplicați cremă. ● Când sunteți tratat pentru keratoză actinică:

Instrucțiuni de utilizare – (lu, mi, vi)

Înainte de culcare, spălați-vă pe mâini și zona de tratat cu săpun blând și apă.

1. Ușcați bine. Ușcați bine.
2. Frecați un strat subțire de cremă Aldara pe locul afectat. Frecați ușor până când crema este absorbită în piele.
3. Aruncați pliculețul deschis după aplicarea cremei și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.
4. Lăsați crema Aldara pe piele aproximativ 8 ore. Nu faceți baie sau duș în acest timp.
5. Lăsați crema Aldara pe piele timp de aproximativ 8 ore. Nu faceți baie în acest timp sau duș.
6. Spălați pielea unde a fost aplicată crema după 8 ore cu săpun blând și apă.

Aplicați crema Aldara de trei ori pe săptămână. De exemplu, aplicați crema luni, miercuri și vineri. Un pliculeț este suficient pentru a acoperi o suprafață de piele de 25 cm². Continuați să utilizați crema timp de patru săptămâni. La patru săptămâni după încheierea acestui prim tratament, medicul dumneavoastră vă va evalua pielea. Dacă nu toate leziunile au dispărut, este posibil să fie necesar un alt tratament de patru săptămâni. necesar.

Clătiți excesul de cremă cu săpun blând și apă. De îndată ce reacția cutanată a dispărut, puteți relua tratamentul. reluarea tratamentului.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Dacă uitați o doză, trebuie să o aplicați de îndată ce vă amintiți, după care puteți să vă continuați programul normal. Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul

sau farmacistul dumneavoastră. 4. Posibile efecte secundare

Frecvența efectelor secundare este clasificată după cum urmează:

Efecte secundare foarte frecvente (probabil apar la mai mult de 1 din 10 pacienți)

Efecte secundare frecvente (probabil apar la mai puțin de 1 din 10 pacienți)

Efecte secundare rare (probabil apar la mai puțin de 1 din 100 pacienți)

Reacții adverse rare (probabil apar la mai puțin de 1 din 100 de pacienți)

Reacții adverse rare (probabil apar la mai puțin de 1 din 1000 de pacienți)

Reacții adverse foarte rare (probabil apar la mai puțin de 1 din 10.000 pacienți).

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea se confruntă cu acestea.

Avertizați-vă medicul sau farmacistul cât mai curând posibil dacă nu vă simțiți bine în timpul unei perioade în care utilizați crema Aldara.

La unii pacienți au apărut modificări ale culorii pielii în zona unde a fost aplicată crema Aldara. Deși aceste modificări de obicei se reduc în timp, reduce cremei Aldara, trebuie să întrerupeți tratamentul, să spălați zona tratată cu săpun blând și apă, și să contactați medicul sau farmacistul. La câțiva pacienți a fost observată o ușoară scădere a trombocitelor. Din cauza scăderii

trombocitelor, puteți fi mai sensibil la infecții sau să faceți vânătăi mai ușor. De asemenea, poate apărea oboseala. Informați-vă medicul dacă apar aceste simptome. La unii pacienți cu un deficit imunitar, boala lor se poate agrava. Aveți un deficit imunitar

și utilizați crema Aldara? Informați-vă medicul dacă apar schimbări. Reacții cutanate severe au fost rar raportate. Dacă observați mici leziuni pe piele sau mici pete roșii care se dezvoltă mai departe, posibil cu simptome precum mâncărime, febră, stare gripală zone mici care se dezvoltă în continuare, posibil cu simptome precum mâncărime, febră, stare gripală senzație, articulații dureroase, probleme de vedere, durere la înghițire, durere sau mâncărime la ochi sau răni în gură, contactați imediat medicul dumneavoastră.

Un număr mic de pacienți suferă de căderea părului pe sau în jurul zonei tratate.

● Când sunteți tratat pentru negi genitali:

Multe dintre efectele secundare nedorite ale cremei Aldara sunt cauzate de acțiunea locală pe pielea dumneavoastră.

Reacțiile adverse foarte frecvente sunt roșeața (61% dintre pacienți), subțierea pielii (30% dintre pacienți), descuamare și umflare. Întărirea sub piele, mici răni deschise, cruste ca cele care apar în timpul vindecării normale a rănilor și mici vezicule sub piele pot apărea. După aplicarea cremei Aldara, puteți experimenta mâncărime (32% dintre pacienți), senzație de arsură (26% dintre pacienți) sau durere (8% dintre pacienți) în locurile unde ați aplicat crema. Majoritatea acestor reacții cutanate sunt de natură ușoară și pielea se va recupera aproximativ două săptămâni după întreruperea tratamentului.

Adesea, unii pacienți (4% sau mai puțin) au dureri de cap, uneori febră și simptome asemănătoare gripei, dureri articulare și musculare, prolaps uterin; la femei, durere în timpul actului sexual; disfuncții erectile; transpirație crescută; greață; probleme gastrice și intestinale; țiuit în urechi; înroșire; oboseală; amețeli; migrenă; membre amorțite; insomnie; depresie; apetit scăzut; ganglioni umflați; infecții bacteriene, virale și fungice (de exemplu, ulceratii); infecție vaginală cu secreție albă; tuse și răceală cu durere în gât raportate. durere în gât raportată.

Foarte rar au apărut reacții grave și dureroase, în special atunci când a fost aplicată mai multă cremă decât recomandat. În cazuri foarte rare, a fost dificil pentru femei să urineze din cauza reacțiilor cutanate dureroase la deschiderea vaginului. Dacă acesta este cazul, trebuie să solicitați imediat ajutor medical.

● Când sunteți tratat pentru carcinom bazocelular:

Multe dintre efectele secundare ale cremei Aldara sunt cauzate de acțiunea locală asupra pielii. Reacțiile cutanate locale pot fi un semn că medicamentul funcționează așa cum este intenționat.

Un efect secundar foarte frecvent este că pielea tratată mâncărime ușor.

Efectele secundare frecvente sunt amorțeala membrelor, mici umflături pe piele, durere, senzație de arsură, iritație, sângerare, roșeață sau erupție cutanată. Dacă o reacție cutanată devine prea neplăcută în timpul tratamentului, discutați cu medicul dumneavoastră. El/ea vă poate sfătui să întrerupeți utilizarea cremei Aldara pentru câteva zile (adică să faceți o scurtă pauză în tratament). Dacă există puroi sau un alt simptom care indică o infecție, discutați acest lucru cu medicul dumneavoastră. Pe lângă reacțiile cutanate, alte efecte secundare frecvente sunt glandele umflate și durerile de spate.

Uneori, unii pacienți experimentează modificări la locul de aplicare (secreție, inflamație, umflare, formare de crustă, descompunere a pielii, vezicule, dermatită) sau iritabilitate, greață, gură uscată, simptome asemănătoare gripei și oboseală. ● Când sunteți tratat pentru keratoză actinică:

● Când sunteți tratat pentru keratoză actinică:

Multe dintre efectele secundare ale cremei Aldara sunt cauzate de acțiunea locală asupra pielii. Reacțiile cutanate locale pot fi un semn că medicamentul funcționează așa cum este intenționat.

Un efect secundar foarte frecvent este că pielea tratată provoacă mâncărime ușoară.

Efectele secundare frecvente sunt durerea, senzația de arsură, iritația sau roșeața. Dacă o reacție cutanată devine prea neplăcută în timpul tratamentului, discutați cu medicul dumneavoastră. El/ea vă poate sfătui să întrerupeți utilizarea cremei Aldara pentru câteva zile (adică să faceți o pauză scurtă în tratament).

Dacă există puroi (supurație) sau un alt simptom care indică o infecție, discutați acest lucru cu medicul dumneavoastră. Pe lângă reacțiile cutanate, alte efecte secundare frecvente sunt durerea de cap, anorexia, greața, durerile musculare, durerile articulare și oboseala.

Uneori, unii pacienți experimentează modificări la locul de aplicare (sângerare, inflamație, secreție, sensibilitate, umflare, mici zone umflate ale pielii, amorțeală a membrelor, descumare, cicatrizare, ulcerații sau o senzație de căldură sau disconfort) sau inflamație a interiorului nasului, rinoree, gripă sau simptome asemănătoare gripei, depresie, iritație oculară, pleoapă umflată, durere în gât, diaree, keratoză actinică, roșeață, față umflată, ulcerații, durere în membre, febră, slăbiciune sau frisoane. Raportarea efectelor secundare

Dacă aveți efecte secundare, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru posibilele efecte secundare care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta efectele secundare direct posibile reacții adverse care nu sunt menționate în acest

prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul nostru ajută la obținerea mai multor informații despre siguranța acestui medicament. sistemul național de raportare, așa cum este menționat în anexa V. Prin raportarea reacțiilor adverse, puteți

5. Cum să păstrați acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe cutie și pe etichetă după „EXP”. Aceasta indică o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare. Pliculețele deschise nu trebuie reutilizate. Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați-vă

Întrebați-vă în mod corespunzător, acestea sunt distruse responsabil și nu ajung în mediu. 6. Conținutul ambalajului și alte informații corect.

Substanța activă din acest medicament este imiquimod. Fiecare pliculeț conține 250 mg cremă (100 mg cremă

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este imiquimod. Fiecare plic conține 250 mg cremă (100 mg cremă conține 5 mg imiquimod).
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt componentele acid isostearic, alcool benzilic,
- alcool cetilic, alcool stearilic, parafină albă moale, polisorbato 60, stearat de sorbitan, glicerină, metilparaben (E218), propilparaben (E216), gumă xantan, apă purificată. (Vezi și secțiunea 2 „Crema Aldara conține metilparaben,
- propilparaben (E216), alcool cetilic, și alcool stearilic și alcool benzilic”)

Cum arată crema Aldara și ce conține un ambalaj?

- Fiecare pliculeț de cremă Aldara 5% conține 250 mg de cremă albă până la galben deschis.
- Fiecare cutie conține 12 sau 24 de pliculețe de poliester/fole de aluminiu pentru o singură utilizare. Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie disponibile pe piață.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Viatris Healthcare Limited
Parcul Industrial Damastown
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlanda

Producător

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Germania

Pentru toate informațiile referitoare la acest medicament, contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de punere pe piață:

Belgia
Viatrix
Tel: +32 2 658 61 00

Bulgaria
Mylan EOOD
Tel: +359 2 44 55 400

Luxemburg
Viatrix
Tel: +32 2 658 61 00
(Belgia)

Ungaria
Viatrix Healthcare Kft.
1138 Budapesta
Váci út 150
Tel: +36 1 465 2100

Republica Cehă
Viatrix CZ s.r.o.
Tel: +420 222 004 400

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: +356 21 22 01 74

Danemarca
Viatrix ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Germania
Viatrix Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Țările de Jos
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 426 3300

Norvegia
Viatrix AS
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
33

Estonia
Viatrix OÜ
Tel: +372 63 63 052
Grecia
Viatrix Hellas Ltd
Tel: +30 210 010 0002

Spania
Viatrix Pharmaceuticals, S.L.
C/Plom, 2-4, etajul 5
08038 - Barcelona
Tel: +34 900 102 712

Franța
Viatrix Santé
1 bis place de la Défense – Tour Trinity
92400 Courbevoie
Tel: +33 (0)1 40 80 15 55

Croația
Viatrix Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 235 059 90

Irlanda
Viatrix Limited
Tel: +353 1 8711600

Islanda
Icepharma hf
Sími: +354 540 8000

Italia

Viatrix Italia
Via Vittor Pisani,
2020124 Milano
Tel: +39 (0) 2 612 46921

Cipru
CPO Pharmaceuticals Limited
Τηλ: +357 22863100

Letonia
Viatrix SIA
101 Mūkusalas str.
Rīga LV-1004
Tāl: +371 67616137
Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich
Viatrix Austria GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien
Tel: + 43 (0)1 86 390

Polska
Viatrix Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Tel: +48 22 546 6400

Portugal
Viatrix Healthcare, Lda.
Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa
Tel: +351 214 127 200

România
BGP PRODUCTS SRL
Tel.: +40372 579 000

Slovenija
Viatrix d.o.o.
Tel: +386 1 23 63 180

Slovenská republika
Viatrix Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100
Suomi/Finland
Viatrix Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Sverige
Viatrix AB
Box 23033
104 35 Stockholm
+46 (0) 8 630 19 00

Lituania
Viatrix UAB
Str. Žalgirio 90-100
Vilnius LT-09303
Tel. + 370 52051288

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în
Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al
Agenției Europene pentru Medicamente (<http://www.ema.europa.eu>).