

Kasutusjuhend: Teave kasutajale

Allergospasmin® N

1 mg/0,5 mg ühe pihustuse kohta

Survegaasinhalaator, suspensioon

Toimeained: Naatriumkromoglükaat (Ph. Eur.)/

Reproteroolhüdrokloriid

Kasutamiseks lastel ja täiskasvanutel

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet.

- Hoidke pakendi infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.
- See ravim on määratud teile isiklikult. Ärge andke seda teistele edasi. See võib teistele inimestele kahju teha, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida ei ole selles pakendi infolehes nimetatud. Vt lõik 4.

Mis on selles pakendi infolehes

1. Mis on Allergospasmin N ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peate teadma enne Allergospasmin N kasutamist?
3. Kuidas Allergospasmin N-i kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas Allergospasmin N-i säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Allergospasmin N ja milleks seda kasutatakse?

Allergospasmin N on põletikuvastane ja hingamisteid laiendav vahend. Kasutusala

– Äkilise hingamisraskuse sümptomaatiline ägeda ravi (eriti allergilised vormid ning need, mis on põhjustatud koormusest, stressist või infektsioonidest). Märkus: Pikaajaline ravi peaks olema sümptomitele orienteeritud ja toimuma ainult koos põletikuvastase püsiraviga.

– Sihtotstarbeline ennetamine koormusastma või etteaimatava allergeenikontakti korral.

2. Mida peaksite teadma enne Allergospasmin N kasutamist?

Allergospasmin N ei tohi kasutada,

- kui olete allergiline naatriumkromoglükaadi, reproteroolhüdrokloriidi ja mentooli/piparmündiõli või mõne selle ravimi lõigus 6.1 nimetatud muu koostisosa suhtes.
- kui ravi ajal tekib kopsupõletiku erivorm (eosinofiilne pneumoonia). Sel juhul tuleks Allergospasmin N ravi katkestada.
- imikutele ja väikelastele alla 2 aasta (kõri krampi oht).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teavitage oma arsti enne kasutamise alustamist, kui teil on teada mõni järgmistest haigustest:

- südamehaigused teie anamneesis, eriti hiljutine südameatakk,
- südame pärgarterite haigus stenokardiaga,

- südame rütmihäired
- südame ebanormaalne suurenemine (hüpertroofiline obstruktiivne kardiomiopaatia)
- neerupealise kasvaja (feokromotsütoom)
- raske kilpnäärme ületalitus

Kui teil esineb südamepekslemine (tahhükardilised südamerütmihäired), tohib Allergospasmin N kasutamine toimuda ainult eriliste ettevaatusabinõude, nt jälgimise (EKG-kontroll) all. Kuna pärast suurte annuste kasutamist võivad veresuhkru tase ja vabad rasvhapped tõusta, on diabeetikutel vajalik regulaarne veresuhkru kontroll. Suuremate annuste kasutamisel on samuti vajalik kaaliumitaseme kontroll vereseerumis, eriti samaaegse ravi korral veeväljutavate ravimitega (diureetikumid) ja südamepuudulikkuse ravimitega (nt südameglükosiidid).

Allergospasmin N suurenev vajadus on haiguse halvenemise märk. Sellises olukorras peab arst ravi plaani üle vaatama ja vajadusel määrama täiendavate põletikuvastaste või muude ravimite manustamise.

Kui ettenähtud ravi ei too kaasa rahuldavat paranemist või isegi halvenemist, on vajalik arsti konsultatsioon, et vajadusel täiendada ravi teiste ravimitega (täiendavate põletikuvastaste nagu kortikoidid ja/või bronhe laiendavate ainete nagu teofülliin) või määrata annuse muutmine.

Äkiline ja suurenev astma sümptomite halvenemine võib olla eluohtlik. Sellistel juhtudel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. Oluline ettenähtud annuse ületamine võib olla ohtlik. Korduvalt on teatatud põhihaiguse raskete tüsistuste, sealhulgas surmajuhtumite olulisest riskist, kui astmat raviti β -sümpatomimeetikumide sisaldavate inhalatsioonimonopreparaatidega pikema aja jooksul suurte või ülemääraste annustega ja põletikuvastane ravi oli ebapiisav. Põhjuslikke seoseid ei ole seni piisavalt selgitatud. Otsustavat rolli näib mängivat ebapiisav põletikuvastane ravi.

Lapsed

Imikud ja väikelapsed alla 2 aasta ei tohi Allergo-spasmin N kasutada (kõri krampi oht).

Lapsi peaks vastavalt nende vanusele arst teavitama järgimisest annustamisest ja võimalikest kõrvaltoimetest.

Mõjud väärkasutamisel dopingueesmärkidel

Allergospasmin N kasutamine võib dopingukontrollides viia positiivsete tulemusteni.

Allergospasmin N kasutamine koos teiste ravimitega Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate/kasutate teisi ravimeid, olete hiljuti võtnud/kasutanud teisi ravimeid või kavatsete võtta/kasutada teisi ravimeid.

Samaaegsel kasutamisel

- teiste bronhe laiendavate ainete (bronhodilataatorid) nagu adrenergilised ained või metüülksantiinid (nt teofülliin) tuleb arvestada Repreroohlüdrokloriidi kirjeldatud kõrvaltoimete võimaliku tugevnemisega.
- vererõhku alandavate ravimitega (eelkõige β -retseptorite blokaatorid) tühistatakse Repreroohlüdrokloriidi toime. See võib viia astmahoo tekkeni.

- Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAO-A inhibiitorid) ja tritsüklilised antidepressandid võivad põhjustada Reproteroolhüdrokloriidi tugevdatud mõju südame-veresoonkonna süsteemile.

Allergospasmin N kasutamine koos alkoholiga

Üldiselt tuleks ravimisel hoiduda alkoholsete jookide tarbimisest. Muid erilisi ettevaatusabinõusid ei ole vaja.

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või toidate last rinnaga, kahtlustate, et olete rase või kavatsete rasestuda, küsige enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstilt või apteekrilt. Raseduse ajal tohib Allergospasmin N-i kasutada ainult

rasketel haigusjuhtudel, rangelt kaaludes kasu-riski suhet, kuna raseduse ajal ei ole piisavalt kogemusi Allergospasmin N-iga. Naatriumkromoglükaat eritub rinnapiima väga väikestes kogustes.

Pärast Reproteroolhüdrokloriidi inhalatiivset kasutamist ei ole ema vereringesse jõudnud annus mõõdetav. Seetõttu ei ole tõenäoliselt ohtu rinnaga toidetavale imikule.

Autojuhtimise ja masinate käsitlemise võime

Allergospasmin N-i on väike mõju autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele. Individuaalselt esinevate erinevate reaktsioonide tõttu võib üksikjuhtudel, eriti ravi alguses ning kõrgema või ülemäärase annustamise korral, olla aktiivne osalemine liikluses või masinate käsitlemine häiritud. See kehtib eriti alkoholi, rahustite ja uinutite samaaegsel tarbimisel.

Allergospasmin N sisaldab etanooli (alkohol)

See ravim sisaldab 0,7 mg alkoholi (etanooli) ühe pihustuse kohta, mis vastab 0,7 mg/70,0 mg. Selle ravimi ühe pihustuse kogus vastab vähem kui 1 ml õllele või 1 ml veinile. Selle ravimi väike alkoholisisaldus ei avalda tajutavat mõju.

Allergospasmin N sisaldab naatriumi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 10 ml kohta, st see on peaaegu „naatriumivaba“.

3. Kuidas Allergospasmin N-i kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt arsti juhiste järgi. Kui te ei ole milleski kindel, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Annustamine sõltub haiguse tüübist ja raskusastmest.

Täiskasvanutele ja lastele, kes on vanuse poolest võimelised doseerimisaerosooli õigesti käsitlema, kehtivad järgmised soovitusel:

Annustamine sõltub hingamisteede kaebuste ulatusest (nt köha, röga, hingeldus). Algannus on 4 korda päevas 2 pihustust.

Allergospasmin N, st 2 inhalatsiooni hommikul, lõuna ajal, varasel õhtul ja enne magamaminekut, kusjuures tuleb järgida vähemalt 3-tunnist vahet. Pärast terapeutilise toime saavutamist võib päevast annust arsti juhendamisel järk-järgult vähendada, kuni sümptomid on kontrolli all.

Ettevalmistavaks ennetamiseks füüsilise koormuse astma või ettenähtava allergeenikontakti korral võib umbes 10-15 minutit varem sisse hingata 2 pihustust Allergospasmin N-i. See on tavaliselt vajalik ainult siis, kui eelmisest inhalatsioonist on möödunud rohkem kui 3 tundi.

Äkiliste bronhospasmide ja äkilise hingeldushoo ägedaks raviks võib lisaks sisse hingata veel 1 pihustuse Allergospasmin N-i. See toob enamikul juhtudel juba kiiret hingamise kergendust. Kui hingeldus ei ole viis minutit pärast esimese pihustuse sissehingamist märgatavalt paranenud, võib sisse hingata veel ühe pihustuse. Kui ka teine pihustus ei leevenda tõsist hingeldushoogu, võivad olla vajalikud täiendavad pihustused. Sellistel juhtudel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole kasutada.

Kogu päevane annus ei tohiks ületada 16 pihustust, kuna suurem annus ei anna üldiselt täiendavat terapeutilist kasu, kuid suurendab tõsiste kõrvaltoimete esinemise tõenäosust.

Kasutusjuhend:

Aerosooli tuleb alati hoida püsti, põhja ülespoole, olenemata kehaasendist, milles sisse hingatakse. Võimalusel tuleks kasutada istudes või seistes. Enne esmakordset kasutamist pihustage 4 korda õhku, et doseerimisaerosool kasutusvalmis teha! Kui Allergospasmin N-i ei ole erandkorras kasutatud rohkem kui 2 päeva, tuleb vähemalt 2 pihustust õhku pihustada, et doseerimisaerosool taas kasutusvalmis teha.

1. Eemaldage oranž kaitsekork.
2. Enne iga pihustust raputage püsti hoitavat doseerimisaerosooli tugevalt.
3. Hingake sügavalt välja. Ärge hingake huuliku sisse.
4. Ümbritsege huulik täielikult huultega. Hingake aeglaselt ja sügavalt sisse ning samal ajal vajutage metallmahutit lõpuni alla, et vabastada üks pihustus.
5. Eemaldage huulik suust. Hoidke hinge kinni mõni sekund, seejärel hingake aeglaselt läbi nina välja.
6. Tavaliselt korrake sissehingamist umbes minuti pärast, järgides punkte 3 - 5. Seejärel asetage oranž kaitsekork plastikust korpusele tagasi.

Olulised hooldus- ja puhastusjuhised

Allergospasmin N on ravimpreparaat, milles mõlemad toimeained on peenelt jaotatud tahkel kujul. Teatud jääkainete esinemine plastikust korpuses on vältimatu. Selleks, et teie doseeraerosool korralikult töötaks, tuleb plastikust korpust puhastada iga kahe kuni kolme päeva tagant, eelistatavalt iga päev. Nii väldite pihustusava ummistumist kasutamise käigus.

Kui pihustusava siiski ummistub või selline häire ilmneb, ärge proovige enam pihustusi võtta, vaid kasutage plastikust korpust alles pärast uuesti puhastamist. Seejärel töötab doseeraerosool jälle laitmatult.

Puhastamiseks eemaldage oranž kaitsekork ja võtke metallmahuti plastikust korpusest välja. Hoidke plastikust korpust huulik allapoole vertikaalselt sooja veejuga all, et võimalikud kleepumised pihustusavas lahti tuleksid (vt joonis). Seejärel raputage vesi maha ja laske plastikust korpusel hästi kuivada (kõige parem üleöö), enne kui asetate metallmahuti uuesti sirgelt sisse ja panete oranži kaitsekorgi peale. Metallmahuti ventiili kummist kaitsekork peab olema täpselt ja

kindlalt peal ning seda ei tohi eemaldada. See kork on pihustusseadme laitmatu toimimise jaoks oluline.

Kasutamise kestus:

Kasutamise kestuse määrab teie raviarst. Astma ravi on tavaliselt pikaajaline ja peaks toimuma vastavalt raskusastmele järk-järgult. Ravi edukust tuleks kontrollida regulaarsete arstlike läbivaatustega. Ilma arsti juhusteta Allergospasmin N kasutamise suurendamine võib olla teile ohtlik. Allergospasmin N suurenev vajadus on haiguse halvenemise märk. Sellises olukorras peab arst ravi plaani üle vaatama ja vajadusel määrama täiendavaid põletikuvastaseid või muid ravimeid. Haiguse kulgu ning hingamisteid laiendava ja põletikuvastase ravi edukust on oluline igapäevaselt arsti juhendamisel jälgida. See toimub nt tippvoolumõõturiga mõõdetud hingamisvoo registreerimise kaudu. Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on tunne, et Allergospasmin N toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui olete kasutanud suuremat kogust Allergospasmin N-i kui peaksite
Üleannustamise sümptomid on peamiselt tingitud Allergospasmin N-is sisalduvast toimeainest reproteroolhüdrokloriidist. Tugeva reproteroolhüdrokloriidi üleannustamise korral võib tekkida südameklappimine (tahhükardia), südamerütmihäired (arütmia), madal vererõhk (hüpotensioon) kuni šokini, rahutus, valu rinnus, peavalu ja tugev käte värisemine (treemor), aga ka kogu kehas. Lisaks võib seerumi kaaliumisisaldus langeda ning veresuhkru tase tõusta või võib tekkida haigusseisund, kus kudede ja vere pH-tase on madal piimhappe suurenenud sisalduse tõttu (laktaatsidoos).

Kahtluse korral Allergospasmin N üleannustamise suhtes ei tohi rohkem sissehingamisi teha. Teavitage kohe oma arsti, kes võib alustada sümptomaatilist ravi.

Kui suur kogus doseeraerosooli on kogemata alla neelatud, tuleks kaaluda maoloputust; aktiivsüsi ja lahtistid võivad vähendada β 2-sümpatomimeetikumi soovimatut toimet. Vastumürgina sobivad β 1-retseptorite blokaatorid (nt atenolool, metoprolol), kuid ka neid tuleb kasutada ettevaatlikult, et vältida astmaga patsientidel hingamisraskuste süvenemist. Südamepuudulikkusega patsientidel on parem manustada rahusteid (nt bensodiasepiinid). Samal ajal tuleks südamefunktsiooni jälgida EKG abil.

Kui olete unustanud Allergospasmin N-i kasutada
Ärge kasutage kahekordset kogust, kui olete eelneva kasutamise unustanud, vaid jätkake ravi tavapäraselt.

Kui katkestate Allergospasmin N-i kasutamise

Kui soovite ravi katkestada või enneaegselt lõpetada, teavitage palun oma arsti, et ta saaks teiega edasisi ravimeetmeid arutada.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuid need ei pruugi ilmnedagi kõigil patsientidel.

Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse järgmisi sageduse määratlusi:

Väga sage: rohkem kui 1 ravitav 10-st

Sage: 1 kuni 10 ravitavat 100-st

Aeg-ajalt: 1 kuni 10 ravitavat 1 000-st

Harv: 1 kuni 10 ravitavat 10 000-st

Väga harv: vähem kui 1 ravitav 10 000-st

Teadmata: sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Reproteroolhüdrokloriid

Aeg-ajalt, eriti erilise tundlikkuse ja/või suurema annuse korral, võivad tekkida peen värin (treemor) ning südamepekslemine, rahutustunne või peavalu, mis aga ravi jätkamisel 1 - 2 nädala jooksul tavaliselt taanduvad.

Selliste sümptomite sagenemine ning südamekloppimine (tahhükardia) on aga üleannustamise tunnused. Sellisel juhul tuleks ravimi annust vähendada ja viivitamatult teavitada raviarsti.

Reproteroolhüdrokloriidiga ravi ajal võib seerumi kaaliumisisaldus langeda ning veresuhkru tase tõusta. Kirjeldatud efektid ilmnevad üldiselt alles suuremate annuste korral (palun vaadake ka juhiseid jaotises „Kui olete kasutanud suuremat kogust Allergospasmin N-i, kui peaksite“).

Naatriumkromoglükaat

Naatriumkromoglükaadi sissehingamisel võib tekkida kõhaga kaasnev kurgu ja hingetoru ärritus, mis üksikjuhtudel võib viia bronhide spasmini (refleks-bronhokonstriksioon).

Väga harvadel juhtudel võib bronhospasm olla nii väljendunud, et ravi tuleb katkestada.

Bronhide spasmi (bronhokonstriksiooni) vastu toimib käesolevas kombinatsioonis samaaegselt sissehingatav bronhe laiendav (bronhospasmolüütiline) reproteroolhüdrokloriid. Astmaatikutel on naatriumkromoglükaadi ravi ajal täheldatud naha- või lihaspõletikke (dermatiit, müosiit) ning mao ja soolte limaskesta põletikku (gastroenteriit). Need kõrvaltoimed ei olnud tõsised ja taandusid pärast naatriumkromoglükaadi kasutamise lõpetamist täielikult. Harvadel juhtudel on teatatud nahalööbest (nahalööve). Väga harva on täheldatud kopsupõletiku (eosinofiilne pneumoonia) erivormi esinemist.

Üksikjuhtudel on teatatud tõsistest ülitundlikkusreaktsioonidest (üldised anafülaktilised reaktsioonid) koos bronhiaalspasmidega (bronhospasmid) seoses naatriumkromoglükaadi raviga.

Lisaks on üksikjuhtudel kirjeldatud järgmisi soovimatuid toimeid, mis osaliselt kuuluvad naatriumkromoglükaadi teadaolevasse kõrvaltoimete spektrisse.

glicat välja kukkuma:

Kõriturse (larüngeaalne turse), kähedus, kudede turse (angioödeem) huulte, näo ja/või jäsemete osalusel, pearinglus, iiveldus, kõrvasüljenäärme turse (parotiit), liigesevalu, veriköha (hemoptüüs), lihaskramplikus, perifeerne närvipõletik (neuriit), arteripõletik (arteriit), südamepaunapõletik (perikardiit), raskendatud urineerimine (düsuuria) ja neerukahjustus (nefrotoksilisus).

Järgnevas tabelis on ülevaade kõrvaltoimetest, mis võivad esineda Reproteroli või naatriumkromoglükaadi kasutamisel, järjestatud süsteemorganite klasside ja sageduse järgi.

Haigused Immunsüsteem	Väga harva harva	Ülitundlikkusreaktsioonid Ten reaktsioonid bronhiaalspasmidega (anafülaktiline reaktsioon bronhospasmidega) Pole teada
	Ülitundlikkusrea ktsioonid (sh sügelus, nõgestöbi	(urtikaaria), nahalööve (eksanteem), madal vererõhk (hüpo- tensioon) madal vererõhk (hüpo- tonie), koe turse- mised (angioödeem) koos huulte, näo ja/või jäsemete kaasamisega) Ainevahetus- ja
toitumishäired Väga harv Kaaliumpõhine kontsentratsioon	langus seerumis, veresuhkru taseme tõus seerumis	Psühhiaatrilised haigused Aeg-ajalt Pole
teada haigused	Juhuslik- kerge Mitte võib	Rahutustunne Hüperaktiivsus, unehäire- d, hallutsinatsioonid (eriti lastel kuni 12 aastat)
Närvisüsteemi haigused	Aeg-ajalt harva Väga harva Peenetreemor	(peenetreemor), peavalu Peapööritus, perifeerne närvipõletik (perifeerne neuriit) Südamehaigused Aeg-ajalt
harva	Juhuslikud kerge Väga harv- ane Pole te- ada	Südamepekslemine, südamekloppimine (Tahhükardia) Südamepauna põletik (Perikardiit) Südamerütmihäired, Mõju vererõhu- le (alandamine või tõstmine)
Veresoonekonna haigused	Väga harv- ane	Arterite põletik (Arteri- iit)
Hingamisteede haigused, rindkere ja mediastiinumi diastinums	Väga harv- harva	Köha, kurgu ja hingetoru ärritus, bronhospasm, eriline kopsupõletiku vorm (eosinofiilne kopsupõletik), kõriturse (larüngeaalne ödeem), kähedus, veriköha (hemoptüüs) Seedetrakti haigused Väga harv- harva
Mao ja soolte limaskestapõletik (gastroenteriit), oksenda- traktid	Väga harv kümme	Limaskestapõletik mao ja soolte (Gastroenteriit), oksendamine ärritus, kõrvasüljenäärme (parotiis) paistetud paistetud)
Haigused nahk ja nahaalune koe	Väga harv juhul	Naha põletik (dermatiit))
Lihaskonna, sidekoe ja luuhaigused Väga harv	juhul Lihasepõletik (müosiit),	liigesevalu, lihasevalu Haigused

nahk ja nahaalune Neerud ja kuseteed ge	Väga harv ten	Raske urineerimine (düsuuria), Neerukahjustus (nefrotoksilisus) Neerukahjustus (Nefro-roto-toksilisus)
---	---------------	--

Raske kõrvaltoime ilmnemisel ei tohiks Allergospasmin N-i enam sisse hingata ja arstile tuleks viivitamatult teatada ilmnunud sümptomitest!

Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui mõni loetletud kõrvaltoimetest teid oluliselt häirib või kui märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole mainitud.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Vastavalt sensibiliseeritud patsientidel võib mentool põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (sealhulgas hingamisraskusi).

Kõrvaltoimete teatamine

Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles pakendi infolehes ei ole mainitud. Võite kõrvaltoimetest teatada ka otse Saksamaa Ravimiametile, osakond Farmakovigilants, Kurt-Georg-kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, veebisait: <https://www.bfarm.de>. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkemate andmete kättesaadavaks tegemisele.

5. Kuidas Allergospasmin N-i säilitada?

Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles pakendi infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest võite teatada ka otse Saksamaa Ravimiametile, osakond Farmakovigilants, Kurt-Georg-kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, veebisait: <https://www.bfarm.de>. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkem teabe kättesaadavaks tegemisele.

Te ei tohi ravimit kasutada pärast pakendil märgitud

Hoidke seda ravimit lastele kättesaamatus kohas ilmneb.

Te ei tohi ravimit pärast karbil märgitud kuupäeva ja mahutil märgitud „Kasutatav kuni“ kuupäevani aegumiskuupäeva ei tohi enam kasutada. Aegumiskuupäev viitab märgitud kuu viimasele päevale.

Kasutustingimused:

Mahuti on rõhu all.

Kaitsta päikesevalguse jatugeva kuumenemise (üle +50°C) ning niiskekeskkonna eest. Mitte avada jõuga. Ka pärast kasutamist mitte avada jõuga ega põletada. 6. Pakendi sisu ja lisainformatsioon Mida Allergospasmin N sisaldab:

– Toimeained on:

1 pihustus sisaldab 70,00 mg:

– Toimeained on:

– Muud koostisosad on:

Apafluraan, poliü(oksüetüleen)-25-glütserooltrioleaat, etanool, naatriumsahhariin, Dentomint PH 799959 (lõhnaaine)

See ravim sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

PH 799959 (Aroomiaine)

See ravim sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

Iga inhalaator sisaldab 17,234g HFKW-227ea, mis vastab 0,055 tonnile CO₂-ekvivalendile (kasvuhoonegaaside potentsiaal GWP = 3220).

Kuidas Allergospasmin N välja näeb ja pakendi sisu:

Mõlemad toimeained on valge pulbri kujul. Allergospasmin® N on saadaval järgmistes pakendites:

1 x 10ml rõhugaasiinhalaator, suspensioon vähemalt 200 pihustusega

2 x 10ml (N 2) rõhugaasiinhalaator, suspensioon vähemalt 2 x 200 pihustusega

3 x 10ml (N 3) rõhugaasiinhalaator, suspensioon vähemalt 3 x 200 pihustusega

Ravimi müügiloo hoidja

Viatrix Healthcare GmbH

Lütticher Straße 5

53842 Troisdorf

Tootja:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Ei el

37100 Tours

PRANTSUSMAA

või

Mylan Germany GmbH

Filiaal Bad Homburg

Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Seda pakendi infolehte uuendati viimati novembris 2024.

Allergospasmin® N on retseptiravim

Lugupeetud patsient,

Allergospasmin N sisaldab hingamisteid laiendavat (reproteroolhüdrokloriid) ja põletikuvastast (naatriumkromoglükaat) toimeainet. Allergospasmin N ravi edukuse eelduseks on, et kasutate ravimit vastavalt oma arsti annustamissoovitustele. Palun pidage mees: Ainult siis, kui kasutate Allergospasmin N-i vastavalt oma arsti juhiste regulaarselt, saab ravim oma täieliku efektiivsuse avaldada. Kasutage võimalust enesekontrolliks, määrates iga päev oma väljahingamise tippkiirust tippvoolumõõturiga. Tulemuste regulaarne ülesmärkimine võimaldab teie raviarstile paremat haiguse hindamist - oluline eeltingimus teie raviks.