

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren
Allopurinol Accord 100 mg tabletter
Allopurinol Accord 300 mg tabletter
Allopurinol

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig

informasjon for deg. Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen din eller apoteket.
- Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er forskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har samme symptomer som deg.
- Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget?
- Ta da kontakt med legen din eller apoteket. lege av apotek.

Innhold av denne pakningsvedlegget

1. Hva er Allopurinol Accord og hva brukes dette legemidlet til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva er Allopurinol Accord og hva brukes dette legemidlet til?

Allopurinol Accord inneholder virkestoffet allopurinol. Allopurinol tilhører en gruppe av medisiner som kalles enzymhemmere. Disse medisinene hjelper med å kontrollere hastigheten på visse kjemiske endringer i kroppen.

Denne medisinen brukes ved tilstander der kroppen produserer for mye urinsyre, som: gikt (smertefull betennelse på grunn av krystallisert urinsyre i et ledd), visse nyresykdommer eller nyrestein; kreft og noen stoffskiftesykdommer, som fører til opphopning av for mye urinsyre.

2. Når skal du ikke bruke denne medisinen eller være ekstra forsiktig?

Når skal du ikke bruke denne medisinen?

• Du er allergisk mot noen av stoffene i denne medisinen. Disse stoffene finner du i avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget. Hvis du er usikker, snakk med legen din før du bruker denne medisinen bruker.

Når skal du være ekstra forsiktig med denne medisinen?

Kontakt legen din eller apoteket før du bruker denne medisinen:

- hvis du har en lever- eller nyresykdom eller har hatt det tidligere
- hvis du bruker medisiner (diuretika (vanddrivende) og/eller en ACE-hemmer) for hjertesykdommer eller høyt blodtrykk

- hvis du har et plutselig anfall av gikt (smertefull betennelse på grunn av krystallisert urinsyre i et ledd)
- hvis du er av Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk opprinnelse.
- hvis du skjoldbruskkjertelproblemer har

Vær ekstra forsiktig med denne medisinen

Hvis du har nyrestein. Nyresteinene vil bli mindre, og det er en liten sjanse for at de kan trenge inn i urinlederne og forårsake blokkering

Ved bruk av allopurinol er det rapportert om hudutslett. Disse utslettene er ofte ledsaget av sår i munnen, halsen, nesen og kjønnsorganene og med konjunktivitt (røde og hovne øyne). Disse alvorlige formene for hudutslett blir ofte innledet av influensalignende symptomer, som feber, hodepine, kroppssmerter. Hudutslettet kan forverres til omfattende blemmer og avskalling av huden. Disse alvorlige hudreaksjonene kan forekomme oftere hos personer av Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk opprinnelse. Kronisk nyresykdom kan øke risikoen hos disse pasientene ytterligere. Hvis du utvikler hudutslett eller disse hudreaksjonene, slutt å bruke allopurinol og kontakt legen din umiddelbart. Hvis du har kreft eller

Lesch-Nyhan syndrom (en stoffskiftesykdom), kan mengden mengde for å fortynne urinen din. drikke for å fortynne urinen din.

Barn og unge opp til 18 år

Bruken av denne medisinen hos barn er svært sjelden, bortsett fra ved visse former for kreft (spesielt leukemi) og noen stoffskiftesykdommer som Lesch-Nyhan syndrom.

Bruker du andre medisiner?

Bruker du i tillegg til Allopurinol Accord andre medisiner, har du gjort det nylig eller skal du kanskje gjøre det snart? Fortell det da legen din eller apotekeren ..

medisiner som demper kroppens naturlige forsvar (immunsuppressiva), f.eks. 6-merkaptopurin, azatioprin og ciklosporin

adenin arabinose (vidarabin), brukt til behandling av herpes eller vannkopper

andre medisiner for behandling av gikt, som probenecid

aspirin (eller lignende medisiner, kalt salisylater)

klorpropamid, brukt til behandling av diabetes (sukkersyke)

medisiner som tynner blodet (antikoagulanter), som warfarin

medisiner som brukes til behandling av anfall (ukontrollerbare kroppssjokk, ofte som en del av et epileptisk anfall), fenytoin

teofyllin, brukt for pusteproblemer

medisiner mot visse infeksjoner med bakterier (antibiotika) (ampicillin eller amoxicillin)

medisiner som brukes til behandling av kreft

didanosin, brukt til behandling av infeksjonssykdommen HIV (Humant immunsvikt virus)

medisiner for hjerteproblemer eller høyt blodtrykk, som ACE-hemmere (en viss gruppe blodtrykksenkende medisiner) eller vandrivende tabletter (diuretika)

Aluminiumhydroksid (brukt for å nøytralisere syren i magen), fordi dette kan redusere effekten av allopurinol. Mellom administreringen av disse medisinene må det være et intervall på minst 3 timer.

Ved administrering av Allopurinol Accord og cytostatika (f.eks. cyklofosamid, doksorubicin, bleomycin, prokarbazin, alkylhalogenider), oppstår blodsykdommer (en blodsykdom) oftere enn når disse virkestoffene gis alene. Derfor må regelmessig blodet undersøkes . bli.

må dosen av 6-merkaptopurin eller azatioprin reduseres fordi disse stoffene da varer lenger Når 6-merkaptopurin eller azatioprin gis samtidig med [allopurine 5 produktnavn], må dosen 6-merkaptopurin eller azatioprin reduseres fordi disse stoffene da forblir lenger virke. Det kan øke risikoen for alvorlige problemer med blodet ditt. I en slik situasjon vil 3 legen din nøye overvåke blodet ditt under behandlingen. Søk straks medisinsk hjelp hvis du merker at du har en uforklarlig blåmerke, blødning, feber eller sår hals her

Graviditet, amming og fruktbarhet

Er du gravid, tror du at du er gravid, ønsker du å bli gravid eller ammer du? Ta da kontakt med legen din eller apoteket før du bruker denne medisinen.

Allopurinol går over i morsmelk hos mennesker. Denne medisinen anbefales ikke under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Denne medisinen kan gjøre noen mennesker søvnige eller gi mindre kontroll over bevegelsene deres. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner før du vet hvilken effekt denne medisinen har på deg.

Allopurinol Accord inneholder laktose

Denne medisinen inneholder laktose (en type sukker). Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, kontakt legen din før du bruker denne medisinen.

3. Hvordan bruker du denne medisinen?

Bruk alltid denne medisinen nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Ta da kontakt med legen din.

Mengden av denne medisinen som folk må ta, kan variere mye. Legen din vil bestemme hvilken dose av denne medisinen som er passende for deg.

Legen din starter vanligvis med en lav dose allopurinol (f.eks. 100 mg/dag) for å redusere risikoen for mulige bivirkninger. Dosen din vil bli økt om nødvendig.

Den vanlige startdosen er 100 til 300 mg per dag, som kan tas som en enkelt dose etter måltidet. Dosen kan økes til 900 mg per dag, avhengig av hvor alvorlig tilstanden din er. din tilstand er.

dosen i mindre mengder, fordelt over dagen for å redusere risikoen for bivirkninger i mage-tarmkanalen. Hvis du er eldre eller hvis leveren eller nyrene dine ikke fungerer godt, kan det hende at legen din foreskriver en lavere

dose, eller at du må vente lenger mellom to doser. Hvis du får dialyse to eller tre ganger i uken, kan legen din foreskrive en dose på 300 eller 400 mg, som du må ta rett etter dialysen. Bruk hos barn og ungdom under 18 år Barn og ungdom under 15 år 10-20 mg/kg kroppsvekt/dag opp til maksimalt 400 mg per må tas.

Bruk hos barn og unge opp til 18 år

Barn og ungdom opp til 15 år 10-20 mg/kg kroppsvekt/dag til maksimalt 400 mg per dag fordelt over 3 administrasjonstidspunkter. Dette legemidlet brukes sjelden hos barn, med unntak for visse typer ondartede sykdommer (spesielt leukemi) og visse metabolske sykdommer, for eksempel Lesch-Nyhan-syndrom.

Administrasjonsmåte

Dette legemidlet skal tas gjennom munnen.

Ta tablettene med et glass vann, da kan du lettere svelge dem.

Ta tablettene etter måltid for å redusere risikoen for bivirkninger som kvalme og oppkast.

Har du brukt for mye av dette legemidlet?

Hvis du tar for mange tabletter eller hvis noen andre ved et uhell tar legemidlet ditt, fortell det da umiddelbart til legen din eller dra til nærmeste sykehus. Ta med legemiddelpakningen. Tegn på en overdose kan blant annet være: kvalme, oppkast, diaré og svimmelhet.

Har du glemt å ta dette legemidlet?

Hvis du har glemt å ta legemidlet ditt, ta det så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten tid for neste dose, bør du hoppe over den glemte dosen. Ta ikke dobbel dose for å ta igjen en glempt dose.

Hvis du slutter å bruke denne medisinen

Ikke slutt å bruke denne medisinen med mindre legen din sier det.

Har du flere spørsmål om bruken av denne medisinen? Ta kontakt med legen din eller apoteket.

4. Mulige bivirkninger

Som alle medisiner kan også denne medisinen ha bivirkninger. Ikke alle opplever dem.

Overfølsomhet

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

Kontakt legen din umiddelbart hvis du har noen av følgende symptomer:

enhver hudforandring, som flassende hud, sår eller smertefulle lepper og munn eller i svært sjeldne tilfeller plutselig hvesende pust, bankende hjerterytme eller trykk på brystet, plutselig svakhet og kollaps ('kollaps')

Sjeldent (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere)

feber og frysninger, hodepine, muskelsmerter (influensalignende symptomer) og du føler deg generelt ikke bra

alvorlig overfølsomhetsreaksjoner med feber, hudutslett, leddsmerter, blodforandringer og i tester som undersøker leverfunksjonen (dette kan være tegn på en overfølsomhetsreaksjon som involverer flere organer).

Dine lepper, øyne, munn, nese eller kjønnsorganer blør.

hver forandring i huden din, for eksempel: sår i munnen, halsen, nesen, kjønnsorganene og betennelse i øyets slimhinne som klør, renner eller er røde (konjunktivitt), blemmer eller avskalling over hele kroppen.

Svært sjelden (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere)

alvorlig allergisk reaksjon som kan forårsake hevelse i ansiktet eller halsen

alvorlig, mulig livstruende allergisk reaksjon.

Disse symptomene kan bety at du er allergisk mot denne medisinen. Ikke ta flere tabletter med mindre legen din har fortalt deg å gjøre det.

Andre bivirkninger

Vanlig (forekommer hos færre enn 1 av 10 brukere):

hudutslett

økt mengde thyreoideastimulerende hormon (hormonet som sørger for at skjoldbruskkjertelen produserer skjoldbruskkjertelhormoner) i blodet.

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

kvalme eller oppkast (brekninger);

unormale leververdier

diaré

Sjeldent (forekommer hos færre enn 1 av 1.000 brukere)

leverproblemer, slik som leverbetennelse.

Svært sjelden (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere)

feber

blod i urinen (hematuri)

høye kolesterolverdier i blodet ditt (hyperlipidemi)

du føler deg generelt uvel eller svak

svakhet, nummenhet, ustøhet, du kan ikke bevege musklene dine

(lammelse) eller bevissthetstap

hodepine, svimmelhet, døsighet eller synsproblemer

smerte i brystet (angina), høyt blodtrykk eller langsom hjerterytme

din kroppen holder på væske, noe som fører til hevelse (ødem), spesielt i anklene

diabetes (diabetes). Legen din vil ønske å måle mengden sukker i blodet ditt for å fastslå om dette er tilfelle.

noen ganger kan denne medisinen påvirke blodet ditt, noe som kan føre til at du lettere får blåmerker enn ellers, eller at du får sår hals eller andre tegn på en infeksjon. Disse symptomene forekommer vanligvis hos personer med lever- eller nyreproblemer. Kontakt så raskt som mulig med legen din. Denne

medisinen kan påvirke lymfeknutene dine infertilitet

infertilitet ved menn, erektil dysfunksjon

forstørrelse av brystene, hos menn og hos kvinner

endringer i din avføring
mat og drikke smaker annerledes enn normalt
linsen blir uklar (grå stær)
hårtap eller hårfargeendring
nedstemthet (depresjon)
problemer med å regulere muskelbevegelser (ataksi)
oppfatning av kriblinger, kløe eller prikking uten noen åpenbar årsak (parestesi)

Nukjent (kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data)

Aseptisk meningitt (betennelse i hjerne- eller ryggmargshinne): symptomer inkluderer Andre stiv nakke, hodepine, kvalme, feber eller nedsatt bevissthet. Søk umiddelbart medisinsk hjelp hvis disse symptomene oppstår ..

Lichenoide hudutslett (kløende rød-lilla hudutslett og/eller trådaktige hvit-grå striper på slimhinne)

Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt legen eller apoteket ditt. Dette gjelder også for bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger via det norske Bivirkningssenteret Lareb, nettside: www.lareb.nl. Ved å rapportere bivirkninger hjelper du oss med å få mer informasjon om sikkerheten til denne medisinen.

5. Hvordan oppbevarer du denne medisinen?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke denne medisinen etter utløpsdatoen. Den finner du på esken og blisterpakningen etter EXP. Der står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen.

Oppbevares under 30 oC.

Skyll ikke medisiner ned i vasken eller toalettet, og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din Apoteker hva du skal gjøre med medisiner du ikke lenger bruker. Hvis du avhender medisiner på riktig måte, blir de destruert på en ansvarlig måte og havner ikke i miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hvilke stoffer inneholder denne medisinen?

Det aktive stoffet i denne medisinen er allopurinol.

Allopurinol Accord 100 mg tabletter: Hver tablett inneholder 100 mg allopurinol.

Allopurinol Accord 300 mg tabletter: Hver tablett inneholder 300 mg allopurinol.

De andre stoffene i denne medisinen er:

Laktosemonohydrat, crosopovidon type B, maisstivelse, povidon K30 og magnesiumstearat

Hvordan ser Allopurinol Accord utseende og hva inneholder en pakke?

Allopurinol Accord 100 mg tabletter er hvite til off-white, runde, bikonvekse tabletter uten filmdrasjering med en diameter på omtrent 8,0 mm, med pregingen 'AW' på den ene siden og ingen preging på den andre siden.

Allopurinol Accord 300 mg tabletter er hvite til off-white, runde, bikonvekse tabletter uten filmdrasjering med skrå kanter, med en diameter på omtrent 11,2 mm og med pregingen 'AX' på den ene siden og ingen preging på den andre siden.

PVC-Alu blisterpakning med 25, 28, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle de nevnte pakningsstørrelsene markedsføres.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nederland

Produsent
LABORATORI FUNDACIÓ DAU
C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,
Barcelona 08040, Spania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50, Pabianice
95-200, Polen

Accord Healthcare Single Member S.A.
64th Km National Road Athens,
Lamia, 32009,
Hellas

Registrert i registeret under
Allopurinol Accord 100 mg tabletter RVG 121996
Allopurinol Accord 300 mg tabletter RVG 121997

Dette legemidlet er registrert i medlemslandene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde under de følgende navnene:

Navn på medlemsland: Navn på legemidlet
Østerrike: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Danmark: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Estland: Allopurinol Accord
Finland: Allopurinol Accord
Tyskland
: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg Tabletter
Litauen
Litauen : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Latvia: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Nederland: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Sverige: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Irland: Allopurinol 100 mg, 300 mg tablett

Tsjekkia: Allospes

Polen: Allospes

Kypros: Allopurinol Accord 100 mg tablett

Italia: Allopurinolo Accord

Spania : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent i januar 2025.

Transtoyou