

Prospect: informații pentru utilizator
Allopurinol Accord 100 mg comprimate
Allopurinol Accord 300 mg comprimate
Allopurinol

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante informații pentru dumneavoastră. Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.

- Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect?
- Aveți vreuna dintre reacțiile adverse menționate la rubrica 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? medicul dumneavoastră sau farmacist.

Conținut van acest prospect

1. Ce este Allopurinol Accord și pentru ce se utilizează acest medicament?
 2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
 3. Cum se utilizează acest medicament?
 4. Posibile efecte secundare
 5. Cum se păstrează acest medicament?
 6. Conținutul ambalajului și alte informații
1. Ce este Allopurinol Accord și pentru ce se utilizează acest medicament?

Allopurinol Accord conține substanța activă allopurinol. Allopurinolul aparține unui grup de medicamente numite inhibitori enzimatici. Aceste medicamente ajută la controlul vitezei cu care apar anumite modificări chimice în organism.

Acest medicament este utilizat în afecțiuni în care organismul produce prea mult acid uric, cum ar fi: guta (inflamație dureroasă cauzată de cristalizarea acidului uric într-o articulație), anumite boli de rinichi sau pietre la rinichi; cancer și unele boli metabolice, care duc la acumularea excesivă de acid uric.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

• Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6 a acestui prospect. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament utilizați.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament:

- dacă aveți o boală de ficat sau rinichi sau dacă ați avut aceasta în trecut
- dacă utilizați medicamente (diuretice și/sau un inhibitor ACE) pentru afecțiuni cardiace sau hipertensiune arterială
- dacă aveți un atac brusc de gută (inflamație dureroasă cauzată de cristalizarea acidului uric într-o articulație)
- dacă sunteți de origine chineză Han, thailandeză sau coreeană.
- dacă dumneavoastră probleme cu tiroida aveți

Fiți deosebit de precaut cu acest medicament

Dacă aveți pietre la rinichi. Pietrele la rinichi se vor micșora și există o mică șansă ca ele să intre în uretere și să le blocheze

În timpul utilizării allopurinolului au fost raportate erupții cutanate. Aceste erupții cutanate sunt adesea însoțite de ulceratii în gură, gât, nas și organele genitale și de conjunctivită (ochi roșii și umflați). Aceste forme severe de erupții cutanate sunt adesea precedate de simptome asemănătoare gripei, cum ar fi febră, dureri de cap, dureri în corp. Erupția cutanată poate se agrava până la formarea de vezicule extinse și desprinderea pielii. Aceste reacții cutanate severe pot apărea mai frecvent la persoanele de origine chineză Han, thailandeză sau coreeană. Boala cronică de rinichi poate crește și mai mult riscul la acești pacienți. Dacă dezvoltăți erupții cutanate sau aceste reacții cutanate, opriți utilizarea allopurinolului și contactați imediat medicul dumneavoastră.

Dacă aveți cancer sau Lesch-Nyhan sindromul (o boală metabolică), cantitatea de cantitate pentru a dilua urina. beați pentru a dilua urina dumneavoastră.

Copii și adolescenți până la 18 ani

Utilizarea acestui medicament la copii este foarte rară, cu excepția anumitor forme de cancer (în special leucemie) și a unor boli metabolice precum sindromul Lesch-Nyhan.

Utilizați alte medicamente?

Utilizați, pe lângă Allopurinol Accord alte medicamente, ați făcut-o recent sau intenționați să o faceți în curând? Informați despre aceasta atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul.

medicamente care suprimă apărarea naturală (imunosupresoare), de ex. 6-mercaptopurină, azatioprină și ciclosporină
adenină arabinozid (vidarabină), utilizat pentru tratamentul herpesului sau varicelei
alte medicamente pentru tratamentul gutei, cum ar fi probenecidul
aspirină (sau medicamente similare, numite salicilați)
clorpropamidă, utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat
medicamente care subțiază sângele (anticoagulante), cum ar fi warfarina
medicamente utilizate pentru tratamentul unei crize (incontrolabile șocuri ale corpului, adesea ca parte a unei crize epileptice), fenitoină
teofilină, utilizat pentru probleme respiratorii
medicamente împotriva anumitor infecții bacteriene (antibiotice) (ampicilină sau amoxicilină)
medicamente care sunt utilizate pentru tratamentul cancerului

didanozină, utilizat pentru tratamentul bolii infecțioase HIV (Virusul imunodeficienței uman)

medicamente pentru probleme cardiace sau hipertensiune arterială, cum ar fi inhibitorii ECA (un anumit grup de medicamente antihipertensive) sau comprimate diuretice Hidroxid de aluminiu (utilizat pentru a neutraliza acidul din stomac), deoarece acesta poate reduce efectul alopurinolului. Între administrarea acestor medicamente trebuie să existe un interval de cel puțin 3 ore.

La administrarea de Allopurinol Accord și citostatice (de exemplu, ciclofosamidă, doxorubicină, bleomicină, procarbazină, halogenuri de alchil), apar discrasii sanguine (o afecțiune a sângelui) mai frecvent decât atunci când aceste substanțe active sunt administrate singure. De aceea trebuie regulat să fie sângele examinat ..

Când 6-mercaptopurină sau azatioprină sunt administrate simultan cu [allopurinol 5 denumirea produsului], doza de 6-mercaptopurină sau azatioprină trebuie redusă deoarece aceste substanțe rămân mai mult timp trebuie redusă doza de 6-mercaptopurină sau azatioprină deoarece aceste substanțe rămân mai mult timp lucra. Acest lucru ar putea crește riscul de probleme grave cu sângele dumneavoastră. Într-o astfel de situație va 3 medicul dumneavoastră vă va monitoriza atent sângele în timpul tratamentului. Solicitați imediat ajutor medical dacă observați că aveți o vânătăie inexplicabilă, sângerare, febră sau o durere în gât heți

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

Allopurinolul ajunge în laptele matern la om. Acest medicament nu este recomandat în timpul alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Acest medicament poate provoca somnolență sau poate afecta controlul mișcărilor la unele persoane. Nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje până nu știți ce efect are acest medicament asupra dumneavoastră.

Allopurinol Accord conține lactoză

Acest medicament conține lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Atunci contactați medicul dumneavoastră.

Cantitatea de acest medicament pe care oamenii trebuie să o ia poate fi foarte diferită. Medicul dumneavoastră va decide ce doză de acest medicament este potrivită pentru dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră începe de obicei cu o doză mică de allopurinol (de exemplu, 100 mg/zi) pentru a reduce riscul de efecte secundare. Doza dumneavoastră va fi crescută dacă este necesar.

Doza inițială obișnuită este de 100 până la 300 mg pe zi, care poate fi luată ca o singură doză după masă. Doza poate fi crescută până la 900 mg pe zi, în funcție de cât de gravă este afecțiunea dumneavoastră. afecțiunea dumneavoastră este.

doză în cantități mai mici, distribuite pe parcursul zilei, pentru a reduce riscul de efecte secundare în tractul gastro-intestinal. a reduce tractul dumneavoastră gastro-intestinal.

Utilizare la copii și adolescenți până la 18 ani Copii și adolescenți până la 15 ani: 10-20 mg/kg greutate corporală/zi până la un maxim de 400 mg pe zi, împărțit în 3 administrări. Acest medicament este rar utilizat la copii, cu trebuie să luați.

Utilizare la copii și adolescenți până la 18 ani

Copii și adolescenți până la 15 ani 10-20 mg/kg greutate corporală/zi până la un maxim de 400 mg pe zi administrat de 3 ori pe zi. Acest medicament este rar utilizat la copii, cu excepția anumitor tipuri de afecțiuni maligne (în special leucemie) și anumite boli metabolice, de exemplu Lesch-Nyhan-sindrom.

Mod de administrare

Acest medicament trebuie administrat pe cale orală.

Luați comprimatele cu un pahar de apă, astfel le puteți înghiți mai ușor.

Luați comprimatele după masă pentru a reduce riscul de efecte secundare precum greața și vărsăturile.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Dacă luați prea multe comprimate sau dacă altcineva ia din greșeală medicamentul dumneavoastră, spuneți imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital. Luați ambalajul medicamentului cu dumneavoastră. Semnele unei supradoze pot include: greață, vărsături, diaree și amețeli.

Ați uitat să luați acest medicament?

Dacă ați uitat să luați medicamentul, luați-l imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, trebuie să săriți peste doza uitată. Nu luați o doză dublă pentru a recupera o doză uitată.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Nu opriți utilizarea acestui medicament decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să faceți acest lucru.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea efecte secundare. Nu toată lumea le experimentează.

Hipersensibilitate

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome:

orice schimbare a pielii, cum ar fi piele descuamată, ulcerații sau buze și gură dureroase sau în cazuri foarte rare respirație șuierătoare bruscă, bătăi rapide ale inimii sau presiune pe piept, colaps brusc ('prăbușire')

Rareori (apar la mai puțin de 1 din 1000 de utilizatori)

febră și frisoane, dureri de cap, dureri musculare (simptome asemănătoare gripei) și vă simțiți în general nu se simte bine

severe reacții de hipersensibilitate cu febră, erupții cutanate, dureri articulare, anomalii în sânge și în teste care investighează funcționarea ficatului (acestea pot fi semne ale unei reacții de hipersensibilitate care implică mai multe organe).

Buzele, ochii, gura, nasul sau organele genitale sângerează.

orice schimbare a pielii dumneavoastră, de exemplu: ulcere în gură, gât, nas, organe genitale și inflamația conjunctivei care provoacă mâncărime, lăcrimare sau roșeață (conjunctivită), bășici sau descumare pe tot corpul.

Foarte rar (apar la mai puțin de 1 din 10.000 de utilizatori)

severe reacție alergică care poate provoca umflarea feței sau a gâtului

severe, reacție alergică posibil amenințătoare de viață.

Aceste simptome pot însemna că sunteți alergic la acest medicament. Nu mai luați comprimate decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus să faceți acest lucru.

Alte reacții adverse

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori):

erupție cutanată

creșcută cantitate hormon stimulator tiroidian hormon (hormonul care asigură că tiroida produce hormoni tiroidieni) în sânge.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

greață sau vărsături (vomă);

valori hepatice anormale diaree

diaree

probleme hepatice

probleme hepatice, cum hepatită.

Foarte rar (apare la mai puțin de 1 din 10.000 de utilizatori)

febră

sânge în urină (hematurie)

ridicat valori ale colesterolului în sângele dumneavoastră (hiperlipidemie)

vă simțiți în general rău sau slăbit

slăbiciune, amorțeală, instabilitate la mers, nu vă puteți mișca mușchii

(paralizie) sau pierderea cunoștinței
durere de cap, amețeli, somnolență sau probleme de vedere
durere în piept (angină), hipertensiune arterială sau ritm cardiac încetinit
dumneavoastră corpul reține lichide, ceea ce duce la umflături (edem), în special la glezne
diabet (diabet). Medicul dumneavoastră va dori să măsoare cantitatea de zahăr din sângele
dumneavoastră pentru a determina dacă acesta este cazul.
uneori acest medicament poate afecta sângele dumneavoastră, ceea ce poate duce la
aparitia mai rapidă a vânătăilor decât de obicei, sau la dureri în gât sau alte semne de
infecție. Aceste simptome apar de obicei la persoanele cu probleme hepatice sau renale.
Contactați cât mai curând posibil medicul dumneavoastră.
acest medicament poate afecta ganglionii limfatici
infertilitate la bărbați, disfuncții erectile
mărirea sânilor, la bărbați și la femei
schimbări în scaunul dumneavoastră
mâncarea și băutura au un gust diferit de cel normal
opacifierea cristalinului (cataractă)
căderea părului sau decolorarea părului
tristețe (depresie)
probleme cu reglarea mișcărilor musculare (ataxie)
percepție de furnicături, mâncărime sau senzații de înțepături fără o cauză evidentă
(parestezie)

Necunoscut (nu poate fi determinat pe baza datelor disponibile)

Meningită aseptică (inflamația meningelui cerebral sau spinal): simptomele includ Alte gât
înțepenit, durere de cap, greață, febră sau conștiență redusă. Solicitați imediat asistență
medicală dacă aceste simptome apar ..

Lichenoid erupție cutanată (erupție cutanată roșu-violacee și/sau linii alb-gri pe mucoase)

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru
reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Puteți raporta reacțiile adverse și
prin intermediul Centrului Național de Farmacovigilență Lareb, website: www.lareb.nl. Raportând
reacțiile adverse, ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui
medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe cutie și pe
ambalajul blister după EXP. Este indicată o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de
expirare.

A se păstra la temperaturi sub 30 oC.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați-vă Farmacist ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corect, ele sunt distruse într-un mod responsabil și nu ajung în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este allopurinol.

Allopurinol Accord 100 mg comprimate: Fiecare comprimat conține 100 mg allopurinol.

Allopurinol Accord 300 mg comprimate: Fiecare comprimat conține 300 mg allopurinol.

Celelalte substanțe din acest medicament sunt:

Lactoză monohidrat, crospovidonă tip B, amidon de porumb, povidonă K30 și stearat de magneziu

Cum arată Allopurinol Accord și ce conține un ambalaj?

Allopurinol Accord comprimate de 100 mg sunt albe până la alb-cenușii, rotunde, biconvexe comprimate neacoperite cu film, cu un diametru de aproximativ 8,0 mm, cu inscripția 'AW' pe o parte și fără inscripție pe cealaltă parte.

Allopurinol Accord comprimate de 300 mg sunt albe până la alb-cenușii, rotunde, biconvexe comprimate neacoperite cu film, cu margini teșite, cu un diametru de aproximativ 11,2 mm și cu inscripția 'AX' pe o parte și fără inscripție pe cealaltă parte.

Blister PVC-Alu cu 25, 28, 30, 50, 60, 90 și 100 comprimate.

Nu toate mărimile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Țările de Jos

Producător

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

Barcelona 08040, Spania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomińska 50, Pabianice

95-200, Polonia

Accord Healthcare Single Member S.A.

64th Km National Road Athens,

Lamia, 32009,
Grecia

Înregistrat în registru sub
Allopurinol Accord 100 mg comprimate RVG 121996
Allopurinol Accord 300 mg comprimate RVG 121997

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri:

Numele statului membru: Numele medicamentului
Austria: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Danemarca: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Estonia: Allopurinol Accord
Finlanda: Allopurinol Accord
Germania
: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg Comprimate
Lituania
Lituania : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Letonia: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Olanda: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Suedia: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate
Irlanda: Allopurinol 100 mg, 300 mg comprimat
Cehia: Allospes
Polonia: Allospes
Cipru: Allopurinol Accord 100 mg tabletă
Italia: Allopurinol Accord
Spania : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimate

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în ianuarie 2025.