

Bipacksedel: information till användaren
Allopurinol Accord 100 mg tabletter
Allopurinol Accord 300 mg tabletter
Allopurinol

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom det finns viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta din läkare eller apotekspersonal.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är förskrivet endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Allopurinol Accord och vad används detta läkemedel för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Allopurinol Accord och vad används detta läkemedel för?

Allopurinol Accord innehåller den aktiva substansen allopurinol. Allopurinol tillhör en grupp av läkemedel som kallas enzymhämmare. Dessa läkemedel hjälper till att kontrollera hastigheten med vilken vissa kemiska förändringar sker i kroppen.

Detta läkemedel används vid tillstånd där kroppen producerar för mycket urinsyra, såsom: gikt (smärtsam inflammation på grund av kristalliserad urinsyra i en led), vissa njursjukdomar eller njurstenar; cancer och vissa ämnesomsättningssjukdomar, som leder till en ansamling av för mycket urinsyra.

2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta läkemedel?

• Du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel. Dessa ingredienser finns i avsnitt 6 i denna bipacksedel. Om du är osäker, prata med din läkare innan du använder detta läkemedel använder.

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel:

- om du har en lever- eller njursjukdom eller om du har haft det tidigare

- om du använder läkemedel (diuretika (vätskedrivande medel) och/eller en ACE-hämmare) för hjärtsjukdomar eller högt blodtryck
- om du har ett plötsligt anfall av gikt (smärtsam inflammation på grund av kristalliserad urinsyra i en led)
- om du är av Han-kinesisk, thailändsk eller koreansk härkomst.
- om du sköldkörtelproblem har

Var extra försiktig med denna medicin

Om du har njursten. Njurstenarna kommer att bli mindre och det finns en liten chans att de tränger in i dina urinledare och blockerar dem

Vid användning av allopurinol har hudutslag rapporterats. Dessa hudutslag åtföljs ofta av sår i munnen, halsen, näsan och könsorganen samt med konjunktivit (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga former av hudutslag föregås ofta av influensaliknande symtom, såsom feber, huvudvärk, kroppssmärter. Hudutslaget kan förvärras till utbredd blåsbildning och avlossning av huden. Dessa allvarliga hudreaktioner kan oftare förekomma hos personer av Han-kinesisk, thailändsk eller koreansk härkomst. Kronisk njursjukdom kan öka risken hos dessa patienter ännu mer. Om du utvecklar hudutslag eller dessa hudreaktioner, sluta använda allopurinol och kontakta omedelbart din läkare.

Om du har cancer eller Lesch-Nyhan syndrom (en ämnesomsättningssjukdom), kan mängden mängd för att späda ut din urin. dricka för att späda ut din urin.

Barn och ungdomar upp till 18 år

Användningen av detta läkemedel hos barn är mycket sällsynt, förutom vid vissa former av cancer (särskilt leukemi) och vissa ämnesomsättningssjukdomar som Lesch-Nyhan syndromet.

Använder du andra läkemedel?

Använder du förutom Allopurinol Accord andra läkemedel, har du gjort det nyligen eller planerar du att göra det snart? Berätta det då din läkare eller apotekare.

läkemedel som hämmar det naturliga försvaret (immunosuppressiva), t.ex. 6-merkaptopurin, azatioprin och ciklosporin
adenin arabinose (vidarabin), används för behandling av herpes eller vattkoppor
andra läkemedel för behandling av gikt, såsom probenecid
aspirin (eller liknande läkemedel, kallade salicylater)
klorpropamid, används för behandling av diabetes
läkemedel som tunnar ut blodet (antikoagulantia), såsom warfarin
läkemedel som används för behandling av ett anfall (okontrollerbar kroppskramper, ofta som en del av ett epileptiskt anfall), fenytoin
teofyllin, används för andningsproblem
läkemedel mot vissa infektioner med bakterier (antibiotika) (ampicillin eller amoxicillin)
läkemedel som används för behandling av cancer
didanosin, används för behandling av infektionssjukdomen HIV (Humant immunbrist virus)
läkemedel för hjärtproblem eller högt blodtryck, såsom ACE-hämmare (viss grupp blodtryckssänkande läkemedel) eller vätskedrivande tabletter (diuretika)

Aluminiumhydroxid (används för att neutralisera magsyra), eftersom detta kan minska effekten av allopurinol. Mellan administreringen av dessa läkemedel bör det vara ett intervall på minst 3 timmar.

Vid administrering av Allopurinol Accord och cytostatika (t.ex. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, procarbazin, alkylhalogenider), uppträder blodsjukdomar (en blodsjukdom) oftare än när dessa aktiva substanser ges ensamma. Därför måste regelbundet blodet undersökas . bli.

måste dosen av 6-merkaptopurin eller azatioprin sänkas eftersom dessa substanser då stannar längre När 6-merkaptopurin eller azatioprin samtidigt med [allopurine 5 produktnamn] ges, måste dosen av 6-merkaptopurin eller azatioprin sänkas eftersom dessa ämnen då stannar längre arbeta. Det kan öka risken för allvarliga problem med ditt blod. I en sådan situation kommer 3 din läkare att noggrant övervaka ditt blod under behandlingen. Sök omedelbart medicinsk hjälp om du märker att du har oförklarliga blåmärken, blödningar, feber eller ont i halsen her

Graviditet, amning och fertilitet

Är du gravid, tror du att du är gravid, planerar du att bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Allopurinol passerar över i bröstmjolk hos människor. Detta läkemedel rekommenderas inte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra vissa människor dåsiga eller ge mindre kontroll över sina rörelser. Du bör inte köra bil eller använda maskiner innan du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Allopurinol Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en sorts socker). Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta då din läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd alltid denna medicin exakt som din läkare har sagt till dig. Är du osäker på rätt användning? Kontakta då din läkare.

Mängden av denna medicin som människor behöver ta kan variera mycket. Din läkare kommer att besluta vilken dos av denna medicin som är lämplig för dig.

Din läkare börjar vanligtvis med en låg dos allopurinol (t.ex. 100 mg/dag) för att minska risken för möjliga biverkningar. Din dos kommer att ökas om det behövs.

Den vanliga startdosen är 100 till 300 mg per dag, som kan tas som en enda dos efter måltid. Dosen kan ökas till 900 mg per dag, beroende på hur allvarligt ditt tillstånd är. din sjukdom är.

dosen i mindre mängder, utspridda över dagen för att minska risken för biverkningar i din mag-tarmkanal. Om du är äldre eller om din lever eller njurar inte fungerar bra kan det hända att din läkare ordinerar en lägre

dos, eller att du måste vänta längre mellan två doser. Om du får dialys två eller tre gånger i veckan kan din läkare ordinera en dos på 300 eller 400 mg, som du ska ta direkt efter dialysen. Användning hos barn och ungdomar upp till 18 år måste ta.

dag fördelat på 3 administreringstillfällen. Denna medicin används sällan hos barn, med Barn och ungdomar upp till 15 år 10-20 mg/kg kroppsvikt/dag upp till ett maximum av 400 mg per dag fördelat över 3 administreringstillfällen. Detta läkemedel används sällan hos barn, med undantag för vissa typer av maligna sjukdomar (särskilt leukemi) och vissa ämnesomsättningssjukdomar, till exempel Lesch-Nyhan-syndrom.

Administreringsätt

Denna medicin ska tas oralt.

Ta tabletterna med ett glas vatten, så kan du svälja dem lättare.

Ta dina tabletter efter måltid för att minska risken för biverkningar som illamående och kräkningar.

Har du använt för mycket av denna medicin?

Om du tar för många tabletter eller om någon annan av misstag tar din medicin, berätta det omedelbart för din läkare eller gå till närmaste sjukhus. Ta med läkemedelsförpackningen. Tecken på en överdos kan bland annat vara: illamående, kräkningar, diarré och yrsel.

Har du glömt att ta denna medicin?

Om du har glömt att ta din medicin, ta den så snart du märker det. Om det dock nästan tid är för nästa dos, bör du hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar använda denna medicin

Sluta inte använda denna medicin om inte din läkare säger det.

Har du fler frågor om användningen av denna medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även denna medicin ha biverkningar. Alla drabbas inte av dem.

Överkänslighet

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

Kontakta omedelbart din läkare om du har något av följande symtom:

varje hudförändring, såsom fjällande hud, sår eller smärtsamma läppar och mun eller i mycket sällsynta fall plötslig väsande andning, bultande hjärtslag eller tryck över bröstet, plötslig kollaps ('kollaps')

Sällan (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk (influenسالiknande symtom) och du känner dig i allmänhet mår inte bra

allvarliga överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, ledvärk, blodavvikelser och i tester där leverns funktion undersöks (detta kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion där flera organ är inblandade).

Dina läppar, ögon, mun, näsa eller könsorgan blöder.

varje förändring i din hud, till exempel: sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen och inflammation i ögonslemhinnan som gör att de kliar, tåras eller är röda (konjunktivit), blåsor eller fjällning över hela kroppen.

Mycket sällan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

allvarlig allergisk reaktion som kan orsaka svullnad i ansiktet eller halsen

allvarlig, möjligen livshotande allergisk reaktion.

Dessa symtom kan betyda att du är allergisk mot denna medicin. Ta inte fler tabletter om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Andra biverkningar

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

hudutslag

förhöjd mängd tyreoidestimulerande hormon (hormonet som ser till att sköldkörteln producerar sköldkörtelhormoner) i blodet.

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

illamående eller kräkningar (vomera);

avvikande levervärden

diarré

Sällan (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

leverproblem, såsom leverinflammation.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

feber

blod i urinen (hematuri)

höga kolesterolvärden i ditt blod (hyperlipidemi)

du känner dig allmänt sjuk eller svag

svaghet, domningar, ostadig på fötterna, du kan inte röra dina muskler

(förlamning) eller medvetlöshet

huvudvärk, yrsel, dåsighet eller synproblem

smärta i bröstet (angina), högt blodtryck eller långsam hjärtfrekvens

din kropp behåller vätska, vilket leder till svullnad (ödem), särskilt i anklarna

diabetes (diabetes). Din läkare kommer att vilja mäta mängden socker i ditt blod för att fastställa om detta är fallet.

ibland kan denna medicin påverka ditt blod, vilket kan göra att du lättare får blåmärken än annars, eller att du får ont i halsen eller andra tecken på en infektion. Dessa symtom

förekommer oftast hos personer med lever- eller njurproblem. Kontakta snabbt som möjligt din läkare. denna

medicin kan påverka dina lymfkörtlar infertilitet

infertilitet vid män, erektil dysfunktion

förstoring av bröstet, hos män och hos kvinnor

förändringar i din avföring
mat och dryck smakar annorlunda än normalt
grumling av ögonlinsen (grå starr)
håravfall eller hårfärgförändring
nedstämdhet (depression)
problem med att reglera muskelrörelser (ataxi)
uppfattning av stickningar, klåda eller domningar utan uppenbar orsak (parestesi)

Nej känd (kan inte fastställas med tillgängliga data)

Aseptisk meningit (inflammation i hjärn- eller ryggmärgshinnorna): symtom inkluderar Andra stel nacke, huvudvärk, illamående, feber eller nedsatt medvetande. Sök omedelbart medicinsk hjälp om dessa symtom uppträder uppträda.

Lichenoid hudutslag (kliande röd-lila hudutslag och/eller trådliknande vit-grå streck på slemhinnor)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även för biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar via det svenska Biverkningscentrum Lareb, webbplats: www.lareb.nl. Genom att rapportera biverkningar hjälper du oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet. Det står på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Det anges en månad och ett år. Den sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Förvara under 30 oC.

Spola inte ner mediciner i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din Apotekare vad du ska göra med mediciner som du inte längre använder. Om du avyttrar mediciner på rätt sätt förstörs de på ett ansvarsfullt sätt och hamnar inte i miljön.

6. Innehåll i förpackningen och övrig information

Vilka ämnen finns i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är allopurinol.

Allopurinol Accord 100 mg tabletter: Varje tablett innehåller 100 mg allopurinol.

Allopurinol Accord 300 mg tabletter: Varje tablett innehåller 300 mg allopurinol.

De andra ämnena i denna medicin är:

Laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium typ B, majsstärkelse, povidon K30 och magnesiumstearat

Hur ser Allopurinol Accord hur ser det ut och vad finns i en förpackning?

Allopurinol Accord 100 mg tabletter är vita till brutna vita, runda, bikonvexa tabletter utan filmbeläggning med en diameter på cirka 8,0 mm, med märkningen 'AW' på ena sidan och ingen märkning på den andra sidan.

Allopurinol Accord 300 mg tabletter är vita till brutna vita, runda, bikonvexa tabletter utan filmbeläggning med avfasade kanter, med en diameter på cirka 11,2 mm och med märkningen 'AX' på ena sidan och ingen märkning på den andra sidan.

PVC-Alu blisterförpackning med 25, 28, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

Inte alla nämnda förpackningsstorlekar marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

Barcelona 08040, Spanien

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50, Pabianice

95-200, Polen

Accord Healthcare Single Member S.A.

64th Km National Road Athens,

Lamia, 32009,

Grekland

Registrerad i registret under

Allopurinol Accord 100 mg tabletter RVG 121996

Allopurinol Accord 300 mg tabletter RVG 121997

Detta läkemedel är registrerat i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

Namn på medlemsstaten: Namn på läkemedlet

Österrike: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Danmark: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Estland: Allopurinol Accord Finland: Allopurinol Accord

Tyskland

: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg Tabletter Litauen

Litauen : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Lettland: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Nederländerna: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Sverige: Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter
Irland: Allopurinol 100 mg, 300 mg tablett
Tjeckien: Allospes
Polen: Allospes
Cypern: Allopurinol Accord 100 mg tablett
Italien: Allopurinol Accord
Spanien : Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Denna bipacksedel godkändes senast i januari 2025.

Transtoyou