

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Amoksitsilliin Centrient 1000 mg tabletid
Amoksitsilliin

Lugege kogu seda infolehte hoolikalt enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad kui teil.

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on Amoksitsilliin <nimi> ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Amoksitsilliin <nimi> võtmist
3. Kuidas Amoksitsilliin <nimi> võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Amoksitsilliin <nimi> säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Amoksitsilliin <nimi> ja milleks seda kasutatakse

Mis on Amoksitsilliin <nimi>

Amoksitsilliin <nimi> on antibiootikum. Toimeaine on amoksitsilliin. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 'penitsilliinideks'.

Milleks Amoksitsilliin <nimi> kasutatakse

Amoksitsilliin <nimi> kasutatakse bakterite põhjustatud infektsioonide raviks keha erinevates osades. Amoksitsilliin <nimi> võib kasutada ka koos teiste ravimitega maohaavandite raviks.

2. Mida on vaja teada enne Amoksitsilliin <nimi> võtmist

Ärge võtke Amoksitsilliin <nimi>:

kui olete allergiline amoksitsilliini, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon mõnele antibiootikumile. See võib hõlmata nahalöövet või näo või kurgu turset.

Ärge võtke Amoksitsilliin <nimi>, kui mõni ülaltoodust kehtib. Kui te pole kindel, rääkige enne Amoksitsilliin <nimi> võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Amoksitsilliin <nimi> võtmist oma arsti või apteekriga, kui teil on:

näärmepalavik (palavik, kurguvalu, paistes näärmed ja äärmine väsimus)

neeruprobleemid

kui te ei urineeri regulaarselt.

Kui te pole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne Amoksitsilliin <nimi> võtmist oma arsti või apteekriga.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui teil on:

Uriinianalüüsid (glükoos) või maksafunktsiooni vereanalüüsid
Östriool testid (kasutatakse raseduse ajal, et kontrollida, kas laps areneb normaalselt)
Teavitage oma arsti või apteekrit, et te võtate Amoksitsilliin <name>. See on oluline, kuna Amoksitsilliin <name> võib mõjutada nende testide tulemusi.

Teised ravimid ja Amoksitsilliin <name>

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või võite võtta mingeid muid ravimeid.

Kui te võtate allopurinooli (kasutatakse podagra raviks) koos Amoksitsilliin <name>-ga, on tõenäolisem, et teil tekib allergiline nahareaktsioon.

Kui te võtate probenetsiidi (kasutatakse podagra raviks), võib teie arst otsustada kohandada teie Amoksitsilliin <name> annust.

Kui te võtate ravimeid, mis aitavad vältida verehüüvete teket (näiteks varfariin), võib teil olla vaja täiendavaid vereanalüüse.

Kui te võtate teisi antibiootikume (näiteks tetratsükliin), võib Amoksitsilliin <name> olla vähem efektiivne.

Kui te võtate metotreksaati (kasutatakse vähi ja raske psoriaasi raviks), võib Amoksitsilliin <name> põhjustada kõrvaltoimete suurenemist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, arvate, et võite olla rase või plaanite last saada, küsige enne selle ravimi võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amoksitsilliin <name> võib põhjustada kõrvaltoimeid ja sümptomeid (nagu allergilised reaktsioonid, pearinglus ja krambid) võivad muuta teid autojuhtimiseks kõlbmatuks.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne end hästi.

Amoksitsilliin <name> sisaldab aspartaami

See ravim sisaldab 20 mg aspartaami igas tablettis, mis vastab 20 mg/1000 mg.

Aspartaam (E951) on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria (PKU), haruldane geneetiline häire, mille puhul fenüülalaniin koguneb, kuna keha ei suuda seda korralikult eemaldada.

Amoksitsilliin <name> sisaldab maltodekstriini

Maltodekstriin imendub glükoosina. Kui arst on teile öelnud, et teil on talumatus mõne suhkru suhtes, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3. Kuidas võtta Amoksitsilliin <nimi>

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablette saab kasutada kahel viisil. Võtke otse koos veega või lahustage esmalt vees, seejärel jooge.

Tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Jagage annused päeva jooksul ühtlaselt, vähemalt 4-tunniste vahedega.

Tavaline annus on:

Lapsed, kes kaaluvad alla 40 kg

Kõik annused arvutatakse sõltuvalt lapse kehakaalust kilogrammides.

Teie arst annab teile nõu, kui palju Amoksiitsilliin <nimi> peaksite oma beebile või lapsele andma.

Tavaline annus on 40 mg kuni 90 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta päevas, jagatuna kaheks või kolmeks annuseks.

Maksimaalne annus on 100 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta päevas.

Täiskasvanud, eakad patsiendid ja lapsed, kes kaaluvad 40 kg või rohkem

Tavaline amoksiitsilliini annus on 250 mg kuni 500 mg kolm korda päevas või 750 mg kuni 1 g iga 12 tunni järel, sõltuvalt infektsiooni raskusastmest ja tüübist.

Masked infektsioonid: 750 mg kuni 1 g kolm korda päevas.

Kuseteede infektsioon: 3 g kaks korda päevas ühe päeva jooksul.

Lyme'i tõbi (puukide levitatav infektsioon): Isoleeritud erüteem migrans (varajane staadium – punane või roosa ümmargune lööve): 4 g päevas, Süsteemsed ilmingud (hiline staadium – tõsisemate sümptomite korral või kui haigus levib kehas): kuni 6 g päevas.

Maohaavandid: üks 750 mg või üks 1 g annus kaks korda päevas 7 päeva jooksul koos teiste antibiootikumide ja ravimitega maohaavandite raviks.

Südameinfektsiooni ennetamiseks operatsiooni ajal: annus varieerub sõltuvalt operatsiooni tüübist. Samal ajal võib anda ka teisi ravimeid. Teie arst, apteeker või õde võib teile anda rohkem teavet.

Maksimaalne soovitatav annus on 6 g päevas.

Neeruprobleemid

Kui teil on neeruprobleeme, võib annus olla tavalisest väiksem.

Kui te võtate rohkem Amoxicillin <name> kui peaksite

Kui olete võtnud liiga palju Amoxicillin <name>, võivad sümptomiteks olla seedehäired (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või kristallid uriinis, mis võivad ilmuda hädase uriinina või urineerimisprobleemidena. Rääkige oma arstiga nii kiiresti kui võimalik. Võtke ravim kaasa, et arstile näidata.

Kui unustate Amoxicillin <name> võtta

Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui meelde tuleb.

Ärge võtke järgmist annust liiga vara, oodake umbes 4 tundi enne järgmise annuse võtmist.

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui kaua peaksite Amoxicillin <name> võtma?

Jätkake Amoxicillin <name> võtmist nii kaua, kui arst on teile öelnud, isegi kui tunnete end paremini. Iga annus on vajalik infektsiooni vastu võitlemiseks. Kui mõned bakterid ellu jäävad, võivad nad põhjustada infektsiooni tagasituleku.

Kui olete ravi lõpetanud ja tunnete end endiselt halvasti, peaksite arsti juurde tagasi minema.

Soor (pärmiiinfektsioon keha niisketes piirkondades, mis põhjustab valulikkust, sügelust ja valget eritist) võib tekkida, kui Amoxicillin <name> kasutatakse pikka aega. Kui see juhtub, rääkige oma arstiga.

Kui te võtate Amoxicillin <name> pikka aega, võib teie arst teha lisateste, et kontrollida, kas teie neerud, maks ja veri töötavad normaalselt.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt, apteekrilt või õelt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Amoksitsilliin <nimi> võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest – võite vajada kiiret arstiabi: Järgnevad on väga haruldased (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

allergilised reaktsioonid, mille tunnused võivad sisaldada: naha sügelus või lööve, näo, huulte, keele, keha turse või hingamisraskused. Need võivad olla tõsised ja aeg-ajalt on esinenud surmajuhtumeid

lööve või väikesed lamedad punased ümmargused laigud naha all või naha verevalumid. See on tingitud veresoonte seinte põletikust allergilise reaktsiooni tõttu. See võib olla seotud liigesevalu (artriit) ja neeruprobleemidega

hilinenud allergiline reaktsioon võib tekkida tavaliselt 7 kuni 12 päeva pärast

Amoksitsilliin <nimi> võtmist, mõned tunnused hõlmavad: lööve, palavik, liigesevalu ja lümfisõlmede suurenemine, eriti kaenlaaluste all

nahareaktsioon, mida tuntakse kui 'multiformne erüteem', kus võib tekkida: sügelev punakaslilla laigud nahal, eriti peopesadel või jalataldadel, 'nõgestõve' sarnased paistes alad nahal, valulikud alad suu, silmade ja suguelundite pinnal. Teil võib olla palavik ja tugev väsimus

muud rasked nahareaktsioonid võivad sisaldada: naha värvusemuutused, muhud naha all, villid, pustulid, koorumine, punetus, valu, sügelus, ketendus. Need võivad olla seotud palaviku, peavalude ja kehalaludega

gripilaadsed sümptomid koos lööbe, palaviku, paistes näärmete ja ebanormaalsete vereanalüüside tulemustega (sealhulgas valgete vereliblede (eosinofiilia) ja maksaensüümide suurenemine) (Ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)).

palavik, külmavärinad, kurguvalu või muud infektsiooni tunnused või kui teil tekivad kergesti verevalumid. Need võivad olla märgid probleemist teie vererakkudega the Jarisch-Herxheimeri reaktsioon, mis tekib Amoksitsilliin <name> ravi ajal Lyme'i tõve korral ja põhjustab palavikku, külmavärinaid, peavalu, lihasvalu ja nahalöövet jämesoole (käärsoole) põletik koos kõhulahtisus (mõnikord sisaldab verd), valu ja palavik

võivad tekkida tõsised maksakahjustused. Need on peamiselt seotud inimestega, kes saavad ravi pika aja jooksul, mehed ja eakad. Te peate oma arstile kiiresti teatama, kui teil tekib:

- o raske kõhulahtisus verejooksuga
- o villid, nahapunetus või verevalumid nahal
- o tumedam uriin või heledamad väljaheited
- o naha või silmavalgete kollasus (ikterus). Vaadake ka aneemia allpool, mis võib põhjustada ikterust.

Need võivad tekkida ravimi võtmise ajal või kuni mitu nädalat pärast seda.

Kui midagi ülaltoodust juhtub, lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge kohe arsti poole.

Mõnikord võivad teil tekkida vähem tõsised nahareaktsioonid, nagu:

kergelt sügelev lööve (ümmargused, roosakaspunased laigud), 'nõgestõve' sarnased tursunud alad käsivartel, jalgadel, peopesadel, kätel või jalgadel. See on harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st).

Kui teil esineb mõni järgmistest, need rääkima Muud võimalikud kõrvaltoimed on:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

nahalööve

iiveldus

kõhulahtisus

..

oksendamine. Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

oksendamine (iiveldus).

neeruprobleemid

krambid, mida on täheldatud patsientidel, kes saavad suuri annuseid või kellel on neeruprobleemid

pearinglus

hüperaktiivsus

pearinglus

hüperaktiivsus

kristallid uriinis, mis võivad ilmned häguse uriinina või urineerimisraskuste või -ebamugavustena. Veenduge, et joote rohkelt vedelikku, et vähendada nende sümptomite esinemise tõenäosust

hambad võivad tunduda plekilised, tavaliselt muutuvad normaalseks harjamisega (seda on teatatud lastel)

keel võib muutuda kollaseks, pruuniks või mustaks ning see võib tunduda karvane

punaste vereliblede liigne lagunemine, mis põhjustab teatud tüüpi aneemia. Tunnused

hõlmavad: väsimus, peavalud, hingeldus, pearinglus, kahvatu välimus ja naha ning

silmavalgete kollasus

madal valgete vereliblede arv

madal vere hüübimisega seotud rakkude arv

verel võib hüübimiseks kuluda kauem aega kui tavaliselt. Seda võite märgata, kui teil on ninaverejooks või lõikate end.

Sagedus teadmata

aju ümbritseva kaitsemembraani põletik (aseptiline meningiit)

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest otse teatada riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on loetletud lisas V. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas säilitada Amoksitsilliini <nimi>

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge hoidke üle 25°C. Hoidke originaalpakendis selleks, et kaitsta niiskuse eest.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril tähtede „EXP“ järel. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid ära kanalisatsiooni või olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoxicillin <nimi> sisaldab

Iga tableti toimeaine on 1000 mg amoksitsilliini.

Muud koostisosad on magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, aspartaam, maasika maitseaine. (Maasika maitseaine sisaldab: maisi maltodekstriini, triatsetüültsitraat (E1505), maitsekomponendid , propüleenglükool (E1520) ja bensüülalkohol).

Kuidas Amoxicillin <name> välja näeb ja pakendi sisu

Amoxicillin <name> 1000 mg tabletid

Tabletid on valged või valkjasvalged, 22,2 mm x 10 mm piklikud tabletid, millel on üks poolitusjoon mõlemal küljel.

Tabletid on pakitud PVC/PVDC/alumiinium või PVC/TE/PVDC/alumiinium blistritesse.Alumiinium.

Amoxicillin <name> 1000 mg tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 100 tabletti

Kõiki pakendi suurusi ei pruugita turustada.

Turustamisloa omanik ja tootja

Litsentsiomanik:

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1

2613 AX Delft Nederland

Tootja:

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13-14
13509 Berliin, Saksamaa

HAUPT Pharma Latina S.r.L.
Strada Statale 156 Monti Lepini Km. 47,600
04100 Borgo S. Michele (Latina), Itaalia

Registrisse kantud:

RVG: 126429

See ravimpreparaat on luba saanud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud mai 2024.

Muud teabeallikad

Üksikasjalik teave selle ravimi kohta on saadaval MA/Agentuuri.

Üldised nõuanded antibiootikumide kasutamise kohta

Antibiootikume kasutatakse bakterite põhjustatud infektsioonide raviks. Neil ei ole mõju viiruste põhjustatud infektsioonidele.

Mõnikord ei allu bakterite põhjustatud infektsioon antibiootikumikuurile. Üks levinumaid põhjuseid on see, et infektsiooni põhjustavad bakterid on võetud antibiootikumi suhtes resistentsed. See tähendab, et nad suudavad ellu jääda ja isegi paljuneda vaatamata antibiootikumile.

Bakterid võivad muutuda antibiootikumide suhtes resistentseks mitmel põhjusel. Antibiootikumide ettevaatlik kasutamine võib aidata vähendada bakterite resistentsuse tekkimise tõenäosust.

Kui teie arst määrab teile antibiootikumikuuri, on see mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Järgmiste nõuannete järgimine aitab vältida resistentsete bakterite teket, mis võivad takistada antibiootikumi toimet.

1. On väga oluline, et te võtaksite antibiootikumi õige annuse, õigel ajal ja õige arvu päevade jooksul. Lugege etiketi juhiseid ja kui te millestki aru ei saa, küsige oma arstilt või apteekrilt selgitust.
2. Te ei tohiks võtta antibiootikumi, kui see ei ole spetsiaalselt teile määratud, ja te peaksite seda kasutama ainult selle infektsiooni raviks, milleks see määrati.
3. Te ei tohiks võtta antibiootikume, mis on määratud teistele inimestele, isegi kui neil oli infektsioon, mis oli sarnane teie omaga.

4. Te ei tohiks anda antibiootikume, mis on teile määratud, teistele inimestele.
5. Kui teil jääb antibiootikumi üle pärast seda, kui olete kuuri vastavalt arsti juhistele lõpetanud, peaksite ülejäänud viima apteeki nõuetekohaseks hävitamiseks.

Transtoyou