

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Amoksisilliini Centrient 1000 mg tabletit
Amoksisilliini

Lue koko tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, koska se sisältää sinulle tärkeää tietoa.

Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän sairauden oireensa olisivat samat kuin sinulla.

Jos saat haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa. Katso kohta 4.

Mitä tämä seloste sisältää

1. Mitä Amoksisilliini <nimi> on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Amoksisilliini <nimi>
3. Miten Amoksisilliini <nimi> otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten Amoksisilliini <nimi> säilytetään
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Amoksisilliini <nimi> on ja mihin sitä käytetään

Mitä Amoksisilliini <nimi> on

Amoksisilliini <nimi> on antibiootti. Vaikuttava aine on amoksisilliini. Tämä kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan 'penisilliiniksi'.

Mihin Amoksisilliini <nimi> käytetään

Amoksisilliini <nimi> käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehon eri osissa. Amoksisilliini <nimi> voidaan myös käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa mahahaavojen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Amoksisilliini <nimi>

Älä ota Amoksisilliini <nimi>:

jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliinille tai jollekin tämän lääkkeen muista aineista (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on koskaan ollut allerginen reaktio mihinkään antibioottiin. Tämä voi sisältää ihottuman tai kasvojen tai kurkun turvotuksen.

Älä ota Amoksisilliini <nimi>, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoksisilliini <nimi>.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoksisilliini <nimi>, jos sinulla on:

rauhaskuume (kuume, kurkkukipu, turvonneet rauhaset ja äärimmäinen väsymys)
munuaisongelmia

et virtsaa säännöllisesti.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoksisilliini <nimi>.

Veri- ja virtsakokeet

Jos sinulle tehdään:

Virtsatestit (glukoosi) tai verikokeet maksan toiminnan arvioimiseksi

Oestrioli testit (käytetään raskauden aikana tarkistamaan, että vauva kehittyy normaalisti)

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, että käytät Amoksisilliini <nimi>. Tämä johtuu siitä, että Amoksisilliini <nimi> voi vaikuttaa näiden testien tuloksiin.

Muut lääkkeet ja Amoksisilliini <nimi>

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät allopurinolia (käytetään kihtiin) yhdessä Amoksisilliini <nimi> kanssa, on todennäköisempää, että saat allergisen ihoreaktion.

Jos käytät probenesidiä (käytetään kihtiin), lääkärisi saattaa päättää säätää Amoksisilliini <nimi> annostasi.

Jos käytät lääkkeitä, jotka auttavat estämään verihyytymiä (kuten varfariini), saatat tarvita lisäverikokeita.

Jos käytät muita antibiootteja (kuten tetrasykliiniä), Amoksisilliini <nimi> voi olla vähemmän tehokas.

Jos käytät metotreksaattia (käytetään syövän ja vaikean psoriaasin hoitoon), Amoksisilliini <nimi> voi lisätä sivuvaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäritäsi tai apteekkariltasi neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Amoksisilliini <nimi> voi aiheuttaa sivuvaikutuksia ja oireet (kuten allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) voivat tehdä sinut ajokelvottomaksi.

Älä aja tai käytä koneita, ellet tunne oloasi hyväksi.

Amoksisilliini <nimi> sisältää aspartaamia

Tämä lääke sisältää 20 mg aspartaamia jokaisessa tabletissa, mikä vastaa 20 mg/1000 mg.

Aspartaami (E951) on fenyylialaniinin lähde. Se voi olla haitallista, jos sinulla on fenyyliketoniauria (PKU), harvinainen geneettinen häiriö, jossa fenyylialaniinia kertyy, koska keho ei pysty poistamaan sitä kunnolla.

Amoksisilliini <nimi> sisältää maltodekstriiniä

Maltodekstriini imeytyy glukoosina. Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että sinulla on intoleranssi joillekin sokereille, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Kuinka ottaa Amoksisilliini <nimi>

Ota tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkärisi tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista lääkäriiltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletteja voidaan käyttää kahdella tavalla. Ota suoraan veden kanssa tai liuota ensin veteen ja juo sitten.

Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jaa annokset tasaisesti päivän aikana, vähintään 4 tunnin välein.

Tavallinen annos on:

Alle 40 kg painavat lapset

Kaikki annokset lasketaan lapsen painon mukaan kilogrammoina.

Lääkärisi neuvoo, kuinka paljon Amoksisilliini <nimi> -lääkettä sinun tulisi antaa vauvallesi tai lapsellesi.

Tavallinen annos on 40 mg - 90 mg kutakin painokiloa kohden päivässä, jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.

Maksimiannos on 100 mg kutakin painokiloa kohden päivässä.

Aikuiset, iäkkäät potilaat ja vähintään 40 kg painavat lapset

Tavallinen amoksisilliiniannos on 250 mg - 500 mg kolme kertaa päivässä tai 750 mg - 1 g joka 12. tunti, riippuen infektion vakavuudesta ja tyypistä.

Vakavat infektiot: 750 mg - 1 g kolme kertaa päivässä.

Virtsatieinfektio: 3 g kahdesti päivässä yhden päivän ajan.

Lymen tauti (punkkien levittämä infektio): Eristynyt erythema migrans (varhainen vaihe – punainen tai vaaleanpunainen pyöreä ihottuma): 4 g päivässä, Systemiset ilmentymät (myöhäinen vaihe – vakavammat oireet tai kun tauti leviää kehossa): enintään 6 g päivässä.

Maha- ja pohjukaissuolihaavat: yksi 750 mg tai yksi 1 g annos kahdesti päivässä 7 päivän ajan muiden antibioottien ja mahahaavan hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.

Sydäninfektion ehkäisy leikkauksen aikana: annos vaihtelee leikkauksen tyypin mukaan.

Muita lääkkeitä voidaan antaa samanaikaisesti. Lääkärisi, apteekkihenkilökunta tai hoitaja voi antaa sinulle lisätietoja.

Suosittelun enimmäisannos on 6 g päivässä.

Munuaisten ongelmat

Jos sinulla on munuaisten ongelmia, annos saattaa olla pienempi kuin tavallinen annos.

Jos otat enemmän Amoksisilliini <nimi> kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Amoksisilliini <nimi>, oireita voivat olla vatsavaivat (pahoinvointi, oksentelu tai ripuli) tai kiteet virtsassa, jotka voivat näkyä sameana virtsana tai virtsaamisongelmina. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Ota lääke mukaan näyttääksesi sen lääkäriille.

Jos unohdat ottaa Amoksisilliini <nimi>

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat.

Älä ota seuraavaa annosta liian pian, odota noin 4 tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Kuinka kauan sinun pitäisi ottaa Amoksisilliini <nimi>?

Jatka Amoksisilliini <nimi> ottamista niin kauan kuin lääkärisi on määrännyt, vaikka tuntisit olosi paremmaksi. Tarvitset jokaisen annoksen auttamaan infektion torjunnassa. Jos jotkut bakteerit selviävät, ne voivat aiheuttaa infektion uusiutumisen. Kun olet lopettanut hoidon, jos tunnet olosi edelleen huonoksi, sinun tulisi palata lääkärin vastaanotolle.

Hiivatulehdus (hiivainfektio kehon kosteissa alueissa, joka aiheuttaa arkuutta, kutinaa ja valkoista vuotoa) voi kehittyä, jos Amoksisilliini <nimi> käytetään pitkään. Jos näin tapahtuu, kerro siitä lääkärillesi.

Jos käytät Amoksisilliini <nimi> pitkään, lääkärisi saattaa tehdä lisätutkimuksia tarkistaakseen, että munuaisesi, maksasi ja veresi toimivat normaalisti.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, kysy lääkäriltäsi, apteekista tai hoitajalta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikkakaan kaikki eivät niitä saa.

Lopeta Amoksisilliini <nimi> -lääkkeen käyttö ja hakeudu heti lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä hoitoa: Seuraavat ovat hyvin harvinaisia (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

allergiset reaktiot, joiden merkit voivat sisältää: ihon kutina tai ihottuma, kasvojen, huulten, kielen, kehon turvotus tai hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla vakavia ja satunnaisesti on raportoitu kuolemantapauksia
ihottuma tai pienet litteät punaiset pyöreät täplät ihon pinnan alla tai mustelmat iholla. Tämä johtuu verisuonten seinämien tulehduksesta allergisen reaktion vuoksi. Se voi liittyä nivelkipuihin (niveltulehdus) ja munuaisongelmiin
viivästynyt allerginen reaktio voi esiintyä yleensä 7–12 päivää Amoksisilliini <nimi> -lääkkeen ottamisen jälkeen, joitakin merkkejä ovat: ihottumat, kuume, nivelkiput ja imusolmukkeiden suurentuminen erityisesti kainaloissa
ihoreaktio, joka tunnetaan nimellä 'erythema multiforme', jossa voi kehittyä: kutiavia punertavan violetteja läiskiä iholla erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa, 'nokkosihottuman' kaltaisia kohonneita turvonneita alueita iholla, arkoja alueita suun, silmien ja sukuelinten pinnoilla. Sinulla voi olla kuumetta ja olla hyvin väsynyt
muut vakavat ihoreaktiot voivat sisältää: muutoksia ihon värissä, kyhmyjä ihon alla, rakkuloita, märkärakkuloita, hilseilyä, punoitusta, kipua, kutinaa, hilseilyä. Nämä voivat liittyä kuumeeseen, päänsärkyyn ja kehon kipuihin
flunssan kaltaisia oireita, joihin liittyy ihottuma, kuume, turvonneet rauhaset ja poikkeavat verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntyneet valkosolut (eosinofilia) ja maksaentsyymit) (Lääkeaineen aiheuttama eosinofilia ja systeemiset oireet (DRESS)).
kuume, vilunväristykset, kurkkukipu tai muut infektion merkit, tai jos saat helposti mustelmia. Nämä voivat olla merkkejä verisolujesi ongelmasta

the Jarisch-Herxheimer-reaktio, joka esiintyy Amoksisilliini <name> -hoidon aikana Lymen taudin yhteydessä ja aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa

paksusuolen tulehdus (kolon) ripuli (joskus verinen), kipu ja kuume vakavia maksahaittavaikutuksia voi esiintyä. Ne liittyvät pääasiassa pitkäaikaiseen hoitoon, miehiin ja iäkkäisiin. Sinun on kerrottava lääkäriillesi kiireellisesti, jos saat:

- o vakava ripuli verenvuodolla
- o rakkuloita, ihon punoitusta tai mustelmia
- o tummempi virtsa tai vaaleammat ulosteet
- o ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (keltatauti). Katso myös anemia alla, mikä voi johtaa keltatautiin.

Nämä voivat tapahtua lääkkeen käytön aikana tai jopa useita viikkoja sen jälkeen.

Jos jokin edellä mainituista tapahtuu, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriisi.

Joskus saatat saada lievempiä iho-oireita, kuten:

lievästi kutiava ihottuma (pyöreät, punertavan vaaleanpunaiset läiskät), 'nokkosihottuman' kaltaisia turvonneita alueita kyynärvarsissa, jaloissa, kämmenissä, käsissä tai jaloissa. Tämä on harvinaista (saattaa vaikuttaa enintään 1 henkilöön 100:sta).

Jos sinulla on jokin seuraavista näistä keskustele lääkärisi kanssa, sillä Amoksisilliini <nimi> on lopetettava.

Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

ihottuma
pahoinvointi
ripuli.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

oksentelu.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

hiivatulehdus (hiivainfektio emättimessä, suussa tai ihopoimuissa), voit saada hoitoa hiivatulehdukseen lääkäritäsi tai apteekista

munuaisongelmat

kouristukset, joita on havaittu potilailla, jotka saavat suuria annoksia tai joilla on munuaisongelmia

huimaus

yliaktiivisuus

kiteet virtsassa, jotka voivat näkyä sameana virtsana tai vaikeutena tai epämukavuutena virtsatessa. Varmista, että juot runsaasti nesteitä vähentääksesi näiden oireiden mahdollisuutta

hampaat voivat näyttää värjäytyneiltä, mutta yleensä palautuvat normaaliksi harjauksella (tätä on raportoitu lapsilla)

kieli voi muuttua keltaiseksi, ruskeaksi tai mustaksi ja se voi näyttää karvaiselta punasolujen liiallinen hajoaminen aiheuttaen eräänlaista anemiaa. Merkkejä sisältää:

väsymys, päänsärky, hengenahdistus, huimaus, kalpeus ja ihon sekä silmänvalkuaisten keltaisuus

vähäinen määrä valkosoluja
vähäinen määrä verihiutaleita
veri voi hyytyä hitaammin kuin normaalisti. Saatat huomata tämän, jos saat nenäverenvuodon tai leikkaat itsesi.

Yleisyys tuntematon

aivoja ympäröivän suojakalvon tulehdus (aseptinen aivokalvontulehdus)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, joka on lueteltu liitteessä V.

Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa antamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Amoksisilliini <nimi> säilyttäminen

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyvissä.

Älä säilytä yli 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa jotta suojataan kosteudelta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on merkitty pakkaukseen ja läpipainopakkaukseen kirjainten "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

Älä hävitä lääkkeitä jäteveden tai talousjätteen mukana. Kysy apteekista, miten hävität lääkkeet, joita et enää käytä. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amoksisilliini <nimi> sisältää

Vaikuttava aine jokaisessa tabletissa on 1000 mg amoksisilliinia.

Muut aineet ovat magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, krosprovidoni, aspartaami, mansikan maku. (Mansikan maku sisältää: maissimalto- dekstriiniä, trietyylisitraattia (E1505), maku aineita, propyleeniglykolia (E1520) ja bentsyylialkoholia).

Miltä Amoksisilliini <name> näyttää ja pakkauksen sisältö

Amoksisilliini <name> 1000 mg tabletit

Tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, 22,2 mm x 10 mm pitkiä, soikeita tabletteja, joissa on jakouurre molemmilla puolilla.

Tabletit on pakattu PVC/PVDC/Alumiini- tai PVC/TE/PVDC/AlumiiniAlumiini.

Amoksisilliini <name> 1000 mg tabletit on saatavilla pakkauksissa, joissa on 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 100 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vergunninghouder:

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1
2613 AX Delft Nederland

Valmistaja:

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13-14
13509 Berliini, Saksa

HAUPT Pharma Latina S.r.L.
Strada Statale 156 Monti Lepini Km. 47,600
04100 Borgo S. Michele (Latina), Italia

Rekisteröity:

RVG: 126429

Tämä lääkevalmiste on hyväksytty EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2024.

Muut tietolähteet

Yksityiskohtaiset tiedot tästä lääkkeestä ovat saatavilla MA/viraston.

Yleisiä neuvoja antibioottien käytöstä

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin.

Joskus bakteerin aiheuttama infektio ei reagoi antibioottikuuriin. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, että infektiota aiheuttavat bakteerit ovat vastustuskykyisiä käytettävälle antibiootille. Tämä tarkoittaa, että ne voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootista huolimatta.

Bakteerit voivat tulla vastustuskykyisiksi antibiooteille monista syistä. Antibioottien huolellinen käyttö voi auttaa vähentämään bakteerien vastustuskyvyn kehittymistä.

Kun lääkärisi määrää sinulle antibioottikuurin, se on tarkoitettu vain nykyisen sairautesi hoitoon. Seuraavien ohjeiden noudattaminen auttaa estämään vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä, jotka voisivat estää antibiootin toiminnan.

1. On erittäin tärkeää, että otat antibiootin oikealla annoksella, oikeaan aikaan ja oikean määrän päiviä. Lue etiketissä olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy lääkäriltäsi tai apteekista selitystä.
2. Sinun ei tulisi ottaa antibioottia, ellei sitä ole määrätty erityisesti sinulle, ja sinun tulisi käyttää sitä vain siihen infekioon, johon se on määrätty.
3. Sinun ei tulisi ottaa antibiootteja, jotka on määrätty muille ihmisille, vaikka heillä olisi ollut infektio, joka oli samankaltainen kuin sinun.
4. Sinun ei tulisi antaa sinulle määrättyjä antibiootteja muille ihmisille.
5. Jos sinulle jää antibiootteja jäljelle, kun olet ottanut kuurin lääkärin ohjeiden mukaan, sinun tulisi viedä loput apteekkiin asianmukaista hävittämistä varten.

Transtoyou