

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Amoksicilinas Centrient 1000 mg tabletės
Amoksicilinas

Perskaitykite visą šį lapelį atidžiai prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija jums.

Laikykitės šį lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.

Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką.

Šis vaistas buvo paskirtas tik jums. Nepasidalinkite juo su kitais. Tai gali jiems pakenkti, net jei jų ligos požymiai yra tokie patys kaip jūsų.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką. Tai apima bet kokį galimą šalutinį poveikį, nurodytą šiame lapelyje. Žr. 4 skyrių.

Kas yra šiame lapelyje

1. Kas yra Amoksicilinas <pavadinimas> ir kam jis vartojamas
2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Amoksiciliną <pavadinimas>
3. Kaip vartoti Amoksiciliną <pavadinimas>
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Amoksiciliną <pavadinimas>
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Amoksicilinas <name> ir kam jis vartojamas

Kas yra Amoksicilinas <name>

Amoksicilinas <name> yra antibiotikas. Veiklioji medžiaga yra amoksicilinas. Jis priklauso vaistų grupei, vadinamai „penicilinais“.

Kam vartojamas Amoksicilinas <name>

Amoksicilinas <name> vartojamas bakterijų sukeltoms infekcijoms įvairiose kūno vietose gydyti. Amoksicilinas <name> taip pat gali būti vartojamas kartu su kitais vaistais skrandžio opoms gydyti.

2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Amoksiciliną <name>

Nevartokite Amoksicilino <name>:

jei esate alergiškas amoksicilinui, penicilinui ar bet kuriai kitai šio vaisto sudedamajai daliai (išvardyti 6 skyriuje).

jei kada nors turėjote alerginę reakciją į bet kurį antibiotiką. Tai gali būti odos bėrimas arba veido ar gerklės patinimas.

Nevartokite Amoksicilino <name>, jei bet kuris iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksiciliną <name>.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksiciliną <name>, jei:

sergate liaukine karštine (karščiavimas, gerklės skausmas, patinę liaukos ir didelis nuovargis)

turite inkstų problemų

nešlapinatės reguliariai.

Jei nesate tikri, ar kuris nors iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksiciliną <name>.

Kraujo ir šlapimo tyrimai

Jei jums atliekami:

Šlapimo tyrimai (gliukozės) arba kraujo tyrimai kepenų funkcijai

Estriolio tyrimai (naudojami nėštumo metu, siekiant patikrinti, ar kūdikis vystosi normaliai)

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, kad vartojate Amoksiciliną <name>. Taip yra todėl, kad Amoksicilinas <name> gali paveikti šių tyrimų rezultatus.

Kiti vaistai ir Amoksicilinas <name>

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate, neseniai vartojote ar galite vartoti kitus vaistus.

Jei vartojate alopurinolį (naudojamą podagrai gydyti) kartu su Amoksicilinu <name>, gali būti didesnė tikimybė, kad pasireikš alerginė odos reakcija.

Jei vartojate probenecidą (naudojamą podagrai gydyti), jūsų gydytojas gali nuspręsti koreguoti Amoksicilino <name> dozę.

Jei vartojate vaistus, padedančius sustabdyti kraujo krešulius (pvz., varfariną), jums gali prireikti papildomų kraujo tyrimų.

Jei vartojate kitus antibiotikus (pvz., tetracikliną), Amoksicilinas <name> gali būti mažiau veiksmingas.

Jei vartojate metotreksatą (naudojamą vėžiui ir sunkiai psoriazei gydyti), Amoksicilinas <name> gali padidinti šalutinių poveikių riziką.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Jei esate nėščia ar žindote kūdikį, manote, kad galite būti nėščia arba planuojate turėti kūdikį, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Amoksicilinas <name> gali sukelti šalutinius poveikius, o simptomai (tokie kaip alerginės reakcijos, galvos svaigimas ir traukuliai) gali padaryti jus netinkamais vairuoti.

Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, jei nesijaučiate gerai.

Amoksicilinas <name> sudėtyje yra aspartamo

Šiame vaistiniame preparate yra 20 mg aspartamo kiekvienoje tabletėje, kas atitinka 20 mg/1000 mg.

Aspartamas (E951) yra fenilalanino šaltinis. Jis gali būti kenksmingas, jei turite fenilketonuriją (PKU), retą genetinį sutrikimą, kai fenilalaninas kaupiasi, nes organizmas negali jo tinkamai pašalinti.

Amoksicilinas <name> sudėtyje yra maltodekstrino

Maltodekstrinas absorbuojamas kaip gliukozė. Jei gydytojas jums sakė, kad turite netoleranciją kai kuriems cukrams, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

3. Kaip vartoti Amoksiciliną <name>

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Tabletes galima vartoti dviem būdais. Vartokite tiesiogiai su vandeniu arba pirmiausia ištirpinkite vandenyje, tada išgerkite.

Tabletes galima padalyti į lygias dozes.

Dozes paskirstykite tolygiai per dieną, bent 4 valandų intervalais.

Įprasta dozė yra:

Vaikai, sveriantys mažiau nei 40 kg

Visos dozės apskaičiuojamos pagal vaiko kūno svorį kilogramais.

Gydytojas patars, kiek Amoksicilino <name> turėtumėte duoti savo kūdikiui ar vaikui.

Įprasta dozė yra 40 mg iki 90 mg kiekvienam kūno svorio kilogramui per dieną, padalinta į dvi ar tris dozes.

Didžiausia dozė yra 100 mg kiekvienam kūno svorio kilogramui per dieną.

Suaugusieji, senyvo amžiaus pacientai ir vaikai, sveriantys 40 kg ar daugiau

Įprasta amoksicilino dozė yra 250 mg iki 500 mg tris kartus per dieną arba 750 mg iki 1 g kas 12 valandų, priklausomai nuo infekcijos sunkumo ir tipo.

Sunkios infekcijos: 750 mg iki 1 g tris kartus per dieną.

Šlapimo takų infekcija: 3 g du kartus per dieną vieną dieną.

Laimo liga (infekcija, plintanti per parazitus, vadinamus erkėmis): Izoliuota eritema

migrans (ankstyva stadija – raudonas arba rožinis apskritas bėrimas): 4 g per dieną, Sisteminės apraiškos (vėlyva stadija – rimtesniems simptomams arba kai liga plinta po kūną): iki 6 g per dieną.

Skrandžio opos: viena 750 mg arba viena 1 g dozė du kartus per dieną 7 dienas su kitais antibiotikais ir vaistais skrandžio opoms gydyti.

Norint išvengti širdies infekcijos operacijos metu: dozė skirsis priklausomai nuo operacijos tipo. Kiti vaistai taip pat gali būti skiriami tuo pačiu metu. Gydytojas, vaistininkas ar slaugytoja gali suteikti daugiau informacijos.

Didžiausia rekomenduojama dozė yra 6 g per dieną.

Inkstų problemos

Jei turite inkstų problemų, dozė gali būti mažesnė nei įprasta dozė.

Jei vartojate daugiau Amoksicilino <name> nei turėtumėte

Jei išgėrėte per daug Amoksicilino <name>, požymiai gali būti skrandžio sutrikimas (pykinimas, vėmimas arba viduriavimas) arba kristalai šlapime, kurie gali pasireikšti kaip drumstas šlapimas arba šlapinimosi problemos. Kuo greičiau pasitarkite su gydytoju. Pasiimkite vaistus parodyti gydytojui.

Jei pamiršote išgerti Amoksicilino <name>

Jei pamiršote išgerti dozę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite.

Negerkite kitos dozės per greitai, palaukite apie 4 valandas prieš kitą dozę.

Negerkite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Kiek laiko turėtumėte vartoti Amoksiciliną <name>?

Tęskite Amoksicilino <name> vartojimą tiek, kiek nurodė gydytojas, net jei jaučiatės geriau. Jums reikia kiekvienos dozės, kad padėtumėte kovoti su infekcija. Jei kai kurios bakterijos išgyvena, jos gali sukelti infekcijos atsinaujinimą.

Baigę gydymą, jei vis dar jaučiatės blogai, turėtumėte grįžti pas gydytoją.

Pienligė (mielių infekcija drėgnose kūno vietose, sukianti skausmą, niežulį ir baltą išskyrą) gali išsivystyti, jei Amoksicilinas <name> vartojamas ilgą laiką. Jei taip atsitinka, pasakykite gydytojui.

Jei vartojate Amoksiciliną <name> ilgą laiką, gydytojas gali atlikti papildomus tyrimus, kad patikrintų, ar jūsų inkstai, kepenys ir kraujas veikia normaliai.

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienam jis pasireiškia.

Nustokite vartoti Amoksiciliną <name> ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebėsite bet kurį iš šių sunkių šalutinių poveikių – jums gali prireikti skubios medicininės pagalbos: Toliau išvardyti šalutiniai poveikiai yra labai reti (gali pasireikšti iki 1 iš 10 000 žmonių)

alerginės reakcijos, požymiai gali apimti: odos niežėjimas ar bėrimas, veido, lūpų, liežuvio, kūno patinimas arba kvėpavimo sunkumai. Tai gali būti rimta ir kartais pasitaikė mirties atvejų

bėrimas arba smulkūs plokšti raudoni apvalūs taškeliai po odos paviršiumi arba odos mėlynės. Tai atsiranda dėl kraujagyslių sienelių uždegimo, kurį sukelia alerginė reakcija.

Tai gali būti susiję su sąnarių skausmu (artritu) ir inkstų problemomis

uždelsta alerginė reakcija gali pasireikšti paprastai po 7–12 dienų po Amoksicilino <name> vartojimo, kai kurie požymiai apima: bėrimus, karščiavimą, sąnarių skausmus ir limfmazgių padidėjimą, ypač po pažastimis

odos reakcija, žinoma kaip 'daugiaformė eritema', kai gali atsirasti: niežtinčios raudonai violetinės dėmės ant odos, ypač ant delnų ar pėdų padų, 'dilgėlinės' tipo iškilusios patinusios vietos ant odos, jautrios vietos burnos, akių ir lytinių organų paviršiuose. Gali būti karščiavimas ir didelis nuovargis

kitos sunkios odos reakcijos gali apimti: odos spalvospokyčius, gumbelius po oda, pūsles, pustules, lupimąsi, paraudimą, skausmą, niežėjimą, pleiskanojimą. Tai gali būti susiję su karščiavimu, galvos skausmais ir kūno skausmais

gripo tipo simptomai su bėrimu, karščiavimu, patinusiais liaukomis ir nenormaliais kraujo tyrimų rezultatais (įskaitant padidėjusį baltųjų kraujo kūnelių (eozinofiliją) ir kepenų fermentus) (Vaistų reakcija su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS)).

karščiavimas, šaltkrėtis, gerklės skausmas ar kiti infekcijos požymiai, arba jei lengvai atsiranda mėlynės. Tai gali būti jūsų kraujo ląstelių problemos požymiai

the Jarisch–Herxheimer reakcija, kuri pasireiškia gydant Amoksicilinu <name> Laimo ligą ir sukelia karščiavimą, šaltkrėtį, galvos skausmą, raumenų skausmą ir odos bėrimą storosios žarnos (kolono) uždegimas su viduriavimu (kartais su krauju), skausmu ir karščiavimu

gali pasireikšti sunkus kepenų šalutinis poveikis. Jie dažniausiai susiję su žmonėmis, kurie gydomi ilgą laiką, vyrais ir senyvo amžiaus žmonėmis. Jūs turite skubiai informuoti savo gydytoją, jei pasireiškia:

- o sunkus viduriavimas su kraujavimu
- o pūslelės, odos paraudimas ar mėlynės ant odos
- o tamsėnis šlapimas arba šviesesnės išmatos
- o odos ar akių baltymų pageltimas (gelta). Taip pat žiūrėkite anemija žemiau, kuri gali sukelti geltą.

Tai gali įvykti vartojant vaistą arba iki kelių savaičių po to.

Jei kas nors iš aukščiau paminėtų pasireiškia, nustokite vartoti vaistą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Kartais gali pasireikšti mažiau sunkios odos reakcijos, tokios kaip:

lengvai niežtintis bėrimas (apvalios, rausvai raudonos dėmės), 'dilgėlinės' tipo patinimai ant dilbių, kojų, delnų, rankų ar pėdų. Tai yra nedažna (gali paveikti iki 1 iš 100 žmonių).

Jei turite bet kurį iš šių simptomų, pasitarkite su savo gydytoju, nes Amoksicilinas <name> turės būti nutrauktas.

Kiti galimi šalutiniai poveikiai yra:

Dažni (gali paveikti iki 1 iš 10 žmonių)

- odas bėrimas
- pykinimas
- viduriavimas.

Nedažni (gali paveikti iki 1 iš 100 žmonių)

vėmimas.

Labai reti (gali paveikti iki 1 iš 10 000 žmonių)

pienligė (mielių infekcija makštyje, burnoje ar odos raukšlėse), gydymą pienligei galite gauti iš savo gydytojo ar vaistininko

inkstų problemos

traukuliai (konvulsijos), pastebėti pacientams, vartojantiems dideles dozes arba turintiems inkstų problemų

galvos svaigimas

hiperaktyvumas

kristalai šlapime, kurie gali pasireikšti kaip drumstas šlapimas arba sunkumas ar diskomfortas šlapinantis. Įsitikinkite, kad geriate daug skysčių, kad sumažintumėte šių simptomų tikimybę

dantys gali atrodyti dėmėti, paprastai grįžta į normalią būklę valant (tai buvo pastebėta vaikams)

liežuvis gali tapti geltonas, rudas arba juodas ir gali atrodyti plaukuotas

pernelyg didelis raudonųjų kraujo kūnelių irimas, sukeliantis tam tikrą anemiją. Požymiai apima: nuovargis, galvos skausmai, dusulys, galvos svaigimas, blyškumas ir odos bei

akių baltymų pageltimas

mažas baltųjų kraujo kūnelių skaičius

mažas kraujo krešėjime dalyvaujančių ląstelių skaičius

kraujas gali krešėti ilgiau nei įprastai. Tai galite pastebėti, jei kraujuoja nosis arba įsipjaunate.

Dažnis nežinomas

smegenų apsauginės membranos uždegimas (aseptinis meningitas)

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, nurodytą šiame lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per nacionalinę pranešimų sistemą, nurodytą V priede. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Amoksiciliną <pavadinimas>

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nelaikykite aukštesnėje kaip 25°C. Laikyti originalioje pakuotėje kad apsaugotumėte nuo drėgmės.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po raidžių „EXP“. Galiojimo data nurodo paskutinę to mėnesio dieną.

Neleiskite vaistų į nuotekas ar buitinių atliekų srautą. Paklauskite savo vaistininko, kaip išmesti vaistus, kurių nebevartojate. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kas yra Amoksicilinas <pavadinimas>

Veiklioji medžiaga kiekvienoje tabletėje yra 1000 mg amoksicilino.

Kitos sudedamosios dalys yra magnio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, krosprovidonas, aspartamas, braškių skonis. (Braškių skonis sudaro: kukurūzų maltodekstrinas, triacetinas (E1505), kvapiosios medžiagos, propilenglikolis (E1520) ir benzilo alkoholis).

Kaip atrodo Amoksicilinas <name> ir pakuotės turinys

Amoksicilinas <name> 1000 mg tabletės

Tabletės yra baltos arba balkšvos, 22,2 mm x 10 mm, pailgos formos su vienu įrėžimu abiejose pusėse.

Tabletės supakuotos į PVC/PVDC/aliuminio arba PVC/TE/PVDC/aliuminio lizdines plokšteles. Aliuminis.

Amoksicilinas <name> 1000 mg tabletės yra pakuotėse po 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 100 tablečių

Ne visos pakuotės dydžiai gali būti parduodami.

Rinkodaros Leidimo Turėtojas ir Gamintojas

Leidimo turėtojas:

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1
2613 AX Delft Nederland

Gamintojas:

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13-14
13509 Berlynas, Vokietija

HAUPT Pharma Latina S.r.L.
Strada Statale 156 Monti Lepini Km. 47,600
04100 Borgo S. Michele (Latina), Italija

Įregistruota registre:

RVG: 126429

Šis vaistinis preparatas yra autorizuotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2024.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą yra prieinama MA/Agentūros.

Bendri patarimai dėl antibiotikų vartojimo

Antibiotikai naudojami bakterijų sukeltoms infekcijoms gydyti. Jie neturi poveikio virusų sukeltoms infekcijoms.

Kartais bakterijų sukelta infekcija nereaguoja į antibiotikų kursą. Viena iš dažniausių priežasčių yra ta, kad bakterijos, sukeliančios infekciją, yra atsparios vartojamam antibiotikui. Tai reiškia, kad jos gali išgyventi ir net daugintis nepaisant antibiotiko.

Bakterijos gali tapti atsparios antibiotikams dėl daugelio priežasčių. Atsargus antibiotikų vartojimas gali padėti sumažinti tikimybę, kad bakterijos taps jiems atsparios.

Kai jūsų gydytojas paskiria antibiotikų kursą, jis skirtas tik jūsų dabartinei ligai gydyti. Laikydami šių patarimų padėsite išvengti atsparių bakterijų atsiradimo, kurios galėtų sustabdyti antibiotiko veikimą.

1. Labai svarbu, kad vartotumėte antibiotiką tinkama doze, tinkamu laiku ir tinkamą dienų skaičių. Perskaitykite instrukcijas etiketėje ir jei ko nors nesuprantate, paprašykite gydytojo ar vaistininko paaiškinti.
2. Neturėtumėte vartoti antibiotiko, jei jis nebuvo specialiai jums paskirtas, ir turėtumėte jį naudoti tik tam infekcijai gydyti, kuriai jis buvo paskirtas.

3. Neturėtumėte vartoti antibiotikų, kurie buvo paskirti kitiems žmonėms, net jei jie turėjo infekciją, kuri buvo panaši į jūsų.
4. Neturėtumėte duoti antibiotikų, kurie buvo paskirti jums, kitiems žmonėms.
5. Jei jums liko antibiotikų, kai baigėte kursą, kaip nurodė gydytojas, turėtumėte likučius nunešti į vaistinę tinkamam utilizavimui.

Transtoyou