

Prospect: Informații pentru utilizator
Amoxicilină Centrient 1000 mg comprimate
Amoxicilină

Citiți toate acest prospect cu atenție înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie necesar să-l recitiți.

Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament v-a fost prescris numai dumneavoastră. Nu-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă simptomele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră. Dacă manifestați orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. Acestea includ orice reacții adverse posibile care nu sunt menționate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce conține acest prospect

1. Ce este Amoxicilina <nume> și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Amoxicilina <nume>
3. Cum să luați Amoxicilina <nume>
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Amoxicilina <nume>
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Amoxicilina <name> și pentru ce se utilizează

Ce este Amoxicilina <name>

Amoxicilina <name> este un antibiotic. Substanța activă este amoxicilina. Aceasta aparține unui grup de medicamente numite „peniciline”.

Pentru ce se utilizează Amoxicilina <name>

Amoxicilina <name> este utilizată pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii în diferite părți ale corpului. Amoxicilina <name> poate fi de asemenea utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata ulcerul gastric.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Amoxicilina <name>

Nu luați Amoxicilina <name>:

dacă sunteți alergic la amoxicilină, penicilină sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale acestui medicament (enumerat în secțiunea 6).

dacă ați avut vreodată o reacție alergică la orice antibiotic. Aceasta poate include o erupție cutanată sau umflarea feței sau a gâtului.

Nu luați Amoxicilina <name> dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Amoxicilina <name>.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Amoxicilina <name>, dacă:

aveți febră glandulară (febră, durere în gât, glande umflate și oboseală extremă)
aveți probleme renale
nu urinați regulat.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică la dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Amoxicilina <name>.

Teste de sânge și urină

Dacă efectuați:

Teste de urină (glucoză) sau teste de sânge pentru funcția hepatică
Oestriol teste (utilizate în timpul sarcinii pentru a verifica dacă bebelușul se dezvoltă normal)
Informați medicul sau farmacistul că luați Amoxicilină <name>. Acest lucru se datorează faptului că Amoxicilină <name> poate afecta rezultatele acestor teste.

Alte medicamente și Amoxicilină <name>

Informați medicul sau farmacistul dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Dacă luați allopurinol (utilizat pentru gută) împreună cu Amoxicilină <name>, este mai probabil să aveți o reacție alergică cutanată.

Dacă luați probenecid (utilizat pentru gută), medicul dumneavoastră poate decide să ajusteze doza de Amoxicilină <name>.

Dacă luați medicamente pentru a ajuta la oprirea cheagurilor de sânge (cum ar fi warfarina), este posibil să aveți nevoie de teste de sânge suplimentare.

Dacă luați alte antibiotice (cum ar fi tetraciclina), Amoxicilină <name> poate fi mai puțin eficientă.

Dacă luați metotrexat (utilizat pentru tratamentul cancerului și al psoriazisului sever), Amoxicilină <name> poate provoca o creștere a efectelor secundare.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil, cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Amoxicilină <name> poate avea efecte secundare, iar simptomele (cum ar fi reacțiile alergice, amețelile și convulsiile) vă pot face inapt pentru a conduce.

Nu conduceți sau nu folosiți utilaje decât dacă vă simțiți bine.

Amoxicilină <name> conține Aspartam

Acest medicament conține 20 mg aspartam în fiecare comprimat, ceea ce este echivalent cu 20 mg/1000 mg.

Aspartamul (E951) este o sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător dacă aveți fenilcetonurie (PKU), o tulburare genetică rară în care fenilalanina se acumulează deoarece organismul nu o poate elimina corespunzător.

Amoxicilină <name> conține maltodextrină

Maltodextrina este absorbită ca glucoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți o intoleranță la unele zaharuri, contactați medicul înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luați Amoxicilină <nume>

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Verificați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Comprimatele pot fi utilizate în două moduri. Luați-le direct cu apă sau dispersați-le mai întâi în apă, apoi beți.

Comprimatele pot fi divizate în doze egale.

Spațiați dozele uniform pe parcursul zilei, la cel puțin 4 ore distanță.

Doza obișnuită este:

Copii cu greutatea mai mică de 40 kg

Toate dozele sunt calculate în funcție de greutatea corporală a copilului în kilograme.

Medicul dumneavoastră vă va sfătui câtă Amoxicilină <nume> ar trebui să dați bebelușului sau copilului dumneavoastră.

Doza obișnuită este de 40 mg până la 90 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi, administrată în două sau trei doze divizate.

Doza maximă este de 100 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi.

Adulți, pacienți vârstnici și copii cu greutatea de 40 kg sau mai mult

Doza obișnuită de amoxicilină este de 250 mg până la 500 mg de trei ori pe zi sau 750 mg până la 1 g la fiecare 12 ore, în funcție de severitatea și tipul infecției.

Infecții severe: 750 mg până la 1 g de trei ori pe zi.

Infecție urinară: 3 g de două ori pe zi pentru o zi.

Boala Lyme (o infecție răspândită de paraziți numiți căpușe): Eritem migrator izolat (stadiu incipient – erupție circulară roșie sau roz): 4 g pe zi, Manifestări sistemice (stadiu tardiv – pentru simptome mai grave sau când boala se răspândește în corp): până la 6 g pe zi.

Ulcer gastric: o doză de 750 mg sau 1 g de două ori pe zi timp de 7 zile cu alte antibiotice și medicamente pentru tratarea ulcerului gastric.

Pentru a preveni infecția cardiacă în timpul intervenției chirurgicale: doza va varia în funcție de tipul de intervenție chirurgicală. Alte medicamente pot fi administrate în același timp. Medicul, farmacistul sau asistenta vă pot oferi mai multe detalii.

Doza maximă recomandată este de 6 g pe zi.

Probleme renale

Dacă aveți probleme renale, doza ar putea fi mai mică decât doza obișnuită.

Dacă luați mai mult Amoxicilină <name> decât ar trebui

Dacă ați luat prea mult Amoxicilină <name>, semnele pot fi un stomac deranjat (senzație de greutate, vărsături sau diaree) sau cristale în urină, care pot fi observate ca urină tulbură sau probleme la urinare. Discutați cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil. Luați medicamentul pentru a-l arăta medicului.

Dacă uitați să luați Amoxicilină <name>

Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți.

Nu luați următoarea doză prea curând, așteptați aproximativ 4 ore înainte de a lua următoarea doză.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Cât timp ar trebui să luați Amoxicilină <name>?

Continuați să luați Amoxicilină <name> atât timp cât v-a spus medicul dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți mai bine. Aveți nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la combaterea infecției. Dacă unele bacterii supraviețuiesc pot provoca revenirea infecției.

Odată ce terminați tratamentul, dacă încă vă simțiți rău, ar trebui să reveniți la medic.

Candidoza (o infecție fungică a zonelor umede ale corpului care cauzează durere, mâncărime și secreție albă) poate apărea dacă Amoxicilină <name> este utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Dacă acest lucru se întâmplă, spuneți medicului dumneavoastră.

Dacă luați Amoxicilină <name> pentru o perioadă lungă de timp, medicul dumneavoastră poate efectua teste suplimentare pentru a verifica dacă rinichii, ficatul și sângele dumneavoastră funcționează normal.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre utilizarea acestui medicament, întrebați medicul, farmacistul sau asistenta.

4. Posibile efecte secundare

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca efecte secundare, deși nu toată lumea le manifestă.

Opriti administrarea Amoxicilină <name> și consultați imediat un medic, dacă observați oricare dintre următoarele efecte secundare grave – este posibil să aveți nevoie de tratament medical urgent: Următoarele sunt foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane)

reacții alergice, semnele pot include: mâncărime sau erupție cutanată, umflarea feței, buzelor, limbii, corpului sau dificultăți de respirație. Acestea pot fi grave și ocazional au apărut decese

erupție cutanată sau pete roșii rotunde plate sub suprafața pielii sau vânătași ale pielii. Acest lucru se datorează inflamației pereților vaselor de sânge din cauza unei reacții alergice. Poate fi asociat cu dureri articulare (artrită) și probleme renale
o reacție alergică întârziată poate apărea de obicei la 7 până la 12 zile după administrarea Amoxicilină <name>, unele semne includ: erupții cutanate, febră, dureri articulare și mărirea ganglionilor limfatici, în special sub brațe
o reacție cutanată cunoscută sub numele de 'eritem multiform' în care puteți dezvolta: mâncărime roșu-purpurie pe piele, în special pe palmele mâinilor sau tălpile picioarelor, zone umflate asemănătoare urticariei pe piele, zone sensibile pe suprafețele gurii, ochilor și organelor genitale. Puteți avea febră și să fiți foarte obosit
alte reacții cutanate severe pot include: modificări ale culorii pielii, umflături sub piele, vezicule, pustule, descumare, roșeață, durere, mâncărime, descumare. Acestea pot fi asociate cu febră, dureri de cap și dureri corporale
simptome asemănătoare gripei cu erupție cutanată, febră, ganglioni umflați și rezultate anormale ale testelor de sânge (inclusiv creșterea numărului de globule albe

(eozinofilie) și a enzimelor hepatice) (Reacție la Medicament cu Eozinofilie și Simptome Sistemice (DRESS)).

febră, frisoane, durere în gât sau alte semne de infecție, sau dacă vă învineți ușor.

Acestea pot fi semne ale unei probleme cu celulele sanguine

the Jarisch-Reacția Herxheimer care apare în timpul tratamentului cu Amoxicilină

<name> pentru boala Lyme și cauzează febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare și erupții cutanate

inflamația intestinului gros (colon) cu diaree (uneori conținând sânge), durere și febră

pot apărea efecte secundare grave la nivelul ficatului. Acestea sunt asociate în principal cu persoanele care urmează tratament pe o perioadă lungă, bărbații și vârstnicii. Trebuie să informați urgent medicul dacă aveți:

- o severă diaree cu sângerare
- o bășici, roșeață sau vânătăi ale pielii
- o urină mai închisă la culoare sau scaune mai deschise la culoare
- o îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter). Vezi și anemie mai jos, care ar putea duce la icter.

Acestea pot apărea în timpul administrării medicamentului sau până la câteva săptămâni după.

Dacă oricare dintre cele de mai sus se întâmplă, opriți administrarea medicamentului și consultați imediat medicul.

Uneori puteți avea reacții cutanate mai puțin severe, cum ar fi:

- o erupție ușor mâncărime (pete rotunde, roz-roșii), zone umflate asemănătoare urticariei pe antebrațe, picioare, palme, mâini sau picioare. Acest lucru este neobișnuit (poate afecta până la 1 din 100 de persoane).

Dacă aveți oricare dintre acestea, discutați cu medicul dumneavoastră, deoarece Amoxicilina <nume> va trebui oprită.

Alte posibile efecte secundare sunt:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- erupție cutanată
- greață
- diaree.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

- vărsături.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane)

candidoză (o infecție cu drojdie a vaginului, gurii sau pliurilor pielii), puteți obține tratament pentru candidoză de la medicul sau farmacistul dumneavoastră

probleme renale

convulsii, observate la pacienții cu doze mari sau cu probleme renale

amețeli

hiperactivitate

cristale în urină, care pot fi observate ca urină tulbure sau dificultate sau disconfort la urinare. Asigurați-vă că beți multe lichide pentru a reduce șansa acestor simptome

dinții pot părea pătați, revenind de obicei la normal prin periaj (acest lucru a fost raportat la copii)

limba poate deveni galbenă, maro sau neagră și poate avea un aspect păros
o descompunere excesivă a globulelor roșii care cauzează un tip de anemie. Semnele
includ: oboseală, dureri de cap, dificultăți de respirație, amețeli, paloare și îngălbenirea
pielii și a albului ochilor
număr scăzut de globule albe
număr scăzut de celule implicate în coagularea sângelui
sângele poate coagula mai lent decât în mod normal. Puteți observa acest lucru dacă
aveți o sângerare nazală sau vă tăiați.

Frecvență necunoscută

inflamația membranei protectoare care înconjoară creierul (meningită aseptică)

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.
Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De
asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemul național de raportare listat în
anexa V. Raportând reacțiile adverse, puteți ajuta la furnizarea de mai multe informații despre
siguranța acestui medicament.

5. Cum să păstrați Amoxicilina <nume>

A nu se lăsa acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu depozitați la temperaturi de peste 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a proteja
de umiditate.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister după
literele „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați medicamentele pe calea apelor uzate sau a deșeurilor menajere. Întrebați
farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta
la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Amoxicilină <nume>

Substanța activă din fiecare comprimat este amoxicilină 1000 mg.

Celelalte ingrediente sunt stearat de magneziu, celuloză microcristalină, crospovidonă,
aspartam, aromă de căpșuni . (Aroma de căpșuniconține: aromă componente aromatizante ,
propilenglicol (E1520) și alcool benzilic). aromă componente, propilenglicol (E1520) și alcool
benzilic).

Cum arată Amoxicilina <name> și conținutul ambalajului

Comprimate de Amoxicilină <name> 1000 mg

Comprimatele sunt albe sau alb-gălbui, de formă oblongă, de 22,2 mm pe 10 mm, cu o linie de
rupere pe ambele părți.

Comprimatele sunt ambalate în blistere de PVC/PVDC/Aluminiu sau PVC/TE/PVDC/Aluminiu.

Comprimate de Amoxicilină <name> 1000 mg este disponibil în pachete de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 100 comprimate

Nu toate dimensiunile pachetelor pot fi comercializate.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și Producătorul

Deținătorul autorizației:

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1
2613 AX Delft Nederland

Producător:

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13-14
13509 Berlin, Germania

HAUPT Pharma Latina S.r.L.
Strada Statale 156 Monti Lepini Km. 47,600
04100 Borgo S. Michele (Latina), Italia

Înregistrat în registru sub:

RVG: 126429

Acest produs medicamentos este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2024.

Alte surse de informații

Informații detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al MA/Agentiei.

Sfaturi generale privind utilizarea antibioticelor

Antibioticele sunt utilizate pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii. Ele nu au efect împotriva infecțiilor cauzate de viruși.

Uneori, o infecție cauzată de bacterii nu răspunde la un tratament cu un antibiotic. Unul dintre cele mai comune motive pentru care acest lucru se întâmplă este că bacteriile care cauzează infecția sunt rezistente la antibioticul care este administrat. Acest lucru înseamnă că ele pot supraviețui și chiar se pot înmulți în ciuda antibioticului.

Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din multe motive. Utilizarea atentă a antibioticelor poate ajuta la reducerea șansei ca bacteriile să devină rezistente la ele.

Când medicul dumneavoastră prescrie un tratament cu un antibiotic, acesta este destinat să trateze doar boala dumneavoastră actuală. Acordând atenție următoarelor sfaturi, veți ajuta la prevenirea apariției bacteriilor rezistente care ar putea împiedica funcționarea antibioticului.

1. Este foarte important să luați antibioticul la doza corectă, la momentele potrivite și pentru numărul corect de zile. Citiți instrucțiunile de pe etichetă și, dacă nu înțelegeți ceva, cereți medicului sau farmacistului să vă explice.
2. Nu ar trebui să luați un antibiotic decât dacă a fost prescris special pentru dumneavoastră și ar trebui să-l utilizați doar pentru a trata infecția pentru care a fost prescris.
3. Nu ar trebui să luați antibiotice care au fost prescrise pentru alte persoane, chiar dacă au avut o infecție similară cu a dumneavoastră.
4. Nu ar trebui să dați antibioticele care v-au fost prescrise altor persoane.
5. Dacă vă rămâne vreun antibiotic după ce ați urmat tratamentul așa cum v-a indicat medicul, ar trebui să duceți restul la o farmacie pentru eliminare corespunzătoare.