

Bipacksedel: Information till användaren
Amoxicilline Centrient 1000 mg tabletter
Amoxicillin

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras symtom är desamma som dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Vad denna bipacksedel innehåller

1. Vad Amoxicillin <namn> är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin <namn>
3. Hur du tar Amoxicillin <namn>
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amoxicillin <namn> ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amoxicillin <name> är och vad det används för

Vad Amoxicillin <name> är

Amoxicillin <name> är ett antibiotikum. Den aktiva substansen är amoxicillin. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas 'penicillin'.

Vad Amoxicillin <name> används för

Amoxicillin <name> används för att behandla infektioner orsakade av bakterier i olika delar av kroppen. Amoxicillin <name> kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin <name>

Ta inte Amoxicillin <name>:

om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller något av de andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot något antibiotikum. Detta kan inkludera hudutslag eller svullnad i ansikte eller hals.

Ta inte Amoxicillin <name> om något av ovanstående gäller. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin <name>.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin <name>, om du:

har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna körtlar och extrem trötthet)

har njurproblem

inte urinerar regelbundet.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin <name>.

Blod- och urinprover

Om du ska genomgå:

Urinprov (glukos) eller blodprov för leverfunktion

Östriol tester (används under graviditet för att kontrollera att barnet utvecklas normalt)

Tala om för din läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin <name>. Detta beror på att Amoxicillin <name> kan påverka resultaten av dessa tester.

Andra läkemedel och Amoxicillin <name>

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel.

Om du tar allopurinol (används mot gikt) tillsammans med Amoxicillin <name>, är det mer sannolikt att du får en allergisk hudreaktion.

Om du tar probenecid (används mot gikt), kan din läkare besluta att justera din dos av Amoxicillin <name>.

Om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (såsom warfarin), kan du behöva extra blodprov.

Om du tar andra antibiotika (såsom tetracyklin) kan Amoxicillin <name> vara mindre effektivt.

Om du tar metotrexat (används för behandling av cancer och svår psoriasis) kan Amoxicillin <name> orsaka en ökning av biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin <name> kan ha biverkningar och symtomen (såsom allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra att du inte är lämplig att köra.

Kör inte eller använd maskiner om du inte mår bra.

Amoxicillin <name> innehåller Aspartam

Detta läkemedel innehåller 20 mg aspartam i varje tablett, vilket motsvarar 20 mg/1000 mg.

Aspartam (E951) är en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt genetisk störning där fenylalanin byggs upp eftersom kroppen inte kan avlägsna det ordentligt.

Amoxicillin <name> innehåller maltodextrin

Maltodextrin absorberas som glukos. Om din läkare har informerat dig om att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur man tar Amoxicillin <namn>

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna kan användas på två sätt. Ta direkt med vatten eller lös först upp i vatten, drick sedan.

Tabletterna kan delas i lika stora doser.

Fördela doserna jämnt under dagen, med minst 4 timmars mellanrum.

Den vanliga dosen är:

Barn som väger mindre än 40 kg

Alla doser beräknas beroende på barnets kroppsvikt i kilogram.

Din läkare kommer att ge råd om hur mycket Amoxicillin <namn> du ska ge till din bebis eller ditt barn.

Den vanliga dosen är 40 mg till 90 mg per kilogram kroppsvikt per dag, fördelat på två eller tre doser.

Den maximala dosen är 100 mg per kilogram kroppsvikt per dag.

Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen av amoxicillin är 250 mg till 500 mg tre gånger om dagen eller 750 mg till 1 g var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

Svåra infektioner: 750 mg till 1 g tre gånger om dagen.

Urinvägsinfektion: 3 g två gånger dagligen under en dag.

Borrelia (en infektion spridd av parasiter som kallas fästingar): Isolerad erythema migrans (tidigt stadium – röd eller rosa cirkulärt utslag): 4 g per dag, Systemiska manifestationer (sent stadium – för allvarigare symtom eller när sjukdomen sprider sig i kroppen): upp till 6 g per dag.

Magsår: en dos på 750 mg eller 1 g två gånger om dagen i 7 dagar tillsammans med andra antibiotika och läkemedel för att behandla magsår.

För att förebygga hjärtinfektion under operation: dosen varierar beroende på typ av operation. Andra läkemedel kan också ges samtidigt. Din läkare, apotekare eller sjuksköterska kan ge dig mer information.

Den maximala rekommenderade dosen är 6 g per dag.

Njurproblem

Om du har njurproblem kan dosen vara lägre än den vanliga dosen.

Om du tar mer Amoxicillin <name> än du borde

Om du har tagit för mycket av Amoxicillin <name>, kan tecken vara en orolig mage (känna sig illamående, kräkas eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket kan ses som grumlig urin, eller problem med att urinera. Tala med din läkare så snart som möjligt. Ta med medicinen för att visa läkaren.

Om du glömmer att ta Amoxicillin <name>

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

Ta inte nästa dos för tidigt, vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Hur länge ska du ta Amoxicillin <name>?

Fortsätt att ta Amoxicillin <name> så länge din läkare har sagt till dig, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att hjälpa till att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan de orsaka att infektionen kommer tillbaka. När du avslutar behandlingen, om du fortfarande känner dig dålig bör du gå tillbaka till läkaren.

Svampinfektion (en jästinfektion i fuktiga områden av kroppen som orsakar ömhet, klåda och vit flytning) kan utvecklas om Amoxicillin <name> används under lång tid. Om detta inträffar, informera din läkare.

Om du tar Amoxicillin <name> under lång tid kan din läkare utföra ytterligare tester för att kontrollera att dina njurar, lever och blod fungerar normalt.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna medicin, fråga din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Amoxicillin <name> och kontakta omedelbart en läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling: Följande är mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

allergiska reaktioner, tecknen kan inkludera: klåda eller utslag på huden, svullnad i ansikte, läppar, tunga, kropp eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och ibland har dödsfall inträffat

utslag eller små platta röda runda fläckar under hudytan eller blåmärken på huden. Detta beror på inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Det kan vara förknippat med ledvärk (artrit) och njurproblem

en fördröjd allergisk reaktion kan inträffa vanligtvis 7 till 12 dagar efter att ha tagit Amoxicillin <name>, några tecken inkluderar: utslag, feber, ledvärk och förstörade lymfkörtlar särskilt under armarna

en hudreaktion känd som 'erythema multiforme' där du kan utveckla: kliande rödaktiga lila fläckar på huden särskilt på handflatorna eller fotsulorna, 'nässelutslag'-liknande upphöjda svullna områden på huden, ömma områden på ytorna av munnen, ögonen och könsorganen. Du kan ha feber och vara mycket trött

andra allvarliga hudreaktioner kan inkludera: förändringar i hudens färg, knölar under huden, blåsor, pustler, fjällning, rodnad, smärta, klåda, fjällning. Dessa kan vara förknippade med feber, huvudvärk och kroppsvärk

influenسالiknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala blodprovsresultat (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzzymer) (Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

feber, frossa, ont i halsen eller andra tecken på en infektion, eller om du lätt får blåmärken. Dessa kan vara tecken på ett problem med dina blodceller

the Jarisch-Herxheimer-reaktionen som inträffar under behandling med Amoxicillin <name> för Lyme-sjukdom och orsakar feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag

inflammation i tjocktarmen (kolon) med diarré (ibland innehållande blod), smärta och feber

allvarliga leverbiverkningar kan förekomma. De är främst förknippade med personer som får behandling under en lång period, män och äldre. Du måste omedelbart informera din läkare om du får:

- o svår diarré med blödning
- o blåsor, rödnad eller blåmärken på huden
- o mörkare urin eller blekare avföring
- o gulning av huden eller ögonvitorna (gulsot). Se även anemi nedan som kan leda till gulsot.

Dessa kan inträffa när du tar medicinen eller upp till flera veckor efter.

Om något av ovanstående inträffar, sluta ta medicinen och kontakta din läkare omedelbart.

Ibland kan du få mindre allvarliga hudreaktioner såsom:

ett mildt kliande utslag (runda, rosa-röda fläckar), 'nässelutslags'-liknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är ovanligt (kan påverka upp till 1 av 100 personer).

Om du har något av dessa, prata med din läkare eftersom Amoxicillin <name> kan behöva avbrytas.

De andra möjliga biverkningarna är:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

- hudutslag
- illamående
- diarré.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

kräkningar.

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

torsk (en svampinfektion i slidan, munnen eller hudveck), du kan få behandling för torsk från din läkare eller apotekare

njurproblem

kramper (konvulsioner), ses hos patienter med höga doser eller med njurproblem

yrsel

hyperaktivitet

kristaller i urinen, vilket kan ses som grumlig urin, eller svårighet eller obehag vid urinering. Se till att du dricker mycket vätska för att minska risken för dessa symtom tänderna kan verka missfärgade, vanligtvis återgår de till normal färg vid borstning (detta har rapporterats hos barn)

tungan kan bli gul, brun eller svart och den kan få ett hårigt utseende

en överdriven nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en typ av anemi. Tecken inkluderar: trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulfärgning av huden och ögonvitorna

lågt antal vita blodkroppar

lågt antal celler involverade i blodkoagulation

blodet kan ta längre tid att koagulera än normalt. Du kan märka detta om du får näsblod eller skär dig.

Frekvens okänd
inflammation i hjärnhinnorna (aseptisk meningit)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra med mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur du förvarar Amoxicillin <namn>

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara inte över 25°C. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Använd inte denna medicin efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blisterförpackningen efter bokstäverna "EXP". Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Kasta inte bort några mediciner via avlopp eller hushållsavfall. Fråga din apotekare hur du ska kasta bort mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vad Amoxicillin <namn> innehåller

Den aktiva substansen i varje tablett är 1000 mg amoxicillin.

De övriga ingredienserna är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, krosprovidon, aspartam, jordgubbs arom. (Jordgubbs aromen innehåller: majs maltodextrin, trietylцитrat (E1505), aromämnen komponenter, propylenglykol (E1520) och bensenalkohol).

Hur Amoxicillin <name> ser ut och innehållet i förpackningen

Amoxicillin <name> 1000 mg tabletter

Tabletterna är vita eller benvita, 22,2 mm x 10 mm avlånga tabletter med en brytskåra på båda sidor.

Tabletterna är förpackade i blåsor av PVC/PVDC/Aluminium eller PVC/TE/PVDC/Aluminium.

Amoxicillin <name> 1000 mg tabletter är tillgängliga i förpackningar om 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 100 tabletter

Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vergunninghouder:

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Alexander Fleminglaan 1
2613 AX Delft Nederländerna

Tillverkare:

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13-14
13509 Berlin, Tyskland

HAUPT Pharma Latina S.r.L.
Strada Statale 156 Monti Lepini Km. 47,600
04100 Borgo S. Michele (Latina), Italien

Registrerad under:

RVG: 126429

Denna medicinska produkt är godkänd i EES-medlemsstaterna under följande namn:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2024.

Andra informationskällor

Detaljerad information om denna medicin finns på webbplatsen för MA/Agency.

Allmänna råd om användning av antibiotika

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De har ingen effekt mot infektioner orsakade av virus.

Ibland svarar inte en infektion orsakad av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna som orsakar infektionen är resistent mot antibiotikan som tas. Detta innebär att de kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikan.

Bakterier kan bli resistent mot antibiotika av många anledningar. Att använda antibiotika försiktigt kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistent mot dem.

När din läkare ordinerar en antibiotikakur är den avsedd att behandla endast din nuvarande sjukdom. Att följa följande råd kommer att hjälpa till att förhindra uppkomsten av resistent bakterier som kan göra att antibiotikan slutar fungera.

1. Det är mycket viktigt att du tar antibiotikan i rätt dos, vid rätt tidpunkter och under rätt antal dagar. Läs instruktionerna på etiketten och om du inte förstår något, be din läkare eller apotekare att förklara.
2. Du bör inte ta en antibiotika om den inte har ordinerats specifikt för dig och du bör endast använda den för att behandla den infektion som den ordinerades för.
3. Du bör inte ta antibiotika som har ordinerats för andra personer även om de hade en infektion som var liknande din.

4. Du bör inte ge antibiotika som ordinerats för dig till andra personer.
5. Om du har någon antibiotika kvar när du har tagit kuren enligt din läkares anvisningar bör du ta resten till ett apotek för lämplig avfallshantering.

Transtoyou