

Pakendi infoleht (PIL)

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amoksitsilliin 250 mg ja 500 mg kapslid

(Amoksitsilliin)

Lugege kogu seda infolehte hoolikalt enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad kui teil.

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on Amoksitsilliini kapslid ja milleks neid kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Amoksitsilliini kapslite võtmist
3. Kuidas Amoksitsilliini kapsleid võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Amoksitsilliini kapsleid säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave.

1. Mis on Amoksitsilliini kapslid ja milleks neid kasutatakse Mis on Amoksitsilliini kapsel

Amoksitsilliini 250 mg ja 500 mg kapslid on antibiootikum. Toimeaine on amoksitsilliin. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 'penitsilliinideks'.

Milleks kasutatakse Amoksitsilliini kapslit

Amoksitsilliini kapslit kasutatakse bakterite põhjustatud infektsioonide raviks keha erinevates osades.

Amoksitsilliini kapslit võib kasutada ka koos teiste ravimitega maohaavandite raviks.

2. Mida peate teadma enne Amoksitsilliini kapslite võtmist

Ärge võtke Amoksitsilliini kapslit:

kui olete allergiline amoksitsilliini, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon mõnele antibiootikumile. See võib hõlmata nahalöövet või näo või kurgu turset.

Ärge võtke Amoksitsilliini kapsleid, kui mõni ülaltoodust kehtib. Kui te pole kindel, pidage enne Amoksitsilliini kapslite võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne Amoksitsilliini kapsli võtmist, kui teil on:
näärmepealavik (palavik, kurguvalu, paistes näärmed ja äärmine väsimus)
neeruprobleemid
kui te ei urineeri regulaarselt.

Kui te pole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib teie kohta, pidage enne Amoksitsilliini kapslite võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui teil esineb:

Uriinianalüüsid (glükoos) või maksafunktsiooni vereanalüüsid

Östriool testid (kasutatakse raseduse ajal, et kontrollida, kas laps areneb normaalselt)

Öelge oma arstile või apteekrile, et te võtate Amoksitsilliini kapsleid. See on oluline, sest Amoksitsilliini kapslid võivad mõjutada nende testide tulemusi.

Teised ravimid ja Amoksitsilliini kapslid

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mingeid muid ravimeid.

Kui te võtate allopurinooli (kasutatakse podagra raviks) koos Amoksitsilliini kapslitega, on tõenäolisem, et teil tekib allergiline nahareaktsioon.

Kui te võtate probenetsiidi (kasutatakse podagra raviks), võib probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendada amoksitsilliini eritumist ja seda ei soovitata. Teie arst võib otsustada kohandada teie Amoksitsilliini kapslite annust.

Kui te võtate ravimeid, mis aitavad peatada verehüüvete teket (näiteks varfariin), võib teil olla vaja täiendavaid vereanalüüse.

Kui te võtate teisi antibiootikume (näiteks tetratsükliin), võivad Amoksitsilliini kapslid olla vähem efektiivsed.

Kui te võtate metotreksaati (kasutatakse vähi ja raske psoriaasi raviks), penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, põhjustades võimaliku kõrvaltoimete suurenemise.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, arvate, et võite olla rase või plaanite last saada, küsige enne selle ravimi võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Autojuhtimine ja masinate käsitlemine

Amoksitsilliini kapslid võivad põhjustada kõrvaltoimeid mõjud ja sümptomid (nagu allergilised reaktsioonid, pearinglus ja krambid) võivad muuta teid autojuhtimiseks sobimatuks.

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te ei tunne end hästi.

3. Kuidas võtta Amoksitsilliini kapsleid

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kui te pole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake alla veega, kapslit avamata.

Jagage annused päeva jooksul ühtlaselt, vähemalt 4-tunniste vahedega.

Soovitav annus on:

Lapsed, kes kaaluvad alla 40 kg

Kõik annused arvutatakse sõltuvalt lapse kehakaalust kilogrammides.

Teie arst annab teile nõu, kui palju Amoksitsilliini kapsleid peaksite oma beebile või lapsele andma.

Tavaline annus on 40 mg kuni 90 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta päevas, manustatuna kahes või kolmes jagatud annuses.

Maksimaalne soovitatav annus on 100 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta päevas.

Täiskasvanud, eakad patsiendid ja lapsed, kes kaaluvad 40 kg või rohkem

Tavaline Amoksitsilliini kapslite annus on 250 mg kuni 500 mg kolm korda päevas või 750 mg kuni 1 g iga 12 tunni järel, sõltuvalt infektsiooni raskusastmest ja tüübist.

Rasked infektsioonid: 750 mg kuni 1 g kolm korda päevas.

Kusetee infektsioon: 3 g kaks korda päevas ühe päeva jooksul.

Lyme'i tõbi (puukide levitatav infektsioon): Isoleeritud erüteem migrans (varajane staadium – punane või roosa ümmargune lööve): 4 g päevas, Süsteemsed ilmingud (hiline staadium – tõsisemate sümptomite korral või kui haigus levib kehas): kuni 6 g päevas.

Maohaavandid: üks 750 mg või üks 1 g annus kaks korda päevas 7 päeva jooksul koos teiste antibiootikumide ja ravimitega maohaavandite raviks.

Südameinfektsiooni ennetamiseks operatsiooni ajal: annus varieerub sõltuvalt operatsiooni tüübist. Samal ajal võib manustada ka teisi ravimeid. Teie arst, apteeker või õde võib teile anda rohkem teavet.

Maksimaalne soovitatav annus on 6 g päevas.

Neeruprobleemid

Kui teil on neeruprobleeme, võib annus olla tavalisest väiksem.

Kui te võtate rohkem Amoxicillin'i kapsleid kui peaksite

Kui olete võtnud liiga palju Amoxicillin'i kapsleid, võivad sümptomiteks olla seedehäired (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või kristallid uriinis, mis võivad ilmned häguse uriinina või urineerimisprobleemidena. Rääkige oma arstiga nii kiiresti kui võimalik. Võtke ravim kaasa, et arstile näidata.

Kui unustate Amoxicillin'i kapsleid võtta

Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui meelde tuleb.

Ärge võtke järgmist annust liiga vara, oodake umbes 4 tundi enne järgmise annuse võtmist.

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui kaua peaksite Amoxicillin'i kapsleid võtma?

Jätkake Amoxicillin'i kapslite võtmist nii kaua, kui arst on teile öelnud, isegi kui tunnete end paremini. Iga annus on vajalik infektsiooni vastu võitlemiseks. Kui mõned bakterid ellu jäävad, võivad need põhjustada infektsiooni tagasitulekut.

Kui olete ravi lõpetanud ja tunnete end endiselt halvasti, peaksite uuesti arsti juurde minema.

Soor (keha niiskete piirkondade pärmseeneinfektsioon, mis võib põhjustada valulikkust, sügelust ja valget eritist) võib tekkida, kui Amoxicillin'i kapsleid kasutatakse pikka aega. Kui see juhtub, rääkige oma arstiga.

Kui te võtate Amoxicillin'i kapsleid pikka aega, võib teie arst teha lisateste, et kontrollida, kas teie neerud, maks ja veri töötavad normaalselt.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Amoxicillin'i kapslite võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest – võite vajada kiiret arstiabi: Järgnevad on väga haruldased (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

allergilised reaktsioonid, mille tunnused võivad sisaldada: naha sügelus või lööve, näo, huulte, keele, keha turse või hingamisraskused. Need võivad olla tõsised ja aeg-ajalt on esinenud surmajuhtumeid

lööve või väikesed punased ümmargused laigud naha all või naha verevalumid. See on tingitud veresoonte seinte põletikust allergilise reaktsiooni tõttu. See võib olla seotud liigesevaluga (artriit) ja neeruprobleemidega

hilinenud allergiline reaktsioon võib tekkida tavaliselt 7 kuni 12 päeva pärast Amoksitsilliini kapslite võtmist, mõned tunnused hõlmavad: lööve, palavik, liigesevalud ja lümfisõlmede suurenemine, eriti kaenlaaluste all

nahareaktsioon, mida tuntakse kui 'multiformne erüteem', kus võib tekkida: sügelev punakasilla laigud nahal, eriti peopesadel või jalataldadel, 'nõgestõve-taolised' tõusnud tursunud alad nahal, valulikud alad suu, silmade ja suguelundite pinnal. Teil võib olla palavik ja olla väga väsinud

muud rasked nahareaktsioonid võivad sisaldada: naha värvusemuutused, muhud naha all, villid, pustulid, koorumine, punetus, valu, sügelus, ketendus. Need võivad olla seotud palaviku, peavalude ja kehavealudega

gripilaadsed sümptomid koos lööbe, palaviku, paistes näärmete ja ebanormaalsete vereanalüüside tulemustega (sealhulgas valgete vereliblede (eosinofiilia) ja maksaensüümide suurenemine) (Ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)).

kõrge palavik, külmavärinad, kurguvalu või muud infektsiooni tunnused või kui teil tekivad kergesti verevalumid. Need võivad olla märgid probleemist teie vererakkudega

the Jarisch-Herxheimeri reaktsioon, mis tekib Amoksitsilliini kapslitega ravi ajal Lyme'i tõve korral ja põhjustab palavikku, külmavärinaid, peavalu, lihasvalu ja nahalöövet. jämesoole (käärsoole) põletik koos kõhulahtisus (mõnikord sisaldab verd), valu ja palavik võivad tekkida tõsised maksakahjustused. Need on peamiselt seotud pikaajalise raviga, meestega ja eakatega. Te peate arstile kiiresti teatama, kui teil tekib:

- raske kõhulahtisus verejooksuga
- villid, naha punetus või verevalumid
- tumedam uriin või heledamad väljaheited
- naha või silmavalgete kollasus (ikterus). Vaadake ka aneemia allpool, mis võib põhjustada ikterust.

Need võivad tekkida ravimite võtmise ajal või kuni mitu nädalat pärast.

Kui midagi ülaltoodust juhtub, lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge kohe arsti poole.

Mõnikord võivad tekkida vähem tõsised nahareaktsioonid, näiteks:

keskmine sügelev lööve (ümmargused, roosakas-punased laigud), 'nõgestõve' sarnased tursunud alad käsivartel, jalgadel, peopesadel, kätel või jalgadel. See on harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st).

Kui teil on mõni neist, rääkige nendest oma arstile, kuna Amoxicillin kapslid tuleb lõpetada.

Muud võimalikud kõrvaltoimed on:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

nahalööve
iiveldus
kõhulahtisus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

oksendamine.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

soor (päriminfektsioon tupes, suus või nahavoltides), soori ravi saate oma arstilt või apteekrilt

neeruprobleemid

krambid, mida on täheldatud patsientidel, kes saavad suuri annuseid või kellel on neeruprobleemid

peapööritus

hüperaktiivsus

kristallid uriinis, mis võivad põhjustada ägedat neerukahjustust, mis võib avalduda häguse uriinina või urineerimisraskuste või -valuna. Joo kindlasti palju vedelikku, et vähendada nende sümptomite tekkimise võimalust

keel võib muutuda kollaseks, pruuniks või mustaks ja võib omandada karvase välimuse punaste vereliblede liigne lagunemine, mis põhjustab teatud tüüpi aneemia. Tunnused sisaldab: väsimus, peavalud, hingeldus, pearinglus, kahvatu ja kollakas nahk ning silmavalged

silma

madal valgevereliblede arv

madal vereliistakute arv

veri võib hüübida kauem kui tavaliselt. Võite seda märgata, kui teil on ninaverejooks või lõikate end.

Rindkerevalu allergiliste reaktsioonide kontekstis, mis võib olla allergiast põhjustatud südameinfarkti sümptom (Kounis sündroom)

Ravimist põhjustatud enterokoliidi sündroom (DIES): DIES on peamiselt teatatud lastel, kes saavad amoksitsilliini. See on teatud tüüpi allergiline reaktsioon, mille peamine sümptom on korduv oksendamine (1-4 tundi pärast ravimi manustamist). Edasised sümptomid võivad hõlmata kõhuvalu, letargiat, kõhulahtisust, ja madal vererõhk.

Lööve villidega, mis on paigutatud ringikujuliselt keskse koorikuga või nagu pärlikee (lineaarne IgA haigus)

Aju ja seljaaju ümbritsevate membraanide põletik (aseptiline meningiit)

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest otse teatada Kollase Kaardi skeemi kaudu, veebisait:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Kõrvaltoimetest teatades aitate anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta. Kuidas säilitada Amoksitsilliini kapsleid

5. Kuidas säilitada Amoksitsilliini kapsleid

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis temperatuuril alla 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate nähtavaid halvenemise märke.

Ärge visake ravimeid ära kanalisatsiooni või olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Amoksitsilliini kapslid sisaldavad

Toimeaine igas kapslis on 250 mg või 500 mg Amoksitsilliini trihüdraati.

Muud koostisosad on kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, päikeseloojangukollane E110, karmosine E122, briljantne sinine E133, kinoliinkollane E104, titaandioksiid E171, metüül parahüdroksübensoaat E218, propüül parahüdroksübensoaat E216, želatiin (TSE vaba) ja naatriumlaurüülsulfaat.

Milline Amoksitsilliini kapsel välja näeb ja pakendi sisu

Punane / Buff värvilised kapslid trükitud musta tindiga 'AMOX 250'.

Punane / Buff värviline kapslid trükitud musta tindiga 'AMOXY 500'.

Amoksiitsilliin 250 mg ja 500 mg on saadaval blisterpakendis ja plastmahutis.

Pakendi suurused:

Blister: 15, 21 kapslit (500 mg ja 250 mg jaoks) Plastmahuti: 100 ja 500 kapslit.

Kõiki pakendi suurusi ei pruugita turustada.

Müügiloa hoidja ja tootja BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Ühendkuningriik

Seda infolehte uuendati viimati 02/2023.

Üldised nõuanded antibiootikumide kasutamise kohta

Antibiootikume kasutatakse bakterite põhjustatud infektsioonide raviks. Neil ei ole mõju viiruste põhjustatud infektsioonide vastu.

Mõnikord ei allu bakterite põhjustatud infektsioon antibiootikumikuurile. Üks levinumaid põhjuseid on see, et infektsiooni põhjustavad bakterid on võetud antibiootikumi suhtes resistentsed. See tähendab, et nad suudavad ellu jääda ja isegi paljuneda vaatamata antibiootikumile.

Bakterid võivad muutuda antibiootikumide suhtes resistentseks mitmel põhjusel. Antibiootikumide ettevaatlik kasutamine võib aidata vähendada bakterite resistentsuse tekkimise tõenäosust.

Kui teie arst määrab antibiootikumikuuri, on see mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Järgmiste nõuannete järgimine aitab vältida resistentsete bakterite teket, mis võivad antibiootikumi toime peatada.

1. On väga oluline, et te võtaksite antibiootikumi õige annuse, õigel ajal ja õige arvu päevade jooksul. Lugege etiketi juhiseid ja kui te millestki aru ei saa, küsige oma arstilt või apteekrilt selgitust.
2. Te ei tohiks võtta antibiootikumi, kui see ei ole spetsiaalselt teile määratud, ja te peaksite seda kasutama ainult selle infektsiooni raviks, mille jaoks see määrati.
3. Te ei tohiks võtta antibiootikume, mis on välja kirjutatud teistele inimestele, isegi kui neil oli infektsioon, mis oli sarnane teie omaga.
4. Te ei tohiks anda antibiootikume, mis on teile välja kirjutatud, teistele inimestele.
5. Kui teil on pärast arsti juhiste järgi kuuri läbimist antibiootikume üle jäänud, peaksite ülejäänud viima apteeki nõuetekohaseks hävitamiseks.

Transtoyou