

Pakkausseloste (PIL)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Amoksisilliini 250 mg & 500 mg kapselit

(Amoksisilliini)

Lue kaikki tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, koska se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän sairautensa oireet ovat samat kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa. Katso kohta 4.

Mitä tämä seloste sisältää

1. Mitä Amoksisilliinikapselit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Amoksisilliinikapseleita
3. Miten Amoksisilliinikapseleita otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten Amoksisilliinikapseleita säilytetään
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

1. Mitä Amoksisilliinikapselit ovat ja mihin niitä käytetään Mitä Amoksisilliinikapseli on

Amoksisilliini 250 mg ja 500 mg kapselit on antibiootti. Vaikuttava aine on amoksisilliini. Tämä kuuluu lääkeryhmään nimeltä 'penisilliinit'.

Mihin Amoksisilliinikapselia käytetään

Amoksisilliinikapselia käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehon eri osissa. Amoksisilliinikapselia voidaan myös käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa mahahaavojen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Amoksisilliinikapseleita

Älä ota Amoksisilliinikapselia:

jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliinille tai jollekin tämän lääkkeen muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on koskaan ollut allerginen reaktio mihinkään antibioottiin. Tämä voi sisältää ihottuman tai kasvojen tai kurkun turvotuksen.

Älä ota Amoksisilliinikapseleita, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Amoksisilliinikapseleiden ottamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Amoksisilliinikapselin ottamista, jos sinulla on:

rauhaskuume (kuume, kurkkukipu, turvonneet rauhaset ja äärimmäinen väsymys)
munuaisongelmia
et virtsaa säännöllisesti.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Amoksisilliinikapseleiden ottamista.

Veri- ja virtsakokeet

Jos sinulla on:

Virtsatestit (glukoosi) tai maksan toimintakokeet

Oestrioli testit (käytetään raskauden aikana tarkistamaan, että vauva kehittyy normaalisti)

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, että käytät Amoksisilliinikapseleita. Tämä johtuu siitä, että Amoksisilliinikapselit voivat vaikuttaa näiden testien tuloksiin.

Muut lääkkeet ja Amoksisilliinikapselit

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät allopurinolia (käytetään kihtiin) Amoksisilliinikapseleiden kanssa, on todennäköisempää, että saat allergisen ihoreaktion.

Jos käytät probenesidiä (käytetään kihdin hoitoon), probenesidin samanaikainen käyttö voi vähentää amoksisilliinin erittymistä eikä sitä suositella. Lääkärisi saattaa päättää säätää Amoksisilliinikapseleiden annostasi.

Jos käytät lääkkeitä, jotka auttavat estämään verihyytymiä (kuten varfariini), saatat tarvita lisäverikokeita.

Jos käytät muita antibiootteja (kuten tetrasykliiniä), Amoksisilliinikapselit voivat olla vähemmän tehokkaita.

Jos käytät metotreksaattia (käytetään syövän ja vaikean psoriaasin hoitoon), penisilliinit voivat vähentää metotreksaatin erittymistä aiheuttaen mahdollisen sivuvaikutusten lisääntymisen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetat, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet vauvan hankkimista, kysy lääkäriltäsi tai apteekkariltasi neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Amoksisilliinikapselit voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia ja oireet (kuten allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) voivat tehdä sinut ajokelvottomaksi.

Älä aja tai käytä koneita, ellei sinulla ole hyvä olo.

3. Amoksisilliinikapseleiden ottaminen

Ota tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista lääkäriiltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele veden kanssa avaamatta kapselia.

Jaa annokset tasaisesti päivän aikana, vähintään 4 tunnin välein.

Suositteltu annos on:

Alle 40 kg painavat lapset

Kaikki annokset lasketaan lapsen painon mukaan kilogrammoina.

Lääkärisi neuvoo, kuinka paljon Amoksisilliinikapseleita sinun tulisi antaa vauvallesi tai lapsellesi.

Tavallinen annos on 40 mg - 90 mg kutakin painokiloa kohden päivässä, jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.

Suurin suositeltu annos on 100 mg kutakin painokiloa kohden päivässä.

Aikuiset, iäkkäät potilaat ja vähintään 40 kg painavat lapset

Tavallinen annos Amoksisilliinikapseleita on 250 mg - 500 mg kolme kertaa päivässä tai 750 mg - 1 g joka 12. tunti, riippuen infektion vakavuudesta ja tyypistä.

Vakavat infektiot: 750 mg - 1 g kolme kertaa päivässä.

Virtsatieinfektio: 3 g kahdesti päivässä yhden päivän ajan.

Lymen tauti (punkkien levittämä infektio): Eristynyt erythema migrans (varhainen vaihe – punainen tai vaaleanpunainen pyöreä ihottuma): 4 g päivässä, Systemiset ilmentymät (myöhäinen vaihe – vakavammat oireet tai kun tauti leviää kehossa): enintään 6 g päivässä.

Maha- ja pohjukaissuolihaavat: yksi 750 mg tai yksi 1 g annos kahdesti päivässä 7 päivän ajan muiden antibioottien ja mahahaavan hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.

Sydäninfektion ehkäisy leikkauksen aikana: annos vaihtelee leikkauksen tyypin mukaan.

Muita lääkkeitä voidaan antaa samanaikaisesti. Lääkärisi, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi antaa sinulle lisätietoja.

Suurin suositeltu annos on 6 g päivässä.

Munuaisten ongelmat

Jos sinulla on munuaisongelmia, annos saattaa olla pienempi kuin tavallinen annos.

Jos otat enemmän Amoksisilliinikapseleita kuin pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Amoksisilliinikapseleita, oireita voivat olla vatsavaivat (pahoinvointi, oksentelu tai ripuli) tai kiteet virtsassa, jotka voivat näkyä sameana virtsana tai virtsaamisongelmina. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Ota lääke mukaan näyttääksesi sen lääkärille.

Jos unohdat ottaa Amoksisilliinikapselin

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat.

Älä ota seuraavaa annosta liian pian, odota noin 4 tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Kuinka kauan sinun tulisi ottaa Amoksisilliinikapseleita?

Jatka Amoksisilliinikapseleiden ottamista niin kauan kuin lääkärisi on määrännyt, vaikka tuntisit olosi paremmaksi. Tarvitset jokaisen annoksen auttamaan infektion torjunnassa. Jos jotkut bakteerit selviävät, ne voivat aiheuttaa infektion uusiutumisen. Kun olet lopettanut hoidon, jos tunnet olosi edelleen huonoksi, sinun tulisi palata lääkärin vastaanotolle.

Hiivatulehdus (kostean kehon alueen hiivatulehdus, joka voi aiheuttaa arkuutta, kutinaa ja valkoista vuotoa) voi kehittyä, jos Amoksisilliinikapseleita käytetään pitkään. Jos näin tapahtuu, kerro lääkärillesi.

Jos käytät Amoksisilliinikapseleita pitkään, lääkärisi saattaa tehdä lisätutkimuksia tarkistaakseen, että munuaisesi, maksasi ja veresi toimivat normaalisti.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.

Lopeta Amoksisilliinikapseleiden käyttö ja hakeudu heti lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä hoitoa: Seuraavat ovat hyvin harvinaisia (voi vaikuttaa enintään 1 henkilöön 10 000:sta)

allergiset reaktiot, joiden merkit voivat sisältää: ihon kutina tai ihottuma, kasvojen, huulten, kielen, kehon turvotus tai hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla vakavia ja satunnaisesti kuolemantapauksia on esiintynyt ihottuma tai pienet litteät punaiset pyöreät täplät ihon pinnan alla tai mustelmat iholla. Tämä johtuu verisuonten seinämien tulehduksesta allergisen reaktion vuoksi. Se voi liittyä nivelkipuun (niveltulehdus) ja munuaisongelmiin viivästynyt allerginen reaktio voi esiintyä yleensä 7–12 päivää Amoksisilliinikapseleiden ottamisen jälkeen, joitakin merkkejä ovat: ihottumat, kuume, nivelkiput ja imusolmukkeiden suurentuminen erityisesti kainaloissa ihoreaktio, joka tunnetaan nimellä 'erythema multiforme', jossa voi kehittyä: kutiava punertavan violetti läiskiä iholla erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa, 'nokkosihottumatyypisiä' kohonneita turvonneita alueita iholla, arkoja alueita suun, silmien ja sukuelinten pinnoilla. Saatat saada kuumetta ja olla hyvin väsynyt muut vakavat ihoreaktiot voivat sisältää: muutoksia ihon värissä, kyhmyjä ihon alla, rakkuloita, märkärakkuloita, hilseilyä, punoitusta, kipua, kutinaa, hilseilyä. Nämä voivat liittyä kuumeeseen, päänsärkyyn ja kehon kipuihin flunssan kaltaisia oireita, joihin liittyy ihottuma, kuume, turvonneet rauhaset ja poikkeavat verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntyneet valkosolut (eosinofilia) ja maksaentsyymit) (Lääkeaineen aiheuttama reaktio eosinofilian ja systeemisten oireiden kanssa (DRESS)). korkea kuume, vilunväristykset, kurkkukipu tai muut infektion merkit, tai jos saat helposti mustelmia. Nämä voivat olla merkkejä ongelmasta verisoluissasi

the Jarisch-Herxheimer-reaktio, joka esiintyy Amoksisilliinikapseleiden käytön aikana Lymen taudin hoidossa ja aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa.

paksusuolen (kolonin) tulehdus, johon liittyy ripuli (joskus verta sisältävä), kipua ja kuume vakavia maksaan liittyviä haittavaikutuksia voi esiintyä. Ne liittyvät pääasiassa pitkäaikaiseen hoitoon, miehiin ja iäkkäisiin. Sinun on kerrottava lääkärille kiireellisesti, jos saat:

- vakava ripuli verenvuodolla
- rakkuloita, ihon punoitusta tai mustelmia
- tummempi virtsa tai vaaleammat ulosteet
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (keltatauti). Katso myös anemia alla, joka voi johtaa keltatautiin.

Nämä voivat tapahtua lääkityksen aikana tai jopa useita viikkoja sen jälkeen.

Jos jokin edellä mainituista tapahtuu, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Joskus voi esiintyä lievempiä ihoreaktioita, kuten:

keskikokoinen kutiava ihottuma (pyöreät, vaaleanpunaiset-punaiset läiskät), 'nokkosihottuman' kaltaisia turvonneita alueita käsivarsissa, jaloissa, kämmenissä, käsissä tai jaloissa. Tämä on harvinaista (saattaa vaikuttaa enintään 1 henkilöön 100:sta).

Jos sinulla on jokin näistä, keskustele näistä lääkärin kanssa lääkärillesi, sillä Amoksisilliinikapselit on lopetettava.

Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat:

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

ihottuma
pahoinvointi
ripuli.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)
oksentelu.

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

hiivatulehdus (hiivainfektio emättimessä, suussa tai ihopoimuissa), voit saada hoitoa hiivatulehdukseen lääkäriltäsi tai apteekista
munuaisongelmat

kouristukset, joita on havaittu potilailla, joilla on suuria annoksia tai munuaisongelmia
huimaus

yliaktiivisuus

kiteet virtsassa, mikä johtaa akuuttiin munuaisvaurioon, joka voi ilmetä sameana virtsana tai vaikeutena tai epämukavuutena virtsaamisessa. Varmista, että juot runsaasti nesteitä vähentääksesi näiden oireiden mahdollisuutta

kieli voi muuttua keltaiseksi, ruskeaksi tai mustaksi ja sillä voi olla karvainen ulkonäkö punasolujen liiallinen hajoaminen, joka aiheuttaa eräänlaista anemiaa. Oireet sisältää:

väsymys, päänsärky, hengenahdistus, huimaus, kalpeus ja ihon sekä silmänvalkuaisten keltaisuus

vähäinen määrä valkosoluja

vähäinen määrä verihyytymisessä mukana olevia soluja

veri voi hyytyä hitaammin kuin normaalisti. Saatat huomata tämän, jos saat nenäverenvuodon tai leikkaat itsesi.

Rintakipu allergisten reaktioiden yhteydessä, mikä voi olla oire allergian laukaisemasta sydäninfarktista (Kounis oireyhtymä)

Lääkeaineiden aiheuttama enterokoliittioireyhtymä (DIES): DIES on raportoitu pääasiassa lapsilla, jotka saavat amoksisilliinia. Se on tietynlainen allerginen reaktio, jonka pääasiallinen oire on toistuva oksentelu (1-4 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen). Muita oireita voivat olla vatsakipu, uneliaisuus, ripuli, ja matala verenpaine.

Rakkulainen ihottuma, joka on järjestäytynyt ympyrään keskusrappeutumisella tai kuin helminauha (lineaarinen IgA-tauti)

Aivoja ja selkäydintä ympäröivien kalvojen tulehdus (aseptinen aivokalvontulehdus)

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Yellow Card -järjestelmän kautta, verkkosivusto:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa antamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Amoksisilliinikapseleiden säilyttäminen

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyvissä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on merkitty pakkaukseen EXP-kohdan jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa alle 30 °C:ssa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä merkkejä huonontumisesta.

Älä hävitä lääkkeitä viemäriin jätevesi tai talousjätteisiin. Kysy apteekista, miten hävität lääkkeet, joita et enää käytä. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Amoksisilliinikapselit sisältävät

Vaikuttava aine on jokaisessa kapselissa 250 mg tai 500 mg amoksisilliinitrihydraattia.

Muut aineet ovat kroskarmellosoinatrium, magnesiumstearaatti, auringonlaskunkeltainen E110, karmosinipuna E122, briljantinsininen E133, kinoliininkeltainen E104, titaanidioksidi E171, metyyliiparahydroksibentsoatti E218, propyyliiparahydroksibentsoatti E218, Propyyli Mitä Amoksisilliinikapselit näyttävät ja pakkauksen sisältö Punainen / Buff

väriset

kapselit värillinen kapselit painettu mustalla musteella 'AMOXY 250'.

Punainen / Buff värillinen kapselit painettu mustalla musteella 'AMOXY 500'.

Amoksisilliini 250 mg ja 500 mg toimitetaan läpipainopakkauksessa ja muovisäiliössä.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 15, 21 kapselia (500 mg & 250 mg) Muovisäiliö: 100 & 500 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Yhdistynyt kuningaskunta

Tätä pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu 02/2023.

Yleisiä neuvoja antibioottien käytöstä

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin.

Joskus bakteerin aiheuttama infektio ei reagoi antibioottikuuriin. Yksi yleisimmistä syistä tähän on se, että infektiota aiheuttavat bakteerit ovat vastustuskykyisiä käytettävälle antibiootille. Tämä tarkoittaa, että ne voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootista huolimatta.

Bakteerit voivat tulla vastustuskykyisiksi antibiooteille monista syistä. Antibioottien huolellinen käyttö voi auttaa vähentämään bakteerien vastustuskyvyn kehittymistä.

Kun lääkärisi määrää antibioottikuurin, se on tarkoitettu vain nykyisen sairautesi hoitoon. Seuraavien ohjeiden noudattaminen auttaa estämään vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä, jotka voisivat estää antibiootin toiminnan.

1. On erittäin tärkeää, että otat antibiootin oikealla annoksella, oikeaan aikaan ja oikean määrän päiviä. Lue etiketin ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy lääkäriltäsi tai apteekkariltasi selitystä.
2. Sinun ei pitäisi ottaa antibioottia, ellei sitä ole määrätty erityisesti sinulle, ja sinun tulisi käyttää sitä vain siihen infektioon, johon se on määrätty.
3. Sinun ei pitäisi ottaa antibiootteja, jotka on määrätty muille ihmisille, vaikka heillä olisi ollut infektio, joka oli samankaltainen kuin sinun.
4. Sinun ei pitäisi antaa sinulle määrättyjä antibiootteja muille ihmisille.
5. Jos sinulle jää antibiootteja jäljelle, kun olet ottanut kuurin lääkärisi ohjeiden mukaisesti, sinun tulisi viedä loput apteekkiin asianmukaista hävittämistä varten.

Transtoyou