

Pakuotės lapelis (PIL)

Pakuotės lapelis: Informacija vartotojui
Amoksicilinas 250 mg ir 500 mg kapsulės
(Amoksicilinas)

Perskaitykite visą šį lapelį atidžiai prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija jums.

Laikykite šį lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.

Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas buvo paskirtas tik jums. Nepasidalinkite juo su kitais. Tai gali jiems pakenkti, net jei jų ligos požymiai yra tokie patys kaip jūsų.

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, kuris nėra išvardytas šiame lapelyje. Žr. 4 skyrių.

Kas yra šiame lapelyje

1. Kas yra Amoksicilino kapsulės ir kam jos vartojamos
2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Amoksicilino kapsules
3. Kaip vartoti Amoksicilino kapsules
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Amoksicilino kapsules
6. Pakuotės turinys ir kita informacija.

1. Kas yra Amoksicilino kapsulės ir kam jos vartojamos Kas yra Amoksicilino kapsulė

Amoksicilino 250 mg ir 500 mg kapsulės yra antibiotikas. Veiklioji medžiaga yra amoksicilinas. Tai priklauso vaistų grupei, vadinamai 'penicilinais'.

Kam vartojama Amoksicilino kapsulė

Amoksicilino kapsulė vartojama bakterijų sukeltoms infekcijoms įvairiose kūno vietose gydyti.

Amoksicilino kapsulė taip pat gali būti vartojama kartu su kitais vaistais skrandžio opoms gydyti.

2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Amoksicilino kapsules

Nevartokite Amoksicilino kapsulės:

jei esate alergiškas amoksicilinui, penicilinui ar bet kuriai kitai šio vaisto sudedamajai daliai (išvardytai 6 skyriuje)

jei kada nors turėjote alerginę reakciją į bet kurį antibiotiką. Tai gali būti odos bėrimas arba veido ar gerklės patinimas.

Nevartokite Amoksicilino kapsulių, jei bet kuris iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksicilino kapsules.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksicilino kapsulę, jei:
sergate liaukų karštine (karščiavimas, gerklės skausmas, patinę liaukos ir didelis nuovargis)
turite inkstų problemų
nešlapinatės reguliariai.

Jei nesate tikri, ar kuris nors iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Amoksicilino kapsules.

Kraujo ir šlapimo tyrimai

Jei Jums pasireiškia:

Šlapimo tyrimai (gliukozės) arba kraujo tyrimai kepenų funkcijai

Oestriolio tyrimai (naudojami nėštumo metu, siekiant patikrinti, ar kūdikis vystosi normaliai)

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, kad vartojate Amoksicilino kapsules. Taip yra todėl, kad Amoksicilino kapsulės gali paveikti šių tyrimų rezultatus.

Kiti vaistai ir Amoksicilino kapsulės

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate, neseniai vartojote ar galbūt vartosite kitus vaistus.

Jei vartojate alopurinolį (naudojamą podagrai gydyti) kartu su Amoksicilino kapsulėmis, gali būti didesnė tikimybė, kad pasireikš alerginė odos reakcija.

Jei vartojate probenecidą (naudojamą podagrai gydyti), kartu vartojant probenecidą gali sumažėti amoksicilino išsiskyrimas ir tai nerekomenduojama. Jūsų gydytojas gali nuspręsti koreguoti Amoksicilino kapsulių dozę.

Jei vartojate vaistus, padedančius sustabdyti kraujo krešulius (pvz., varfariną), gali prireikti papildomų kraujo tyrimų.

Jei vartojate kitus antibiotikus (pvz., tetracikliną), Amoksicilino kapsulės gali būti mažiau veiksmingos.

Jei vartojate metotreksatą (naudojamą vėžiui ir sunkiai psoriazei gydyti), penicilinai gali sumažinti metotreksato išsiskyrimą, sukeldami galimą šalutinių poveikių padidėjimą.

Nėštumas ir žindymas

Jei esate nėščia ar žindote kūdikį, manote, kad galite būti nėščia arba planuojate turėti kūdikį, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Amoksicilino kapsulės gali turėti šalutinį poveikį ir simptomai (tokie kaip alerginės reakcijos, galvos svaigimas ir traukuliai) gali padaryti jus netinkamai vairuoti.

Nevairuokite ir nedirbkite su mechanizmais, jei nesijaučiate gerai.

3. Kaip vartoti Amoksicilino kapsules

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nurykite su vandeniu neatidarydami kapsulės.
Dozės paskirstykite tolygiai per dieną, bent 4 valandų intervalais.

Rekomenduojama dozė yra:

Vaikai, sveriantys mažiau nei 40 kg

Visos dozės apskaičiuojamos pagal vaiko kūno svorį kilogramais.

Jūsų gydytojas patars, kiek Amoksicilino kapsulių turėtumėte duoti savo kūdikiui ar vaikui.
Įprasta dozė yra 40 mg iki 90 mg kiekvienam kūno svorio kilogramui per dieną, padalinta į dvi ar tris dalis.

Didžiausia rekomenduojama dozė yra 100 mg kiekvienam kūno svorio kilogramui per dieną.

Suaugusieji, senyvo amžiaus pacientai ir vaikai, sveriantys 40 kg ar daugiau

Įprasta Amoksicilino kapsulių dozė yra 250 mg iki 500 mg tris kartus per dieną arba 750 mg iki 1 g kas 12 valandų, priklausomai nuo infekcijos sunkumo ir tipo.

Sunkios infekcijos: 750 mg iki 1 g tris kartus per dieną.

Šlapimo takų infekcija: 3 g du kartus per dieną vieną dieną.

Laimo liga (infekcija, plintanti per parazitus, vadinamus erkėmis): Izoliuota eritema migrans (ankstyva stadija – raudonas arba rožinis apskritas bėrimas): 4 g per dieną, Sisteminės apraiškos (vėlyva stadija – rimtesni simptomai arba kai liga plinta po kūną): iki 6 g per dieną.
Skrandžio opos: viena 750 mg arba viena 1 g dozė du kartus per dieną 7 dienas su kitais antibiotikais ir vaistais skrandžio opoms gydyti.

Širdies infekcijos prevencijai operacijos metu: dozė skirsis priklausomai nuo operacijos tipo. Kiti vaistai taip pat gali būti skiriami tuo pačiu metu. Jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytoja gali suteikti daugiau informacijos.

Didžiausia rekomenduojama dozė yra 6 g per dieną.

Inkstų problemos

Jei turite inkstų problemų, dozė gali būti mažesnė nei įprasta dozė.

Jei išgersite daugiau Amoksicilino kapsulių nei turėtumėte

Jei išgėrėte per daug Amoksicilino kapsulių, požymiai gali būti skrandžio sutrikimas (pykinimas, vėmimas arba viduriavimas) arba kristalai šlapime, kurie gali pasireikšti kaip drumstas šlapimas arba šlapinimosi problemos. Kuo greičiau pasitarkite su gydytoju. Pasiimkite vaistus parodyti gydytojui.

Jei pamiršote išgerti Amoksicilino kapsules

Jei pamiršote išgerti dozę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite.

Negerkite kitos dozės per greitai, palaukite apie 4 valandas prieš kitą dozę.

Negerkite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Kiek laiko turėtumėte vartoti Amoksicilino kapsules?

Toliau vartokite Amoksicilino kapsules tiek laiko, kiek nurodė gydytojas, net jei jaučiatės geriau. Jums reikia kiekvienos dozės, kad padėtumėte kovoti su infekcija. Jei kai kurios bakterijos išgyvena, jos gali sukelti infekcijos atsinaujinimą.

Baigę gydymą, jei vis dar jaučiatės blogai, turėtumėte grįžti pas gydytoją.

Pienligė (kandidozė drėgnose kūno vietose, kuri gali sukelti skausmą, niežulį ir baltą išskyra) gali išsivystyti, jei Amoksicilino kapsulės vartojamos ilgą laiką. Jei taip atsitinka, pasakykite gydytojui.

Jei ilgai vartojate Amoksicilino kapsules, gydytojas gali atlikti papildomus tyrimus, kad patikrintų, ar jūsų inkstai, kepenys ir kraujas veikia normaliai.

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne visi jį patiria.

Nustokite vartoti Amoksicilino kapsules ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebėsite bet kurį iš šių rimtų šalutinių poveikių – jums gali prireikti skubios medicininės pagalbos: Šie atvejai yra labai reti (gali paveikti iki 1 iš 10 000 žmonių)

alerginės reakcijos, požymiai gali apimti: odos niežėjimas ar bėrimas, veido, lūpų, liežuvio, kūno patinimas arba kvėpavimo sunkumai. Tai gali būti rimta ir kartais pasitaikė mirčių bėrimas arba smulkūs plokšti raudoni apvalūs taškai po odos paviršiumi arba odos mėlynės. Tai atsiranda dėl kraujagyslių sienelių uždegimo dėl alerginės reakcijos. Tai gali būti susiję su sąnarių skausmu (artritu) ir inkstų problemomis

uždelsta alerginė reakcija gali pasireikšti paprastai po 7–12 dienų po Amoksicilino kapsulių vartojimo, kai kurie požymiai apima: bėrimus, karščiavimą, sąnarių skausmus ir limfmazgių padidėjimą, ypač po pažastimis

odos reakcija, žinoma kaip 'daugiaformė eritema', kurioje gali atsirasti: niežtintys raudonai purpuriniai dėmės ant odos, ypač ant delnų ar pėdų padų, 'dilgėlinės pavidalo' iškilusios patinusios vietos ant odos, jautrios vietos burnos, akių ir lytinių organų paviršiuose. Gali būti karščiavimas ir didelis nuovargis

kitos sunkios odos reakcijos gali apimti: odos spalvospokyčius, gumbelius po oda, pūsles, pustules, lupimąsi, paraudimą, skausmą, niežėjimą, pleiskanojimą. Tai gali būti susiję su karščiavimu, galvos skausmais ir kūno skausmais

gripo tipo simptomai su bėrimu, karščiavimu, patinusiomis liaukomis ir nenormaliais kraujo tyrimų rezultatais (įskaitant padidėjusius baltuosius kraujo kūnelius (eozinofiliją) ir kepenų fermentus) (Vaistų reakcija su eozinofilija ir sisteminiiais simptomais (DRESS)).

aukšta temperatūra (karščiavimas), šaltkrėtis, gerklės skausmas ar kiti infekcijos požymiai, arba jei lengvai atsiranda mėlynės. Tai gali būti jūsų kraujo ląstelių problemos požymiai the Jarisch-Herxheimer reakcija, kuri pasireiškia gydant Amoksicilino kapsulėmis nuo Laimo ligos ir sukelia karščiavimą, šaltkrėtį, galvos skausmą, raumenų skausmą ir odos bėrimą.

storosios žarnos (kolito) uždegimas su viduriavimas (kartais su krauju), skausmas ir karščiavimas

gali pasireikšti sunkus kepenų šalutinis poveikis. Jie dažniausiai susiję su ilgalaikiu gydymu, vyrais ir vyresnio amžiaus žmonėmis. Turite skubiai pranešti gydytojui, jei pasireiškia:

- sunkus viduriavimas su kraujavimu

- pūslelės, odos paraudimas ar mėlynės
- tamsesnis šlapimas arba šviesesnės išmatos
- odos ar akių baltymų pageltimas (gelta). Taip pat žiūrėkite anemija žemiau, kuri gali sukelti geltą.

Tai gali atsitikti vartojant vaistus arba iki kelių savaitių po to.

Jei kas nors iš aukščiau paminėtų simptomų pasireiškia, nustokite vartoti vaistą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Kartais gali pasireikšti mažiau sunkios odos reakcijos, tokios kaip:

vidutinio stiprumo niežtinis bėrimas (apvalios, rausvai raudonos dėmės), „dilgėlinės“ tipo patinimai ant dilbių, kojų, delnų, rankų ar pėdų. Tai yra nedažna (gali paveikti iki 1 iš 100 žmonių).

Jei turite bet kurį iš jų, pasitarkite savo gydytojui, nes Amoksicilino kapsules reikės nutraukti.

Kiti galimi šalutiniai poveikiai yra:

Dažni (gali pasireikšti iki 1 iš 10 žmonių)

odos bėrimas
pykinimas
viduriavimas.

Nedažni (gali pasireikšti iki 1 iš 100 žmonių)

vėmimas.

Labai reti (gali pasireikšti iki 1 iš 10 000 žmonių)

pienligė (mielių infekcija makštyje, burnoje ar odos raukšlėse), gydymą pienligei galite gauti iš savo gydytojo ar vaistininko

inkstų problemos

traukuliai (konvulsijos), pastebėti pacientams, vartojantiems dideles dozes arba turintiems inkstų problemų

galvos svaigimas

hiperaktyvumas

kristalai šlapime, sukeliantys ūminį inkstų pažeidimą, kuris gali pasireikšti kaip drumstas šlapimas arba sunkumas ar diskomfortas šlapinantis. Įsitinkite, kad geriate daug skysčių, kad sumažintumėte šių simptomų tikimybę

liežuvis gali pakeisti spalvą į geltoną, rudą ar juodą ir gali atrodyti plaukuotas

pernelyg didelis raudonųjų kraujo kūnelių irimas, sukeliantis tam tikrą anemiją. Požymiai

įskaitant: nuovargis, galvos skausmai, dusulys, galvos svaigimas, blyškumas ir odos bei akių baltymų pageltimas

mažas baltųjų kraujo kūnelių skaičius

mažas kraujo krešėjime dalyvaujančių ląstelių skaičius

kraujas gali krešėti ilgiau nei įprastai. Tai galite pastebėti, jei kraujuoja nosis arba įsipjaunate.

Krūtinės skausmas alerginių reakcijų kontekste, kuris gali būti alergijos sukeltos širdies infarkto simptomas (Kounis sindromas)

Vaistų sukeltas enterokolito sindromas (DIES): DIES dažniausiai buvo praneštas vaikams, vartojantiems amoksiciliną. Tai tam tikra alerginė reakcija, kurios pagrindinis simptomas yra pasikartojantis vėmimas (1-4 valandos po vaisto vartojimo). Kiti simptomai gali būti pilvo skausmas, letargija, viduriavimas, ir žemas kraujospūdis.

Bėrimas su pūslelėmis, išsidėsčiusiomis ratu su centriniu šašu arba kaip perlų vėrinys (linijinė IgA liga)

Smegenų ir nugaros smegenų dangalų uždegimas (aseptinis meningitas)

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, kuris nėra paminėtas šiame lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per Geltonosios kortelės schemą, svetainė:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Pranešdami apie šalutinį poveikį jūs galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Amoksicilino kapsules

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po EXP. Tinkamumo laikas nurodo paskutinę to mėnesio dieną.

Laikyti originalioje pakuotėje žemiau 30°C temperatūros.

Nenaudokite šio vaisto, jei pastebėjote matomų gedimo požymių.

Nesunaikinkite vaistų per nuotekas ar buitiniemis atliekomis. Paklauskite savo vaistininko, kaip išmesti vaistus, kurių nebevartojate. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija Ką sudaro Amoksicilino kapsulės

Veiklioji medžiaga kiekvienoje kapsulėje yra 250 mg arba 500 mg Amoksicilino trihidrato. Kitos sudedamosios dalys yra Kroskarmelozės natrio druska, Magnio stearatas, Saulėlydžio geltonasis E110, Karmosinas E122, Briliantinis mėlynas E133, Chinolino geltonasis E104, Titano dioksidas E171, Metilo parahidroksibenzoatas E218, Propilo parahidroksibenzoatas E216, Želatina (be TSE) ir Natrio laurilsulfatas.

Kaip atrodo Amoksicilino kapsulės ir pakuotės turinys

Raudonos / Smėlio spalvos kapsulės atspausdinta juodu rašalu „AMOXY 250“.

Raudona / Smėlio spalvos kapsulės atspausdinta juodu rašalu „AMOXY 500“.

Amoksicilinas 250 mg ir 500 mg tiekiamas lizdinėse plokštelėse ir plastikiniuose konteineriuose.

Pakuotės dydžiai:

Lizdinė plokštelė: 15, 21 kapsulė (500 mg ir 250 mg) Plastikinis konteineris: 100 ir 500 kapsulių.

Ne visos pakuotės dydžiai gali būti parduodami.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Jungtinė Karalystė

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 02/2023.

Bendri patarimai dėl antibiotikų vartojimo

Antibiotikai naudojami bakterijų sukeltoms infekcijoms gydyti. Jie neturi poveikio virusų sukeltoms infekcijoms.

Kartais bakterijų sukelta infekcija nereaguoja į antibiotikų kursą. Viena iš dažniausių priežasčių, kodėl taip nutinka, yra ta, kad bakterijos, sukeliančios infekciją, yra atsparios vartojamam antibiotikui. Tai reiškia, kad jos gali išgyventi ir net daugintis nepaisant antibiotiko.

Bakterijos gali tapti atsparios antibiotikams dėl daugelio priežasčių. Atsargus antibiotikų vartojimas gali padėti sumažinti tikimybę, kad bakterijos taps jiems atsparios.

Kai jūsų gydytojas paskiria antibiotikų kursą, jis skirtas tik jūsų dabartinei ligai gydyti. Laikydami šių patarimų padėsite išvengti atsparių bakterijų atsiradimo, kurios galėtų sustabdyti antibiotiko veikimą.

1. Labai svarbu, kad vartotumėte antibiotiką tinkama doze, tinkamu laiku ir tinkamą dienų skaičių. Perskaitykite instrukcijas ant etiketės ir jei ko nors nesuprantate, paprašykite gydytojo ar vaistininko paaiškinti.
2. Jūs neturėtumėte vartoti antibiotiko, nebent jis būtų specialiai jums paskirtas, ir turėtumėte jį naudoti tik tam infekcijai gydyti, kuriai jis buvo paskirtas.
3. Jūs neturėtumėte vartoti antibiotikų, kurie buvo paskirti kitiems žmonėms, net jei jie turėjo infekciją, kuri buvo panaši į jūsų.
4. Jūs neturėtumėte duoti antibiotikų, kurie buvo paskirti jums, kitiems žmonėms.
5. Jei jums liko antibiotikų, kai baigėte kursą, kaip nurodė jūsų gydytojas, turėtumėte likučius nunešti į vaistinę tinkamam utilizavimui.