

Bijsluiter (PIL)

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Amoxicilline 250mg & 500 mg Capsules
(Amoxicilline)

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet u hem nog een keer lezen.

Als u nog vragen heeft, vraag het uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als de uwe.

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Wat er in deze bijsluiter staat

1. Wat Amoxicilline capsules is en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Amoxicilline capsules inneemt
3. Hoe u Amoxicilline capsules moet innemen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Amoxicilline capsules
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. Wat Amoxicilline capsules is en waarvoor het wordt gebruikt

Amoxicilline 250 mg en 500 mg Capsules is een antibioticum. Het werkzame bestanddeel is amoxicilline. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die 'penicillines'.

Waarvoor Amoxicilline Capsule wordt gebruikt

Amoxicilline Capsule wordt gebruikt om infecties veroorzaakt door bacteriën in verschillende delen van het lichaam te behandelen.

Amoxicilline Capsule kan ook in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt om maagzweren te behandelen.

2. Wat u moet weten voordat u Amoxicilline capsules inneemt

Neem geen Amoxicilline capsule:

als u allergisch bent voor amoxicilline, penicilline of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6)

als u ooit een allergische reactie op een antibioticum heeft gehad. Dit kan een huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel omvatten.

Neem geen Amoxicilline Capsules als een van de bovenstaande op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline Capsules inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Praat met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline Capsule inneemt als u:
klierkoorts heeft (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid)
nierproblemen heeft
niet regelmatig plast.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline Capsules inneemt.

Bloed- en urinetests

Als u last heeft van:

- Urinetests (glucose) of bloedtests voor leverfunctie
- Oestriol tests (gebruikt tijdens de zwangerschap om te controleren of de baby zich normaal ontwikkelt)

Vertel uw arts of apotheker dat u Amoxicilline Capsule gebruikt. Dit komt omdat Amoxicilline Capsule de resultaten van deze tests kan beïnvloeden.

Andere geneesmiddelen en Amoxicilline Capsules

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken.

Als u allopurinol (gebruikt voor jicht) met Amoxicilline Capsules gebruikt, is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als u probenecide gebruikt (gebruikt om jicht te behandelen), kan gelijktijdig gebruik van probenecide de uitscheiding van amoxicilline verminderen en wordt het niet aanbevolen. Uw arts kan besluiten uw dosis Amoxicilline Capsules aan te passen.

Als u geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te helpen voorkomen (zoals warfarine), heeft u mogelijk extra bloedtests nodig.

Als u andere antibiotica gebruikt (zoals tetracycline) kunnen Amoxicilline Capsules minder effectief zijn.

Als u methotrexaat gebruikt (gebruikt om kanker en ernstige psoriasis te behandelen), penicillines kunnen de uitscheiding van methotrexaat verminderen, wat kan leiden tot een mogelijke toename van bijwerkingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een baby te krijgen, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijden en het gebruik van machines

Amoxicilline Capsules kunnen bijwerkingen hebben effecten en de symptomen (zoals allergische reacties, duizeligheid en convulsies) kunnen u ongeschikt maken om te rijden.

Rijd niet en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

3. Hoe Amoxicilline Capsules in te nemen

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Slik door met water zonder de capsule te openen.

Verdeel de doses gelijkmatig over de dag, met ten minste 4 uur ertussen.

De aanbevolen dosis is:

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Alle doses worden berekend op basis van het lichaamsgewicht van het kind in kilogrammen.

Uw arts zal u adviseren hoeveel Amoxicilline Capsules u aan uw baby of kind moet geven.

De gebruikelijke dosis is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee of drie doses.

De maximaal aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosis Amoxicilline Capsules is 250 mg tot 500 mg drie keer per dag of 750 mg tot 1 g elke 12 uur, afhankelijk van de ernst en het type infectie.

Ernstige infecties: 750 mg tot 1 g drie keer per dag.

Urinerweginfectie: 3 g tweemaal daags voor één dag.

Ziekte van Lyme (een infectie verspreid door parasieten genaamd teken): Geïsoleerd erythema migrans (vroeg fase – rode of roze cirkelvormige uitslag): 4 g per dag,

Systemische manifestaties (late fase – voor ernstigere symptomen of wanneer de ziekte zich door uw lichaam verspreidt): tot 6 g per dag.

Maagzweren: één dosis van 750 mg of 1 g tweemaal daags gedurende 7 dagen met andere antibiotica en medicijnen om maagzweren te behandelen.

Om hartinfectie tijdens een operatie te voorkomen: de dosis varieert afhankelijk van het type operatie. Andere medicijnen kunnen tegelijkertijd worden gegeven. Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u meer details geven.

De maximaal aanbevolen dosis is 6 g per dag.

Nierproblemen

Als u nierproblemen heeft, kan de dosis lager zijn dan de gebruikelijke dosis.

Als u meer Amoxicilline Capsules inneemt dan u zou moeten

Als u te veel Amoxicilline Capsules heeft ingenomen, kunnen de symptomen een van streek zijnde maag zijn (misselijkheid, overgeven of diarree) of kristallen in de urine, die als troebele urine kunnen verschijnen, of problemen met urineren. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Neem het medicijn mee om aan de arts te laten zien.

Als u vergeet Amoxicilline Capsules in te nemen

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u het zich herinnert.

Neem de volgende dosis niet te snel, wacht ongeveer 4 uur voordat u de volgende dosis inneemt.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoe lang moet u Amoxicilline Capsules innemen?

Blijf Amoxicilline Capsules innemen zolang uw arts u heeft verteld, zelfs als u zich beter voelt. U heeft elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën overleven kunnen ze ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Zodra u de behandeling heeft voltooid, als u zich nog steeds niet goed voelt, moet u teruggaan naar de arts.

Spruw (een schimmelinfectie van vochtige delen van het lichaam die pijn, jeuk en witte afscheiding kan veroorzaken) kan zich ontwikkelen als Amoxicilline Capsules langdurig wordt gebruikt. Als dit gebeurt, vertel het dan aan uw arts.

Als u Amoxicilline Capsules langdurig gebruikt, kan uw arts aanvullende tests uitvoeren om te controleren of uw nieren, lever en bloed normaal functioneren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit medicijn, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle medicijnen kan dit medicijn bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Stop met het innemen van Amoxicilline Capsules en raadpleeg onmiddellijk een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt – u heeft mogelijk dringende medische behandeling nodig: De volgende zijn zeer zeldzaam (kunnen tot 1 op de 10.000 mensen treffen)

allergische reacties, de tekenen kunnen inclusief: jeuk of uitslag op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong, het lichaam of ademhalingsmoeilijkheden. Deze kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden

uitslag of kleine platte rode ronde vlekken onder het huidoppervlak of blauwe plekken op de huid. Dit komt door ontsteking van de bloedvatwanden als gevolg van een allergische reactie. Het kan gepaard gaan met gewrichtspijn (arthritis) en nierproblemen

een vertraagde allergische reactie kan meestal 7 tot 12 dagen na inname van Amoxicilline Capsules optreden, enkele tekenen zijn: uitslag, koorts, gewrichtspijn en vergroting van de lymfeklieren, vooral onder de armen

een huidreactie bekend als 'erythema multiforme' waarbij u mogelijk ontwikkelt: jeukende roodachtig paarse vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of voetzolen, 'netelachtige' verheven gezwollen gebieden op de huid, gevoelige gebieden op de oppervlakken van de mond, ogen en geslachtsdelen. U kunt koorts hebben en erg moe zijn

andere ernstige huidreacties kunnen inclusief: veranderingen in huid kleur, bultjes onder de huid, blaarvorming, puisten, schilfering, roodheid, pijn, jeuk, schilfering. Deze kunnen gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en lichaamsspijnen

griepachtige symptomen met uitslag, koorts, gezwollen klieren en abnormale bloedtestresultaten (inclusief verhoogde witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen) (Geneesmiddelreactie met Eosinofilie en Systemische Symptomen (DRESS)).

hoge temperatuur (koorts), rillingen, een zere keel of andere tekenen van een infectie, of als u gemakkelijk blauwe plekken krijgt. Dit kunnen tekenen zijn van een probleem met uw bloedcellen

de Jarisch-Herxheimer-reactie die optreedt tijdens de behandeling met Amoxicilline Capsules voor de ziekte van Lyme en koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag veroorzaakt.

ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts ernstige leverbijwerkingen kunnen optreden. Ze worden voornamelijk geassocieerd met mensen die langdurig behandeld worden, mannen en ouderen. U moet dringend uw arts waarschuwen als u:

- ernstige diarree met bloedingen
- blaren, roodheid of blauwe plekken op de huid
- donkere urine of blekere ontlasting
- vergeling van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook bloedarmoede hieronder, wat kan resulteren in geelzucht.

Deze kunnen optreden tijdens het gebruik van de medicijnen of tot enkele weken daarna.

Als een van de bovenstaande zich voordoet, stop dan met het innemen van het medicijn en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Soms kunt u minder ernstige huidreacties krijgen zoals:

een middelmatige jeukende uitslag (ronde, roze-rode vlekken), 'netelroosachtige' gezwollen gebieden op onderarmen, benen, handpalmen, handen of voeten. Dit is ongewoon (kan tot 1 op de 100 mensen treffen).

Als u een van deze heeft, praat aan uw arts, aangezien Amoxicilline Capsules moeten worden gestopt.

De andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (kan bij maximaal 1 op de 10 mensen voorkomen)

huiduitslag
misselijkheid
diarree.

Soms (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen voorkomen)

braken.

Zeer zeldzaam (kan bij maximaal 1 op de 10.000 mensen voorkomen)

spruw (een schimmelinfectie van de vagina, mond of huidplooiën), u kunt behandeling voor spruw krijgen van uw arts of apotheker

nierproblemen

toevallen (convulsies), gezien bij patiënten met hoge doseringen of met nierproblemen

duizeligheid

hyperactiviteit

kristallen in de urine, leidend tot acute nierschade die kan worden gezien als troebele urine, of moeite of ongemak bij het plassen. Zorg ervoor dat u veel vocht drinkt om de kans op deze symptomen te verminderen

de tong kan geel, bruin of zwart worden en een harig uiterlijk krijgen
een overmatige afbraak van rode bloedcellen die een vorm van bloedarmoede. Tekenen inclusief: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, bleekheid en geelzucht van de huid en het oogwit
laag aantal witte bloedcellen
laag aantal cellen betrokken bij bloedstolling
het bloed kan langer nodig hebben om te stollen dan normaal. U kunt dit merken als u een bloedneus heeft of uzelf snijdt.
Pijn op de borst in de context van allergische reacties, wat een symptoom kan zijn van door allergie veroorzaakte hartinfarct (Kounis syndroom)
Door geneesmiddelen geïnduceerd enterocolitis syndroom (DIES): DIES is voornamelijk gemeld bij kinderen die amoxicilline krijgen. Het is een bepaald soort allergische reactie met als belangrijkste symptoom herhaaldelijk braken (1-4 uur na toediening van het geneesmiddel). Verdere symptomen kunnen buikpijn, lethargie, diarree, en lage bloeddruk omvatten.
Uitslag met blaren gerangschikt in een cirkel met centrale korstvorming of als een parelsnoer (lineaire IgA-ziekte)
Ontsteking van de membranen die de hersenen en het ruggenmerg omgeven (aseptische meningitis)

Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card Scheme, Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard. Door bijwerkingen te melden helpt u om meer informatie te verstrekken over de veiligheid van dit geneesmiddel. Hoe Amoxicilline Capsules te bewaren

5. Hoe Amoxicilline Capsules te bewaren

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar in de originele verpakking beneden 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van achteruitgang opmerkt.

Gooi geen geneesmiddelen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt, kunt weggoaien. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Wat Amoxicilline Capsules bevat

De werkzame stof is elke capsule bevat 250 mg of 500 mg Amoxicilline Trihydraat.

De andere ingrediënten zijn Croscarmellose Natrium, Magnesiumstearaat, Zonnegeel E110, Carmosine E122, Brilliant blue E133, Quinolinegeel E 104, Titaandioxide E171, Methyl parahydroxybenzoaat E218, Propyl parahydroxybenzoaat E216, Gelatine (TSE Vrij) en Natriumlaurylsulfaat.

Hoe Amoxicilline Capsules eruitzien en inhoud van de verpakking

Rood / Buff gekleurde capsules bedrukt met 'AMOXY 250' in zwarte inkt.

Rood / Buff gekleurd capsules bedrukt met 'AMOXY 500' in zwarte inkt.

Amoxicilline 250mg en 500mg worden geleverd in blisterverpakking en plastic container.

Verpakkingsgroottes:

Blister: 15, 21 capsules (voor 500 mg & 250 mg) Plastic container: 100 & 500 capsules.

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Vergunninghouder en fabrikant BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2023.

Algemeen advies over het gebruik van antibiotica

Antibiotica worden gebruikt om infecties veroorzaakt door bacteriën te behandelen. Ze hebben geen effect tegen infecties veroorzaakt door virussen.

Soms reageert een infectie veroorzaakt door bacteriën niet op een antibioticakuur. Een van de meest voorkomende redenen hiervoor is dat de bacteriën die de infectie veroorzaken resistent zijn tegen het antibioticum dat wordt ingenomen. Dit betekent dat ze kunnen overleven en zelfs vermenigvuldigen ondanks het antibioticum.

Bacteriën kunnen om vele redenen resistent worden tegen antibiotica. Zorgvuldig gebruik van antibiotica kan helpen de kans te verkleinen dat bacteriën resistent worden.

Wanneer uw arts een antibioticakuur voorschrijft, is deze bedoeld om alleen uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht besteden aan het volgende advies zal helpen voorkomen dat resistente bacteriën ontstaan die het antibioticum kunnen stoppen met werken.

1. Het is erg belangrijk dat u het antibioticum in de juiste dosering, op de juiste tijden en voor het juiste aantal dagen inneemt. Lees de instructies op het etiket en als u iets niet begrijpt, vraag uw arts of apotheker om uitleg.

2. U mag geen antibioticum innemen tenzij het specifiek voor u is voorgeschreven en u moet het alleen gebruiken om de infectie te behandelen waarvoor het is voorgeschreven.
3. U moet geen antibiotica innemen die aan andere mensen zijn voorgeschreven, zelfs niet als zij een infectie hadden die vergelijkbaar was met de uwe.
4. U moet geen antibiotica die aan u zijn voorgeschreven aan andere mensen geven.
5. Als u nog antibiotica over heeft nadat u de kuur volgens de aanwijzingen van uw arts heeft ingenomen, moet u de rest naar een apotheek brengen voor een juiste verwijdering.

Transtoyou