

Ulotka dołączona do opakowania (PIL)
Ulotka: Informacje dla pacjenta
Kapsułki Amoksylicyna 250 mg i 500 mg
(Amoksylicyna)

Przeczytaj całą tę ulotkę uważnie, zanim zaczniesz przyjmować ten lek, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

Zachowaj tę ulotkę. Może być konieczne, abyś przeczytał ją ponownie.

Jeśli masz jakiegokolwiek dalsze pytania, zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę.

Ten lek został przepisany wyłącznie Tobie. Nie przekazuj go innym osobom. Może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same jak Twoje.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Patrz punkt 4.

Co zawiera ta ulotka

1. Co to jest Amoksylicyna w kapsułkach i w jakim celu się ją stosuje
2. Informacje, które należy znać przed przyjęciem kapsułek Amoksylicyny
3. Jak przyjmować kapsułki Amoksylicyny
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać kapsułki Amoksylicyny
6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Czym są kapsułki Amoksylicyny i do czego są stosowane Czym jest kapsułka Amoksylicyny

Kapsułki Amoksylicyny 250 mg i 500 mg to antybiotyk. Substancją czynną jest amoksylicyna. Należy ona do grupy leków zwanych 'penicyliny'.

Do czego stosuje się kapsułki Amoksylicyny

Kapsułki Amoksylicyny stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie w różnych częściach ciała.

Kapsułki Amoksylicyny mogą być również stosowane w połączeniu z innymi lekami w leczeniu wrzodów żołądka.

2. Co musisz wiedzieć przed zażyciem kapsułek Amoksylicyny

Nie zażywaj kapsułek Amoksylicyny:

jeśli jesteś uczulony na amoksylicynę, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli kiedykolwiek wystąpiła u Ciebie reakcja alergiczna na jakikolwiek antybiotyk. Może to obejmować wysypkę skórą lub obrzęk twarzy lub gardła.

Nie zażywaj kapsułek Amoksycyliny, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie. Jeśli nie jesteś pewien, porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem kapsułek Amoksycyliny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem kapsułki Amoksycyliny, jeśli:

- masz mononukleozę zakaźną (gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne i skrajne zmęczenie)
- masz problemy z nerkami
- nie oddajesz moczu regularnie.

Jeśli nie jesteś pewien, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem kapsułek Amoksycyliny.

Badania krwi i moczu

Jeśli masz:

- Badania moczu (glukoza) lub badania krwi na funkcję wątroby
- Oestriol testy (stosowane w czasie ciąży do sprawdzania, czy dziecko rozwija się prawidłowo)

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, że przyjmujesz kapsułki Amoxicillin. Jest to ważne, ponieważ kapsułki Amoxicillin mogą wpływać na wyniki tych testów.

Inne leki i kapsułki Amoxicillin

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz, ostatnio przyjmowałeś lub możesz przyjmować inne leki.

Jeśli przyjmujesz allopurynol (stosowany w dniu moczanowej) z kapsułkami Amoxicillin, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej na skórze.

Jeśli przyjmujesz probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej), jednoczesne stosowanie probenecydu może zmniejszyć wydalanie amoksycyliny i nie jest zalecane. Twój lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki kapsułek Amoxicillin.

Jeśli przyjmujesz leki pomagające zapobiegać zakrzepom krwi (takie jak warfaryna), możesz potrzebować dodatkowych badań krwi.

Jeśli przyjmujesz inne antybiotyki (takie jak tetracyklina), kapsułki Amoxicillin mogą być mniej skuteczne.

Jeśli przyjmujesz metotreksat (stosowany w leczeniu raka i ciężkiej łuszczycy), penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, co może prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, podejrzewasz, że jesteś w ciąży lub planujesz mieć dziecko, zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę o poradę przed przyjęciem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Kapsułki Amoxicillin mogą mieć działania niepożądane i objawy (takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki) mogą sprawić, że nie będziesz zdolny do prowadzenia pojazdów.

Nie prowadź pojazdów ani nie obsługuj maszyn, jeśli nie czujesz się dobrze.

3. Jak przyjmować kapsułki Amoksycyliny

Zawsze przyjmuj ten lek dokładnie tak, jak zalecił ci lekarz lub farmaceuta. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie jesteś pewien.

Połknij z wodą, nie otwierając kapsułki.

Rozdziel dawki równomiernie w ciągu dnia, co najmniej 4 godziny odstępu.

Zalecana dawka to:

Dzieci ważące mniej niż 40 kg

Wszystkie dawki są obliczane w zależności od masy ciała dziecka w kilogramach.

Lekarz doradzi ci, ile kapsułek Amoksycyliny powinieneś podać swojemu dziecku.

Zwykle stosowana dawka to 40 mg do 90 mg na każdy kilogram masy ciała dziennie, podawana w dwóch lub trzech podzielonych dawkach.

Maksymalna zalecana dawka to 100 mg na każdy kilogram masy ciała dziennie.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci ważące 40 kg lub więcej

Zwykle stosowana dawka kapsułek Amoksycyliny to 250 mg do 500 mg trzy razy dziennie lub 750 mg do 1 g co 12 godzin, w zależności od ciężkości i rodzaju infekcji.

Ciężkie infekcje: 750 mg do 1 g trzy razy dziennie.

Zakażenie dróg moczowych: 3 g dwa razy dziennie przez jeden dzień.

Borelioza (infekcja przenoszona przez pasożyty zwane kleszczami): Izolowany rumień wędrujący (wczesny etap – czerwony lub różowy okrągły wysypka): 4 g dziennie,

Manifestacje systemowe (późny etap – dla poważniejszych objawów lub gdy choroba rozprzestrzenia się po ciele): do 6 g dziennie.

Wrzody żołądka: jedna dawka 750 mg lub 1 g dwa razy dziennie przez 7 dni z innymi antybiotykami i lekami do leczenia wrzodów żołądka.

Aby zapobiec infekcji serca podczas operacji: dawka będzie się różnić w zależności od rodzaju operacji. Mogą być również podawane inne leki w tym samym czasie. Twój lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka mogą udzielić ci więcej szczegółów.

Maksymalna zalecana dawka to 6 g na dzień.

Problemy z nerkami

Jeśli masz problemy z nerkami, dawka może być niższa niż zwykle.

Jeśli zażyjesz więcej kapsułek Amoksycyliny niż powinieneś

Jeśli zażyłeś zbyt dużo kapsułek Amoksycyliny, objawy mogą obejmować rozstrój żołądka (nudności, wymioty lub biegunka) lub kryształ w moczu, które mogą być widoczne jako mętny mocz lub problemy z oddawaniem moczu. Skontaktuj się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe. Weź lek, aby pokazać lekarzowi.

Jeśli zapomnisz zażyć kapsułki Amoksycyliny

Jeśli zapomnisz zażyć dawkę, zażyj ją, gdy tylko sobie przypomnisz.

Nie zażywaj kolejnej dawki zbyt szybko, odczekaj około 4 godzin przed zażyciem kolejnej dawki.

Nie zażywaj podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Jak długo powinieneś zażywać kapsułki Amoksycyliny?

Kontynuuj zażywanie kapsułek Amoksycyliny tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli poczujesz się lepiej. Potrzebujesz każdej dawki, aby pomóc zwalczyć infekcję. Jeśli niektóre bakterie przetrwają, mogą spowodować nawrót infekcji.

Po zakończeniu leczenia, jeśli nadal czujesz się źle, powinieneś ponownie udać się do lekarza.

Drożdżycza (infekcja drożdżakowa wilgotnych obszarów ciała, która może powodować ból, swędzenie i białą wydzielinę) może się rozwinąć, jeśli kapsułki Amoksycyliny są stosowane przez długi czas. Jeśli to nastąpi, powiedz lekarzowi.

Jeśli zażywasz kapsułki Amoksycyliny przez długi czas, lekarz może przeprowadzić dodatkowe badania, aby sprawdzić, czy twoje nerki, wątroba i krew działają prawidłowo.

Jeśli masz jakiegokolwiek dalsze pytania dotyczące stosowania tego leku, zapytaj lekarza lub farmaceutę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak wszystkie leki, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przestań zażywać kapsułki Amoksycyliny i natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych – możesz potrzebować pilnej pomocy medycznej: Następujące są bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

reakcje alergiczne, objawy mogą obejmować: swędzenie skóry lub wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka, ciała lub trudności w oddychaniu. Mogą być poważne i czasami dochodziło do zgonów

wysypka lub drobne płaskie czerwone okrągłe plamki pod powierzchnią skóry lub siniaki na skórze. Jest to spowodowane zapaleniem ścian naczyń krwionośnych w wyniku reakcji alergicznej. Może być związane z bólem stawów (zapalenie stawów) i problemami z nerkami

opóźniona reakcja alergiczna może wystąpić zwykle 7 do 12 dni po zażyciu kapsułek Amoksycyliny, niektóre objawy to: wysypki, gorączka, bóle stawów i powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza pod pachami

reakcja skórna znana jako 'rumień wielopostaciowy', gdzie możesz rozwinąć: swędzące czerwono-fioletowe plamy na skórze, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp, obrzęknięte jak 'podniesiony inne ciężkie reakcje skórne mogą

obejmować: zmiany koloru skóry, zmiany skórne, wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, ból gardła lub inne objawy infekcji, lub jeśli łatwo się siniaczą. Mogą to być objawy problemu z krwinkami

objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększonymi węzłami chłonnyymi i nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększona liczba białych krwinek (eozynofilia) i enzymów wątrobowych) (reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)).

wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, ból gardła lub inne objawy infekcji, lub jeśli łatwo się siniaczą. Mogą to być objawy problemu z komórkami krwi

the Jarisch-Reakcja Herxheimera, która występuje podczas leczenia kapsułkami amoksycyliny w przypadku boreliozy i powoduje gorączkę, dreszcze, ból głowy, ból mięśni i wysypkę skórą.

zapalenie jelita grubego (okreźnicy) z biegunką (czasami zawierającą krew), bólem i gorączką

mogą wystąpić poważne działania niepożądane dotyczące wątroby. Są one głównie związane z osobami poddawanyymi leczeniu przez długi czas, mężczyznami i osobami starszymi. Należy pilnie poinformować lekarza, jeśli wystąpi:

- ciężka biegunka z krwawieniem
- pęcherze, zaczerwienienie lub siniaki na skórze
- ciemniejszy mocz lub jaśniejsze stolce
- zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczką). Zobacz także niedokrwistość poniżej, która może prowadzić do żółtaczki.

Mogą one wystąpić podczas przyjmowania leków lub do kilku tygodni po.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Czasami mogą wystąpić mniej poważne reakcje skórne, takie jak:

środkowa swędząca wysypka (okrągłe, różowo-czerwone plamy), obrzęknięte obszary przypominające pokrzywkę na przedramionach, nogach, dłoniach, rękach lub stopach. Jest to rzadkie (może dotyczyć do 1 na 100 osób).

Jeśli masz którykolwiek z tych objawów, porozmawiaj do lekarza, ponieważ kapsułki Amoksycyliny będą musiały zostać przerwane.

Inne możliwe działania niepożądane to:

Częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób)

wysypka skórna

nudności

biegunka.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób)

wymioty.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób)

drożdżycy (infekcja drożdżakowa pochwy, jamy ustnej lub fałdów skórnych), leczenie drożdżycy można uzyskać od lekarza lub farmaceuty

problemy z nerkami

drgawki, obserwowane u pacjentów przyjmujących wysokie dawki lub z problemami z nerkami

zawroty głowy

nadpobudliwość

kryształ w moczu, prowadzące do ostrego uszkodzenia nerek, co może objawiać się mętnym moczem lub trudnościami lub dyskomfortem przy oddawaniu moczu. Upewnij się, że pijesz dużo płynów, aby zmniejszyć szanse na wystąpienie tych objawów
język może zmienić kolor na żółty, brązowy lub czarny i może mieć włochaty wygląd
nadmierne rozpadanie się czerwonych krwinek powodujące formę anemii. Objawy zawiera: zmęczenie, bóle głowy, duszność, zawroty głowy, bladość i zażółcenie skóry oraz białek oczu

niska liczba białych krwinek

niska liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

krwawienie może trwać dłużej niż normalnie. Możesz to zauważyć, jeśli masz krwawienie z nosa lub skaleczysz się.

Ból w klatce piersiowej w kontekście reakcji alergicznych, który może być objawem zawału serca wywołanego alergią (Kounis zespół)

Zespół enterokolitis wywołany lekami (DIES): DIES zgłaszano głównie u dzieci otrzymujących amoksycylinę. Jest to pewien rodzaj reakcji alergicznej z głównym objawem w postaci powtarzających się wymiotów (1-4 godziny po podaniu leku). Dalsze objawy mogą obejmować ból brzucha, letarg, biegunka, i niskie ciśnienie krwi.

Wysypka z pęcherzami ułożonymi w kółko z centralnym strupem lub jak sznur pereł (choroba IgA liniowa)

Zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (aseptyczne zapalenie opon mózgowych)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również wszelkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio za pośrednictwem systemu Yellow Card, strona internetowa:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Zgłaszając działania niepożądane możesz pomóc dostarczyć więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. Jak przechowywać kapsułki amoksycyliny

5. Jak przechowywać kapsułki amoksycyliny

Przechowywać ten lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważysz widoczne oznaki pogorszenia jakości.

Nie wyrzucać leków do ścieków ani odpadów domowych. Zapytaj farmaceutę, jak pozbyć się leków, których już nie używasz. Te środki pomogą chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawierają kapsułki Amoksycyliny

Substancją czynną w każdej kapsułce jest 250 mg lub 500 mg amoksycyliny trójwodnej. Pozostałe składniki to kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu, żółcień pomarańczowa E110, karmosyna E122, błękit brylantowy E133, żółcień chinolinowa E104, dwutlenek tytanu E171, metyl parahydroksybenzoesan E218, propyl parahydroksybenzoesan E216, żelatyna (wolna od TSE) i laurylosiarczan sodu.

Jak wyglądają kapsułki Amoksycyliny i zawartość opakowania

Czerwone / beżowe kolorowe kapsułki nadrukowane „AMOXY 250” czarnym tuszem.
Czerwony / Beżowy kolorowe kapsułki nadrukowane „AMOXY 500” czarnym tuszem.

Amoksycyлина 250 mg i 500 mg są dostarczane w blistrach i plastikowych pojemnikach.

Rozmiary opakowań:

Blister: 15, 21 kapsułek (dla 500 mg i 250 mg) Plastikowy pojemnik: 100 i 500 kapsułek.

Nie wszystkie rozmiary opakowań mogą być wprowadzone na rynek.

Podmiot odpowiedzialny i producent BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Wielka Brytania

Ulotka została ostatnio zaktualizowana w 02/2023.

Ogólne porady dotyczące stosowania antybiotyków

Antybiotyki są stosowane w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie. Nie mają wpływu na infekcje wywołane przez wirusy.

Czasami infekcja wywołana przez bakterie nie reaguje na kurację antybiotykiem. Jednym z najczęstszych powodów tego jest oporność bakterii wywołujących infekcję na stosowany antybiotyk. Oznacza to, że mogą one przetrwać, a nawet się rozmnażać pomimo obecności antybiotyku.

Bakterie mogą stać się odporne na antybiotyki z wielu powodów. Ostrożne stosowanie antybiotyków może pomóc zmniejszyć ryzyko, że bakterie staną się na nie odporne.

Kiedy lekarz przepisuje kurację antybiotykiem, ma ona na celu leczenie tylko obecnej choroby. Zwracanie uwagi na poniższe porady pomoże zapobiec pojawieniu się opornych bakterii, które mogłyby uniemożliwić działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest, aby przyjmować antybiotyk w odpowiedniej dawce, o odpowiednich porach i przez odpowiednią liczbę dni. Przeczytaj instrukcje na etykiecie, a jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.
2. Nie powinieneś przyjmować antybiotyku, chyba że został on przepisany specjalnie dla Ciebie i powinieneś go używać tylko do leczenia infekcji, na którą został przepisany.
3. Nie powinieneś przyjmować antybiotyków przepisanych innym osobom, nawet jeśli miały one infekcję, która była podobna do twojej.
4. Nie powinieneś dawać antybiotyków przepisanych tobie innym osobom.
5. Jeśli po zakończeniu kuracji zgodnie z zaleceniami lekarza pozostaną ci jakieś antybiotyki, powinieneś zanieść je do apteki w celu odpowiedniej utylizacji.