

Folheto Informativo (PIL)

Folheto informativo: Informação para o utilizador
Cápsulas de Amoxicilina 250mg & 500 mg
(Amoxicilina)

Leia todo este folheto cuidadosamente antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informações importantes para si.

Guarde este folheto. Pode ser necessário lê-lo novamente.

Se tiver mais perguntas, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para outros. Pode prejudicá-los, mesmo que os sinais da doença sejam os mesmos que os seus.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isto inclui quaisquer possíveis efeitos secundários não listados neste folheto. Veja a secção 4.

O que está neste folheto

1. O que é a Amoxicilina cápsulas e para que é utilizada
2. O que precisa de saber antes de tomar Amoxicilina cápsulas
3. Como tomar Amoxicilina cápsulas
4. Possíveis efeitos secundários
5. Como armazenar Amoxicilina cápsulas
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

1. O que é a cápsula de Amoxicilina e para que é utilizada

As cápsulas de Amoxicilina 250 mg e 500 mg são um antibiótico. O ingrediente ativo é a amoxicilina. Isto pertence a um grupo de medicamentos chamados 'penicilinas'.

Para que é utilizada a cápsula de Amoxicilina

A cápsula de Amoxicilina é usada para tratar infecções causadas por bactérias em diferentes partes do corpo.

A cápsula de Amoxicilina também pode ser usada em combinação com outros medicamentos para tratar úlceras estomacais.

2. O que você precisa saber antes de tomar cápsulas de Amoxicilina

Não tome a cápsula de Amoxicilina:

se você é alérgico à amoxicilina, penicilina ou a qualquer outro ingrediente deste medicamento (listado na seção 6)

se você já teve uma reação alérgica a qualquer antibiótico. Isso pode incluir uma erupção cutânea ou inchaço do rosto ou garganta.

Não tome cápsulas de Amoxicilina se qualquer uma das condições acima se aplicar. Se você não tiver certeza, fale com seu médico ou farmacêutico antes de tomar cápsulas de Amoxicilina.

Advertências e Precauções

Fale com seu médico ou farmacêutico antes de tomar a cápsula de Amoxicilina se você:
tem febre glandular (febre, dor de garganta, glândulas inchadas e cansaço extremo)
tem problemas renais
não está urinando regularmente.

Se você não tiver certeza se alguma das condições acima se aplica a você, fale com seu médico ou farmacêutico antes de tomar cápsulas de Amoxicilina.

Exames de sangue e urina

Se você estiver tendo:

Testes de urina (glicose) ou exames de sangue para função hepática

Oestriol testes (usados durante a gravidez para verificar se o bebê está se desenvolvendo normalmente)

Informe ao seu médico ou farmacêutico que você está tomando Cápsula de Amoxicilina. Isso porque a Cápsula de Amoxicilina pode afetar os resultados desses testes.

Outros medicamentos e Cápsulas de Amoxicilina

Informe ao seu médico ou farmacêutico se você está tomando, tomou recentemente ou pode tomar qualquer outro medicamento.

Se você estiver tomando alopurinol (usado para gota) com Cápsulas de Amoxicilina, é mais provável que você tenha uma reação alérgica na pele.

Se você estiver tomando probenecida, (usada para tratar gota), o uso concomitante de probenecida pode reduzir a excreção de amoxicilina e não é recomendado. Seu médico pode decidir ajustar sua dose de Cápsulas de Amoxicilina.

Se você estiver tomando medicamentos para ajudar a parar coágulos sanguíneos (como varfarina), pode ser necessário fazer exames de sangue adicionais.

Se você estiver tomando outros antibióticos (como tetraciclina), as Cápsulas de Amoxicilina podem ser menos eficazes.

Se você estiver tomando metotrexato (usado para tratar câncer e psoríase severa), penicilinas podem reduzir a excreção de metotrexato, causando um aumento potencial nos efeitos colaterais.

Gravidez e amamentação

Se você está grávida ou amamentando, acha que pode estar grávida ou está planejando ter um bebê, peça aconselhamento ao seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e uso de máquinas

Cápsulas de Amoxicilina podem ter efeitos colaterais e os sintomas (como reações alérgicas, tontura e convulsões) podem torná-lo inapto para dirigir.

Não conduza ou opere máquinas a menos que se sinta bem.

3. Como tomar Cápsulas de Amoxicilina

Tome sempre este medicamento exatamente como seu médico ou farmacêutico lhe disse. Consulte seu médico ou farmacêutico se não tiver certeza.

Engula com água sem abrir a cápsula.

Espaçar as doses uniformemente durante o dia, com pelo menos 4 horas de intervalo.

A dose recomendada é:

Crianças com peso inferior a 40 kg

Todas as doses são calculadas com base no peso corporal da criança em quilogramas.

Seu médico irá aconselhá-lo sobre quanto de Cápsulas de Amoxicilina você deve dar ao seu bebê ou criança.

A dose usual é de 40 mg a 90 mg por quilograma de peso corporal por dia, administrada em duas ou três doses divididas.

A dose máxima recomendada é de 100 mg por quilograma de peso corporal por dia.

Adultos, pacientes idosos e crianças com peso de 40 kg ou mais

A dose usual de Cápsulas de Amoxicilina é de 250 mg a 500 mg três vezes ao dia ou 750 mg a 1 g a cada 12 horas, dependendo da gravidade e do tipo de infecção.

Infecções graves: 750 mg a 1 g três vezes ao dia.

Infecção do trato urinário: 3 g duas vezes ao dia por um dia.

Doença de Lyme (uma infecção transmitida por parasitas chamados carrapatos): Eritema migrans isolado (estágio inicial – erupção circular vermelha ou rosa): 4 g por dia,

Manifestações sistêmicas (estágio tardio – para sintomas mais graves ou quando a doença se espalha pelo corpo): até 6 g por dia.

Úlceras estomacais: uma dose de 750 mg ou 1 g duas vezes ao dia por 7 dias com outros antibióticos e medicamentos para tratar úlceras estomacais.

Para prevenir infecção cardíaca durante a cirurgia: a dose variará de acordo com o tipo de cirurgia. Outros medicamentos também podem ser administrados ao mesmo tempo. Seu médico, farmacêutico ou enfermeiro pode lhe dar mais detalhes.

A dose máxima recomendada é de 6 g por dia.

Problemas renais

Se você tiver problemas renais, a dose pode ser menor do que a dose usual.

Se você tomar mais Cápsulas de Amoxicilina do que deveria

Se você tomou muitas Cápsulas de Amoxicilina, os sinais podem ser um estômago irritado (sentir-se mal, vomitar ou diarreia) ou cristais na urina, que podem ser vistos como urina turva, ou problemas ao urinar. Fale com seu médico o mais rápido possível. Leve o medicamento para mostrar ao médico.

Se você esquecer de tomar Cápsulas de Amoxicilina

Se você esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar.

Não tome a próxima dose muito cedo, espere cerca de 4 horas antes de tomar a próxima dose.

Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Por quanto tempo você deve tomar Cápsulas de Amoxicilina?

Continue tomando Cápsulas de Amoxicilina pelo tempo que seu médico lhe indicou, mesmo que você se sinta melhor. Você precisa de cada dose para ajudar a combater a infecção. Se algumas bactérias sobreviverem elas podem fazer a infecção voltar. Uma vez que você termine o tratamento, se ainda se sentir mal, deve voltar a ver o médico.

Candidíase (uma infecção por fungos em áreas úmidas do corpo que pode causar dor, coceira e secreção branca) pode se desenvolver se Cápsulas de Amoxicilina for usada por muito tempo. Se isso ocorrer, informe seu médico.

Se você tomar Cápsulas de Amoxicilina por um longo tempo, seu médico pode realizar testes adicionais para verificar se seus rins, fígado e sangue estão funcionando normalmente.

Se você tiver mais perguntas sobre o uso deste medicamento, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Pare de tomar Cápsulas de Amoxicilina e consulte um médico imediatamente, se notar algum dos seguintes efeitos colaterais graves – você pode precisar de tratamento médico urgente: Os seguintes são muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas)

reações alérgicas, os sinais podem incluir: coceira na pele ou erupção cutânea, inchaço do rosto, lábios, língua, corpo ou dificuldades respiratórias. Estas podem ser graves e ocasionalmente ocorrerem mortes

erupção cutânea ou pequenas manchas vermelhas arredondadas sob a superfície da pele ou hematomas na pele. Isso se deve à inflamação das paredes dos vasos sanguíneos devido a uma reação alérgica. Pode estar associado a dor nas articulações (artrite) e problemas renais

uma reação alérgica tardia pode ocorrer geralmente 7 a 12 dias após tomar Cápsulas de Amoxicilina, alguns sinais incluem: erupções cutâneas, febre, dores nas articulações e aumento dos gânglios linfáticos, especialmente sob os braços

uma reação cutânea conhecida como 'eritema multiforme' onde você pode desenvolver: coceira vermelho arroxeadas manchas na pele, especialmente nas palmas das mãos ou solas dos pés, áreas elevadas 'semelhantes a urticária' como 'levantado outras reações cutâneas graves podem

incluir: mudanças na cor cor sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas) (Reação Medicamentosa com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS)).

temperatura alta (febre), calafrios, dor de garganta ou outros sinais de infecção, ou se você se machuca facilmente. Estes podem ser sinais de um problema com suas células sanguíneas

alta temperatura (febre), calafrios, dor de garganta ou outros sinais de infecção, ou se você se machuca facilmente. Estes podem ser sinais de um problema com suas células sanguíneas

o Jarisch-Reação de Herxheimer que ocorre durante o tratamento com Cápsulas de Amoxicilina para a doença de Lyme e causa febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular e erupção cutânea.

inflamação do intestino grosso (cólon) com diarreia (às vezes contendo sangue), dor e febre

efeitos colaterais graves no fígado podem ocorrer. Eles estão principalmente associados a pessoas em tratamento por um longo período, homens e idosos. Você deve informar o médico urgentemente se tiver:

- diarreia grave com sangramento
- bolhas, vermelhidão ou hematomas na pele
- urina mais escura ou fezes mais claras
- amarelamento da pele ou do branco dos olhos (icterícia). Veja também anemia abaixo, que pode resultar em icterícia.

Isso pode acontecer ao tomar os medicamentos ou até várias semanas depois.

Se qualquer um dos itens acima acontecer, pare de tomar o medicamento e consulte seu médico imediatamente.

Às vezes, você pode ter reações cutâneas menos graves, como:

uma erupção cutânea média e com coceira (manchas redondas, rosa-avermelhadas), áreas inchadas semelhantes a urticária nos antebraços, pernas, palmas das mãos, mãos ou pés. Isso é incomum (pode afetar até 1 em 100 pessoas).

Se você tiver algum desses, fale com o seu médico, pois as Cápsulas de Amoxicilina precisarão ser interrompidas.

Os outros possíveis efeitos colaterais são:

Comum (pode afetar até 1 em 10 pessoas)

erupção cutânea

náusea

diarreia.

Incomum (pode afetar até 1 em 100 pessoas)

vômito.

Muito raro (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)

candidíase (uma infecção por fungos na vagina, boca ou dobras da pele), você pode obter tratamento para candidíase com seu médico ou farmacêutico

problemas renais

convulsões, observadas em pacientes com altas doses ou com problemas renais

tontura

hiperatividade

cristais na urina, levando a lesão renal aguda que pode ser vista como urina turva, ou dificuldade ou desconforto ao urinar. Certifique-se de beber bastante líquido para reduzir as chances desses sintomas

a língua pode mudar para amarelo, marrom ou preto e pode ter uma aparência peluda uma quebra excessiva de glóbulos vermelhos causando uma forma de anemia. Sinais incluir: cansaço, dores de cabeça, falta de ar, tontura, palidez e amarelamento da pele e do branco dos olhos

baixo número de glóbulos brancos

baixo número de células envolvidas na coagulação do sangue

o sangue pode demorar mais para coagular do que normalmente. Você pode notar isso se tiver um sangramento nasal ou se cortar.

Dor no peito no contexto de reações alérgicas, que pode ser um sintoma de infarto cardíaco desencadeado por alergia (Kounis síndrome)

Síndrome de enterocolite induzida por medicamentos (DIES): DIES foi relatada principalmente em crianças que recebem amoxicilina. É um tipo certo de reação alérgica com o sintoma principal de vômitos repetitivos (1-4 horas após a administração do medicamento). Outros sintomas podem incluir dor abdominal, letargia, diarreia, e pressão arterial baixa.

Erupção cutânea com bolhas dispostas em círculo com crostas centrais ou como um colar de pérolas (doença linear por IgA)

Inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal (meningite asséptica)

Relato de efeitos colaterais

Se você tiver quaisquer efeitos colaterais, fale com seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema Cartão Amarelo, Site:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Ao relatar efeitos colaterais você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar as cápsulas de Amoxicilina

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não use este medicamento após a data de validade indicada na embalagem após EXP. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Armazene na embalagem original abaixo de 30°C.

Não use este medicamento se notar sinais visíveis de deterioração.

Não descarte medicamentos através de águas residuais ou lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como descartar medicamentos que você não usa mais. Estas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações O que as Cápsulas de Amoxicilina contêm

A substância ativa em cada cápsula é 250 mg ou 500 mg de Amoxicilina Tri-hidratada. Os outros ingredientes são Croscarmelose Sódica, Estearato de Magnésio, Amarelo Sunset E110, Carmosina E122, Azul Brilhante E133, Amarelo Quinolina E 104, Dióxido de Titânio E171, Metil parahidroxibenzoato E218, Propil parahidroxibenzoato E216, Gelatina (Livre de TSE) e Lauril Sulfato de Sódio.

Como as Cápsulas de Amoxicilina se parecem e conteúdo da embalagem

Vermelho / Bege coloridas cápsulas impresso com 'AMOXY 250' em tinta preta.
Vermelho / Bege colorido cápsulas impresso com 'AMOXY 500' em tinta preta.

Amoxicilina 250mg e 500mg são fornecidas em blister e recipiente de plástico.

Tamanhos de embalagem:

Blister: 15, 21 cápsulas (para 500 mg e 250 mg) Recipiente de plástico: 100 e 500 cápsulas.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Comercialização e Fabricante BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Reino Unido

Este folheto foi revisado pela última vez em 02/2023.

Conselhos gerais sobre o uso de antibióticos

Os antibióticos são usados para tratar infecções causadas por bactérias. Eles não têm efeito contra infecções causadas por vírus.

Às vezes, uma infecção causada por bactérias não responde a um curso de antibiótico. Uma das razões mais comuns para isso ocorrer é porque as bactérias que causam a infecção são resistentes ao antibiótico que está sendo tomado. Isso significa que elas podem sobreviver e até se multiplicar apesar do antibiótico.

As bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos por muitas razões. Usar antibióticos com cuidado pode ajudar a reduzir a chance de as bactérias se tornarem resistentes a eles.

Quando seu médico prescreve um curso de antibiótico, ele é destinado a tratar apenas sua doença atual. Prestar atenção aos seguintes conselhos ajudará a prevenir o surgimento de bactérias resistentes que poderiam impedir o funcionamento do antibiótico.

1. É muito importante que você tome o antibiótico na dose certa, nos horários certos e pelo número correto de dias. Leia as instruções no rótulo e, se não entender algo, peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar.
2. Você não deve tomar um antibiótico a menos que tenha sido prescrito especificamente para você e deve usá-lo apenas para tratar a infecção para a qual foi prescrito.
3. Você não deve tomar antibióticos que foram prescritos para outras pessoas, mesmo que elas tenham tido uma infecção que foi semelhante à sua.
4. Você não deve dar antibióticos que foram prescritos para você a outras pessoas.
5. Se você tiver algum antibiótico sobrando após ter completado o tratamento conforme orientado pelo seu médico, você deve levar o restante a uma farmácia para descarte adequado.

Transtoyou