

Prospect (PIL)  
Prospect: Informații pentru utilizator  
Amoxicilină 250mg & 500 mg Capsule  
(Amoxicilină)

Citiți tot acest prospect cu atenție înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

Dacă aveți întrebări suplimentare, întrebați medicul sau farmacistul.

Acest medicament v-a fost prescris numai dumneavoastră. Nu-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași ca ale dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, discutați cu medicul sau farmacistul. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

### Ce conține acest prospect

1. Ce este Amoxicilina capsule și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Amoxicilina capsule
3. Cum să luați Amoxicilina capsule
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Amoxicilina capsule
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

### 1. Ce este Amoxicilina capsule și pentru ce se utilizează

Capsulele de Amoxicilină 250 mg și 500 mg sunt un antibiotic. Ingredientul activ este amoxicilina. Aceasta aparține unui grup de medicamente numite 'peniciline'.

#### Pentru ce se utilizează Amoxicilina Capsule

Capsulele de Amoxicilină sunt utilizate pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii în diferite părți ale corpului.

Capsulele de Amoxicilină pot fi, de asemenea, utilizate în combinație cu alte medicamente pentru a trata ulcerul stomacal.

### 2. Ce trebuie să știți înainte de a lua capsule de Amoxicilină

#### Nu luați capsule de Amoxicilină:

dacă sunteți alergic la amoxicilină, penicilină sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale acestui medicament (enumerate în secțiunea 6)

dacă ați avut vreodată o reacție alergică la orice antibiotic. Aceasta poate include o erupție cutanată sau umflarea feței sau a gâtului.

Nu luați capsule de Amoxicilină dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua capsule de Amoxicilină.

### Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua capsule de Amoxicilină dacă:

- aveți febră glandulară (febră, durere în gât, glande umflate și oboseală extremă)
- aveți probleme renale
- nu urinați regulat.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua capsule de Amoxicilină.

### Teste de sânge și urină

Dacă aveți:

- Teste de urină (glucoză) sau teste de sânge pentru funcția hepatică
- Oestriol teste (utilizate în timpul sarcinii pentru a verifica dacă bebelușul se dezvoltă normal)

Spuneți medicului sau farmacistului că luați Capsule de Amoxicilină. Acest lucru se datorează faptului că Capsule de Amoxicilină pot afecta rezultatele acestor teste.

### Alte medicamente și Capsule de Amoxicilină

Spuneți medicului sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Dacă luați allopurinol (utilizat pentru gută) cu Capsule de Amoxicilină, este mai probabil să aveți o reacție alergică a pielii.

Dacă luați probenecid, (utilizat pentru a trata guta), utilizarea concomitentă a probenecidului poate reduce excreția amoxicilinei și nu este recomandată. Medicul dumneavoastră poate decide să ajusteze doza de Capsule de Amoxicilină.

Dacă luați medicamente pentru a ajuta la oprirea cheagurilor de sânge (cum ar fi warfarina), este posibil să aveți nevoie de teste de sânge suplimentare.

Dacă luați alte antibiotice (cum ar fi tetraciclina), Capsule de Amoxicilină pot fi mai puțin eficiente.

Dacă luați metotrexat (utilizat pentru a trata cancerul și psoriazisul sever), penicilinele pot reduce excreția metotrexatului, cauzând o potențială creștere a efectelor secundare.

### Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil, cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament.

### Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Capsule de Amoxicilină pot avea efecte secundare și simptomele (cum ar fi reacțiile alergice, amețelile și convulsiile) pot face să nu fiți apt pentru a conduce.

Nu conduceți și nu folosiți utilaje dacă nu vă simțiți bine.

### 3. Cum să luați capsulele de Amoxicilină

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Verificați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Înghițiți cu apă fără a deschide capsula.

Spațiați dozele uniform pe parcursul zilei, la cel puțin 4 ore distanță.

Doza recomandată este:

Copii cu greutatea mai mică de 40 kg

Toate dozele sunt calculate în funcție de greutatea corporală a copilului în kilograme.

Medicul dumneavoastră vă va sfătui cât de mult Amoxicilină Capsule ar trebui să administrați bebelușului sau copilului dumneavoastră.

Doza uzuală este de 40 mg până la 90 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi, administrată în două sau trei doze divizate.

Doza maximă recomandată este de 100 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi.

Adulți, pacienți vârstnici și copii cu greutatea de 40 kg sau mai mult

Doza uzuală de capsule de Amoxicilină este de 250 mg până la 500 mg de trei ori pe zi sau 750 mg până la 1 g la fiecare 12 ore, în funcție de severitatea și tipul infecției.

Infecții severe: 750 mg până la 1 g de trei ori pe zi.

Infecție urinară: 3 g de două ori pe zi pentru o zi.

Boala Lyme (o infecție răspândită de paraziți numiți căpușe): Eritem migrator izolat (stadiu incipient – erupție circulară roșie sau roz): 4 g pe zi, Manifestări sistemice (stadiu tardiv – pentru simptome mai grave sau când boala se răspândește în corp): până la 6 g pe zi.

Ulcer gastric: o doză de 750 mg sau una de 1 g de două ori pe zi timp de 7 zile cu alte antibiotice și medicamente pentru tratarea ulcerului gastric.

Pentru a preveni infecția cardiacă în timpul intervențiilor chirurgicale: doza va varia în funcție de tipul de intervenție chirurgicală. Alte medicamente pot fi administrate în același timp. Medicul, farmacistul sau asistenta vă pot oferi mai multe detalii.

Doza maximă recomandată este de 6 g pe zi.

Probleme renale

Dacă aveți probleme renale, doza ar putea fi mai mică decât doza obișnuită.

Dacă luați mai multe capsule de Amoxicilină decât ar trebui

Dacă ați luat prea multe capsule de Amoxicilină, semnele pot fi un stomac deranjat (senzație de greață, vărsături sau diaree) sau cristale în urină, care pot fi observate ca urină tulbure sau probleme la urinare. Discutați cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil. Luați medicamentul pentru a-l arăta medicului.

Dacă uitați să luați capsulele de Amoxicilină

Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți.

Nu luați următoarea doză prea curând, așteptați aproximativ 4 ore înainte de a lua următoarea doză.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Cât timp ar trebui să luați capsulele de Amoxicilină?

Continuați să luați capsulele de Amoxicilină atât timp cât v-a spus medicul dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți mai bine. Aveți nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la combaterea infecției. Dacă unele bacterii supraviețuiesc, acestea pot cauza revenirea infecției.

Odată ce ați terminat tratamentul, dacă încă vă simțiți rău, ar trebui să mergeți înapoi la medic.

Candidoza (o infecție fungică a zonelor umede ale corpului care poate provoca durere, mâncărime și secreție albă) poate apărea dacă capsulele de Amoxicilină sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp. Dacă acest lucru se întâmplă, spuneți medicului dumneavoastră.

Dacă luați capsulele de Amoxicilină pentru o perioadă lungă de timp, medicul dumneavoastră poate efectua teste suplimentare pentru a verifica dacă rinichii, ficatul și sângele dumneavoastră funcționează normal.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre utilizarea acestui medicament, întrebați medicul sau farmacistul.

#### 4. Posibile efecte secundare

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca efecte secundare, deși nu toată lumea le manifestă.

Opriti administrarea capsulelor de Amoxicilină și consultați imediat un medic dacă observați oricare dintre următoarele efecte secundare grave – este posibil să aveți nevoie de tratament medical urgent: Următoarele sunt foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane)

reacții alergice, semnele pot include: mâncărime a pielii sau erupție cutanată, umflarea feței, buzelor, limbii, corpului sau dificultăți de respirație. Acestea pot fi grave și ocazional au apărut decese

erupție cutanată sau pete roșii rotunde plate sub suprafața pielii sau vânătași ale pielii.

Acest lucru se datorează inflamației pereților vaselor de sânge din cauza unei reacții alergice. Poate fi asociat cu dureri articulare (artrită) și probleme renale

o reacție alergică întârziată poate apărea de obicei la 7 până la 12 zile după administrarea capsulelor de Amoxicilină, unele semne includ: erupții cutanate, febră, dureri articulare și mărirea ganglionilor limfatici, în special sub brațe

o reacție cutanată cunoscută sub numele de 'eritem multiform' în care puteți dezvolta:

mâncărime roșie purpurie pe piele, în special pe palmele mâinilor sau tălpile

picioarelor, zone umflate 'ca urticaria' zone umflate pe piele, zone sensibile pe suprafețele gurii, ochilor și organelor genitale. Puteți avea febră și să fiți foarte obosit

alte reacții cutanate severe pot include: modificări ale culorii pielii, umflături sub piele, vezicule, pustule, descumare, roșeață, durere, mâncărime, descumare. Acestea pot fi asociate cu febră, dureri de cap și dureri corporale simptome asemănătoare gripei cu o erupție cutanată, febră, glande umflate și rezultate anormale ale testelor de sânge (inclusiv creșterea numărului de globule albe (eozinofilie) și a enzimelor hepatice) (Reacție la Medicament cu Eozinofilie și Simptome Sistemice (DRESS)).

temperatură ridicată (febră), frisoane, durere în gât sau alte semne de infecție, sau dacă vă învineți ușor. Acestea pot fi semne ale unei probleme cu celulele sanguine the Jarisch-Reacția Herxheimer care apare în timpul tratamentului cu capsule de Amoxicilină pentru boala Lyme și cauzează febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare și erupții cutanate.

inflamația intestinului gros (colon) cu diaree (uneori conținând sânge), durere și febră pot apărea efecte secundare grave la nivelul ficatului. Acestea sunt asociate în principal cu persoanele care urmează un tratament pe termen lung, bărbații și vârstnicii. Trebuie să informați urgent medicul dacă aveți:

- diaree severă cu sângerare bășici, roșeață sau vânătăi ale pielii
- urină mai închisă la culoare sau scaune mai deschise la culoare
- îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter). Vezi și
- îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter). Vezi de asemenea anemie Acestea pot apărea în timpul administrării medicamentelor sau până la câteva săptămâni după.

Dacă oricare dintre cele de mai sus se întâmplă, opriți administrarea medicamentului și consultați imediat medicul.

Uneori puteți avea reacții cutanate mai puțin severe, cum ar fi:

Uneori puteți avea reacții cutanate mai puțin severe, cum ar fi:

Dacă aveți oricare dintre

acestea, discutați aceste discuții medicului dumneavoastră, deoarece Capsulele de Amoxicilină vor trebui oprite.

Celelalte posibile efecte secundare sunt:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

erupție cutanată  
greață  
diaree.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

vărsături.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 persoane)

candidoză (o infecție cu drojdie a vaginului, gurii sau pliurilor pielii), puteți obține tratament pentru candidoză de la medicul sau farmacistul dumneavoastră  
probleme renale  
convulsii, observate la pacienții cu doze mari sau cu probleme renale  
amețeli

hiperactivitate

cristale în urină, ducând la leziuni renale acute care pot fi observate ca urină tulbure sau dificultate sau disconfort la urinare. Asigurați-vă că beți multe lichide pentru a reduce șansele acestor simptome

limba poate deveni galbenă, maro sau neagră și poate avea un aspect păros

o descompunere excesivă a globulelor roșii cauzând o formă de anemie. Semne include: oboseală, dureri de cap, dificultăți de respirație, amețeli, paloare și îngălbenirea pielii și a albului ochilor

număr scăzut de globule albe

număr scăzut de celule implicate în coagularea sângelui

sângele poate coagula mai lent decât în mod normal. Puteți observa acest lucru dacă aveți o sângerare nazală sau vă tăiați.

Durere toracică în contextul reacțiilor alergice, care poate fi un simptom al infarctului cardiac declanșat de alergie (Kounis sindrom)

Sindromul de enterocolită indusă de medicamente (DIES): DIES a fost raportat în principal la copiii care primesc amoxicilină. Este un anumit tip de reacție alergică cu simptomul principal de vărsături repetate (1-4 ore după administrarea medicamentului). Alte simptome pot include dureri abdominale, letargie, diaree, și tensiune arterială scăzută.

Erupție cutanată cu vezicule aranjate în cerc cu crustare centrală sau ca un șir de perle (boala IgA liniară)

Inflamația membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării (meningită aseptică)

Raportarea efectelor secundare

Dacă aveți orice efecte secundare, discutați cu medicul sau farmacistul dumneavoastră. Acest lucru include orice efecte secundare posibile care nu sunt listate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta efectele secundare direct prin Schema Cartonaș Galben, Website: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard). Raportând efectele secundare puteți ajuta la furnizarea mai multor informații despre siguranța acestui medicament. Cum se păstrează capsulele de Amoxicilină

## 5. Cum să depozitați capsulele de Amoxicilină

A nu se lăsa acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original la temperaturi sub 30°C.

Nu utilizați acest medicament dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Nu aruncați medicamentele pe calea apei uzate apă uzată Conținutul ambalajului și alte informații  
Ce conțin capsulele de Amoxicilină

## 6. Substanța activă din fiecare capsulă este Amoxicilină Trihidrat 250 mg sau 500 mg.

Celelalte ingrediente sunt Croscarmeloză sodică, Stearat de magneziu, Sunset yellow E110,

Carmosină Carmosină parahidroxibenzoat E218, Propil parahidroxibenzoat E216, Gelatină (fără TSE) și Lauril sulfat de sodiu. Cum arată capsulele de Amoxicilină și conținutul ambalajului

Capsule de culoare Roșu / Buff

colorate capsule capsule imprimat cu 'AMOXY 250' cu cerneală neagră.

Roșu / Buff colorat capsule imprimat cu 'AMOXY 500' cu cerneală neagră.

Amoxicilina 250mg și 500mg sunt furnizate în blister și recipient de plastic.

Mărimi pachet:

Blister: 15, 21 capsule (pentru 500 mg & 250 mg) Recipient de plastic: 100 & 500 capsule.

Nu toate mărimile de pachet pot fi comercializate.

Deținătorul Autorizației de Comercializare și Producătorul BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,  
Middlesex, TW4 5DQ, Regatul Unit

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 02/2023.

Sfaturi generale privind utilizarea antibioticelor

Antibioticele sunt utilizate pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii. Ele nu au efect împotriva infecțiilor cauzate de viruși.

Uneori, o infecție cauzată de bacterii nu răspunde la un tratament cu un antibiotic. Unul dintre cele mai comune motive pentru care acest lucru se întâmplă este că bacteriile care cauzează infecția sunt rezistente la antibioticul care este administrat. Aceasta înseamnă că ele pot supraviețui și chiar se pot înmulți în ciuda antibioticului.

Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din multe motive. Utilizarea atentă a antibioticelor poate ajuta la reducerea șansei ca bacteriile să devină rezistente la ele.

Când medicul dumneavoastră prescrie un tratament cu un antibiotic, acesta este destinat să trateze doar boala dumneavoastră actuală. Acordând atenție următoarelor sfaturi, veți ajuta la prevenirea apariției bacteriilor rezistente care ar putea împiedica funcționarea antibioticului.

1. Este foarte important să luați antibioticul la doza corectă, la momentele potrivite și pentru numărul corect de zile. Citiți instrucțiunile de pe etichetă și dacă nu înțelegeți ceva, cereți medicului sau farmacistului să vă explice.

2. Nu ar trebui să luați un antibiotic decât dacă a fost prescris special pentru dumneavoastră și ar trebui să-l utilizați doar pentru a trata infecția pentru care a fost prescris.
3. Nu ar trebui să luați antibiotice care au fost prescrise pentru alte persoane, chiar dacă acestea au avut o infecție care era similară cu a dumneavoastră.
4. Nu ar trebui să dați antibioticele care v-au fost prescrise altor persoane.
5. Dacă vă rămân antibiotice după ce ați urmat tratamentul așa cum v-a indicat medicul, ar trebui să le duceți la o farmacie pentru eliminare corespunzătoare.

Transtoyou