

Bipacksedel (PIL)

Bipacksedel: Information till användaren
Amoxicillin 250mg & 500 mg kapslar
(Amoxicillin)

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad denna bipacksedel innehåller

1. Vad Amoxicillin kapslar är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin kapslar
3. Hur du tar Amoxicillin kapslar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amoxicillin kapslar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övrig information.

1. Vad Amoxicillin kapslar är och vad det används för Vad Amoxicillin kapsel är

Amoxicillin 250 mg och 500 mg kapslar är ett antibiotikum. Den aktiva ingrediensen är amoxicillin. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas 'penicilliner'.

Vad Amoxicillin kapsel används för

Amoxicillin kapsel används för att behandla infektioner orsakade av bakterier i olika delar av kroppen.

Amoxicillin kapsel kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin kapslar

Ta inte Amoxicillin kapsel:

om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller något av de andra ingredienserna i detta läkemedel (listade i avsnitt 6)

om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot något antibiotikum. Detta kan inkludera hudutslag eller svullnad i ansikte eller hals.

Ta inte Amoxicillin kapslar om något av ovanstående gäller. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin kapslar.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin kapsel om du:
har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna körtlar och extrem trötthet)
har njurproblem
inte urinerar regelbundet.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin kapslar.

Blod- och urintester

Om du har:

Urinprov (glukos) eller blodprov för leverfunktion

Östriol tester (används under graviditet för att kontrollera att barnet utvecklas normalt)

Tala om för din läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin Kapsel. Detta beror på att Amoxicillin Kapsel kan påverka resultaten av dessa tester.

Andra läkemedel och Amoxicillin Kapslar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel.

Om du tar allopurinol (används mot gikt) tillsammans med Amoxicillin Kapslar, är det mer sannolikt att du får en allergisk hudreaktion.

Om du tar probenecid, (används för att behandla gikt), kan samtidig användning av probenecid minska utsöndringen av amoxicillin och rekommenderas inte. Din läkare kan besluta att justera din dos av Amoxicillin Kapslar.

Om du tar läkemedel för att hjälpa till att stoppa blodproppar (såsom warfarin), kan du behöva extra blodprov.

Om du tar andra antibiotika (såsom tetracyklin) kan Amoxicillin Kapslar vara mindre effektiva.

Om du tar metotrexat (används för att behandla cancer och svår psoriasis), penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat vilket kan leda till en potentiell ökning av biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körning och användning av maskiner

Amoxicillin Kapslar kan ha biverkningar effekter och symtomen (såsom allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig att köra bil.

Kör inte bil eller använd maskiner om du inte mår bra.

3. Hur man tar Amoxicillin kapslar

Ta alltid denna medicin exakt som din läkare eller apotekare har sagt till dig. Kontrollera med din läkare eller apotekare om du är osäker.

Svälj med vatten utan att öppna kapseln.
Fördela doserna jämnt under dagen, minst 4 timmar mellanrum.

Den rekommenderade dosen är:

Barn som väger mindre än 40 kg

Alla doser beräknas beroende på barnets kroppsvikt i kilogram.

Din läkare kommer att ge råd om hur mycket Amoxicillin kapslar du ska ge till din bebis eller ditt barn.

Den vanliga dosen är 40 mg till 90 mg per kilogram kroppsvikt per dag, givet i två eller tre uppdelade doser.

Den maximalt rekommenderade dosen är 100 mg per kilogram kroppsvikt per dag.

Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen av Amoxicillin kapslar är 250 mg till 500 mg tre gånger om dagen eller 750 mg till 1 g var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

Svåra infektioner: 750 mg till 1 g tre gånger om dagen.

Urinvägsinfektion: 3 g två gånger dagligen i en dag.

Borrelia (en infektion spridd av parasiter kallade fästingar): Isolerad erythema migrans (tidigt stadium – röd eller rosa cirkulärt utslag): 4 g per dag, Systemiska manifestationer (sent stadium – för allvarigare symtom eller när sjukdomen sprider sig i kroppen): upp till 6 g per dag.

Magsår: en 750 mg eller en 1 g dos två gånger om dagen i 7 dagar med andra antibiotika och läkemedel för att behandla magsår.

För att förebygga hjärtinfektion under operation: dosen kommer att variera beroende på typ av operation. Andra läkemedel kan också ges samtidigt. Din läkare, apotekare eller sjuksköterska kan ge dig mer information.

Den maximalt rekommenderade dosen är 6 g per dag.

Njurproblem

Om du har njurproblem kan dosen vara lägre än den vanliga dosen.

Om du tar fler Amoxicillin kapslar än du borde

Om du har tagit för mycket Amoxicillin kapslar, kan tecken vara en orolig mage (känna sig illamående, kråkas eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket kan ses som grumlig urin, eller problem med att urinera. Prata med din läkare så snart som möjligt. Ta med medicinen för att visa läkaren.

Om du glömmer att ta Amoxicillin kapslar

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

Ta inte nästa dos för tidigt, vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Hur länge ska du ta Amoxicillin kapslar?

Fortsätt ta Amoxicillin kapslar så länge din läkare har sagt till dig, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att hjälpa till att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan de orsaka att infektionen kommer tillbaka.

När du avslutar behandlingen, om du fortfarande känner dig dålig bör du gå tillbaka till läkaren.

Svampinfektion (en jästinfektion i fuktiga områden av kroppen som kan orsaka ömhet, klåda och vit flytning) kan utvecklas om Amoxicillin kapslar används under lång tid. Om detta inträffar, berätta för din läkare.

Om du tar Amoxicillin kapslar under lång tid, kan din läkare utföra ytterligare tester för att kontrollera att dina njurar, lever och blod fungerar normalt.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna medicin, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

Sluta ta Amoxicillin kapslar och uppsök läkare omedelbart om du märker något av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling: Följande är mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

allergiska reaktioner, tecknen kan inkludera: klåda eller utslag på huden, svullnad i ansikte, läppar, tunga, kropp eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och ibland har dödsfall inträffat

utslag eller små platta röda runda fläckar under huden eller blåmärken på huden. Detta beror på inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Det kan vara förknippat med ledvärk (artrit) och njurproblem

en fördröjd allergisk reaktion kan inträffa vanligtvis 7 till 12 dagar efter att ha tagit Amoxicillin Kapslar, några tecken inkluderar: utslag, feber, ledvärk och förstörade lymfkörtlar särskilt under armarna

en hudreaktion känd som 'erythema multiforme' där du kan utveckla: kliande rödaktiga lila fläckar på huden särskilt på handflatorna eller fotsulorna, 'nässel-liknande' upphöjda svullna områden på huden, ömma områden på ytorna av munnen, ögonen och könsorganen. Du kan ha feber och vara mycket trött

andra allvarliga hudreaktioner kan inkludera: förändringar i hud färg, knölar under huden, blåsor, pustler, fjällning, rodnad, smärta, klåda, fjällning. Dessa kan vara förknippade med feber, huvudvärk och kroppsvärk

influenسالiknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala blodprovresultat (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzym) (Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

hög temperatur (feber), frossa, ont i halsen eller andra tecken på en infektion, eller om du lätt får blåmärken. Dessa kan vara tecken på ett problem med dina blodceller

den Jarisch-Herxheimer-reaktion som uppstår under behandling med Amoxicillin-kapslar för Lyme-sjukdom och orsakar feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag. inflammation i tjocktarmen (kolon) med diarré (ibland innehållande blod), smärta och feber allvarliga leverbiverkningar kan uppstå. De är främst förknippade med personer som får behandling under en längre period, män och äldre. Du måste omedelbart informera läkaren om du får:

- svår diarré med blödning
- blåsor, rodnad eller blåmärken på huden
- mörkare urin eller blekare avföring
- gulning av huden eller ögonvitorna (gulsot). Se även anemi nedan som kan leda till gulsot.

Dessa kan inträffa när man tar medicinerna eller upp till flera veckor efter.

Om något av ovanstående inträffar, sluta ta medicinen och kontakta din läkare omedelbart.

Ibland kan du få mindre allvarliga hudreaktioner som:

ett medelstort kliande utslag (runda, rosa-röda fläckar), 'nässelutslagsliknande' svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är ovanligt (kan påverka upp till 1 av 100 personer).

Om du har något av dessa prata till din läkare eftersom Amoxicillin Kapslar måste avbrytas.

De andra möjliga biverkningarna är:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

hudutslag
illamående
diarré.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

kräkningar.

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

torsk (en jästinfektion i slidan, munnen eller hudveck), du kan få behandling för torsk från din läkare eller apotekare

njurproblem

kramper (konvulsioner), ses hos patienter med höga doser eller med njurproblem

yrsel

hyperaktivitet

kristaller i urinen, vilket leder till akut njurskada som kan ses som grumlig urin, eller svårighet eller obehag vid urinering. Se till att du dricker mycket vätska för att minska risken för dessa symtom

tungan kan ändra färg till gul, brun eller svart och den kan få ett hårigt utseende

en överdriven nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en form av anemi. Tecken inkludera: trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulfärgning av huden och ögonvitorna

lågt antal vita blodkroppar

lågt antal celler involverade i blodkoagulering

blodet kan ta längre tid att koagulera än normalt. Du kan märka detta om du får näsblod eller skär dig.

Bröstmärta i samband med allergiska reaktioner, vilket kan vara ett symptom på allergiutlöst hjärtinfarkt (Kounis syndrom)

Läkemedelsinducerat enterokolitissyndrom (DIES): DIES har rapporterats främst hos barn som får amoxicillin. Det är en viss typ av allergisk reaktion med det ledande symptomet av upprepade kräkningar (1-4 timmar efter läkemedelsadministration). Ytterligare symptom kan omfatta buksmärta, slöhet, diarré, och lågt blodtryck.

Utslag med blåsor arrangerade i en cirkel med central skorpa eller som ett pärlband (linjär IgA-sjukdom)

Inflammation av membranerna som omger hjärnan och ryggmärgen (aseptisk meningit)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme, Webbplats:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för detta läkemedel. Hur du förvarar Amoxicillin kapslar

5. Hur man förvarar Amoxicillin kapslar

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvara i originalförpackningen under 30°C.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga tecken på försämring.

Kasta inte bort några läkemedel via avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekare hur du ska kasta bort läkemedel du inte längre använder. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Innehåll i förpackningen och övrig information Vad Amoxicillin Kapslar innehåller

Den aktiva substansen i varje kapsel är 250 mg eller 500 mg Amoxicillintrihydrat.

De övriga ingredienserna är Kroskarmellosnatrium, Magnesiumstearat, Sunset yellow E110, Karmosin E122, Brilliant blue E133, Kinolingult E 104, Titandioxid E171, Metyl parahydroxibensoat E218, Propyl parahydroxibensoat E216, Gelatin (TSE Fri) och Natriumlaurylsulfat.

Hur Amoxicillin Kapslar ser ut och innehåll i förpackningen

Röd / Buff färgade kapslar tryckt med 'AMOX 250' i svart bläck.

Röd / Buff färgad kapslar tryckt med 'AMOXY 500' i svart bläck.

Amoxicillin 250 mg och 500 mg levereras i blisterförpackning och plastbehållare.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 15, 21 kapslar (för 500 mg & 250 mg) Plastbehållare: 100 & 500 kapslar.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West,
Middlesex, TW4 5DQ, Storbritannien

Denna bipacksedel granskades senast i 02/2023.

Allmänna råd angående användning av antibiotika

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De har ingen effekt mot infektioner orsakade av virus.

Ibland svarar inte en infektion orsakad av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna som orsakar infektionen är resistenta mot antibiotikan som tas. Detta innebär att de kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikan.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika av många anledningar. Att använda antibiotika försiktigt kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistenta mot dem.

När din läkare ordinerar en antibiotikakur är den avsedd att behandla endast din nuvarande sjukdom. Att följa följande råd kommer att hjälpa till att förhindra uppkomsten av resistenta bakterier som kan göra att antibiotikan slutar fungera.

1. Det är mycket viktigt att du tar antibiotikan i rätt dos, vid rätt tidpunkter och under rätt antal dagar. Läs instruktionerna på etiketten och om du inte förstår något, be din läkare eller apotekare att förklara.
2. Du bör inte ta en antibiotika om den inte har ordinerats specifikt för dig och du bör endast använda den för att behandla den infektion för vilken den ordinerades.
3. Du bör inte ta antibiotika som har ordinerats till andra personer även om de hade en infektion som var liknande din.
4. Du bör inte ge antibiotika som ordinerats till dig till andra personer.
5. Om du har någon antibiotika kvar när du har tagit kuren enligt din läkares anvisningar bör du ta resten till ett apotek för lämplig avfallshantering.