

BRUKSANVISNING: INFORMATION FÖR PATIENTER

Amoxicillin-ratiopharm® 750 mg filmdragerade tabletter
Amoxicillin-trihydrat motsvarande 750 mg amoxicillin

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar ta detta läkemedel, eftersom den innehåller viktig information.

Spara bipacksedeln. Du kanske vill läsa den igen senare.

Om du har ytterligare frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig (eller ditt barn). Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de har samma symtom som du.

Om du märker några biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Denna bipacksedel innehåller:

1. Vad är Amoxicillin-ratiopharm® och vad används det för?
2. Vad bör du veta innan du tar Amoxicillin-ratiopharm® ?
3. Hur ska Amoxicillin-ratiopharm® tas?
4. Vilka biverkningar är möjliga?
5. Hur ska Amoxicillin-ratiopharm® förvaras?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Amoxicillin-ratiopharm® och vad används det för?

Vad är Amoxicillin-ratiopharm®

Amoxicillin-ratiopharm® är ett antibiotikum. Den aktiva substansen är amoxicillin. Denna tillhör en grupp läkemedel som kallas "penicilliner".

Vad används Amoxicillin-ratiopharm® för

Amoxicillin-ratiopharm® används för att behandla infektioner orsakade av bakterier på olika ställen i kroppen. Amoxicillin-ratiopharm kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

2. Vad bör du veta innan du tar Amoxicillin-ratiopharm® ?

Amoxicillin-ratiopharm® får inte tas,

om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller någon av de övriga ingredienserna som anges i avsnitt 6 i detta läkemedel.

om du tidigare har haft en allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot ett annat penicillin. Detta kan ha varit ett utslag eller svullnad i ansikte eller hals.

Ta inte Amoxicillin-ratiopharm® om något av dessa påståenden gäller dig. Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin-ratiopharm® om du är osäker.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin-ratiopharm® om du:

har körtelfeber (feber, halsont, svullna körtlar och extrem trötthet)

har njurproblem

bara urinerar oregelbundet

har haft en tidigare historia av läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS-syndrom) i samband med andra läkemedel, eftersom återfall av DRESS inducerat av amoxicillin har rapporterats.

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin-ratiopharm® om du är osäker på om något av dessa påståenden gäller dig.

Blod- och urinundersökningar

Om du har:

Urinprov (glukos) eller blodprov för att bestämma levervärden,

Östrioltester (används under graviditet för att kontrollera barnets utveckling) utförs,

Informera din läkare eller apotekspersonal om att du tar Amoxicillin-ratiopharm®. Detta är nödvändigt eftersom Amoxicillin-ratiopharm® kan påverka resultaten av dessa tester.

Intag av Amoxicillin-ratiopharm® tillsammans med andra läkemedel

Informera din läkare eller apotekspersonal om du tar/använder andra läkemedel, nyligen har tagit/använt andra läkemedel eller planerar att ta/använda andra läkemedel.

Penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat (används för behandling av cancer och svår psoriasis), vilket kan leda till en ökning av biverkningar.

Om du tar allopurinol (för behandling av gikt) med Amoxicillin-ratiopharm® är det mer sannolikt att du får en allergisk hudreaktion.

Samtidig användning av probenecid (används för behandling av gikt) kan minska utsöndringen av amoxicillin och rekommenderas inte.

Om du tar ett läkemedel för att förhindra blodproppar (som warfarin) kan ytterligare blodprov behövas.

Om du tar andra antibiotika (som tetracykliner) kan Amoxicillin-ratiopharm® vara mindre effektiv.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, eller om du misstänker att du är gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin-ratiopharm® kan orsaka biverkningar och dessa besvär (som allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan påverka din körförmåga.

Du bör inte köra bil eller använda maskiner om du inte mår bra.

Amoxicillin-ratiopharm® innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, vilket innebär att det är praktiskt taget "natriumfritt".

3. Hur ska Amoxicillin-ratiopharm® tas?

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningarna från din läkare eller apotekspersonal. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Filmdragerade tabletter ska sväljas hela med tillräcklig mängd vätska (t.ex. 1 glas vatten). Amoxicillin-ratiopharm® bör tas med en måltid eftersom detta förbättrar toleransen för Amoxicillin-ratiopharm® förbättras; effekten av Amoxicillin-ratiopharm® påverkas inte. Dela upp doserna jämnt över dagen, med minst 4 timmars mellanrum.

Den rekommenderade dosen är:

Barn med en kroppsvikt under 40 kg

Alla doser beräknades beroende på barnens kroppsvikt i kilogram.

Din läkare kommer att rådgöra med dig hur mycket Amoxicillin-ratiopharm® du ska ge ditt barn.

Den vanliga dosen är 40 mg till 90 mg per kilogram kroppsvikt per dag, administrerat i två eller tre uppdelade doser.

Den maximalt rekommenderade dosen är 100 mg per kilogram kroppsvikt per dag.

Vuxna, äldre patienter och barn med en kroppsvikt på 40 kg eller mer

Den vanliga dosen av Amoxicillin-ratiopharm® är 250 mg till 500 mg tre gånger dagligen eller 750 mg till 1 000 mg var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

Allvarliga infektioner: 750 mg till 1 000 mg tre gånger dagligen.

Urinvägsinfektioner: 3 000 mg två gånger dagligen under en dag.

Borrelia (en infektion som sprids av fästingar): Isolerad erythema migrans (tidigt stadium – röd eller rosa rund hudutslag): 4 000 mg per dag, systemisk form (sent stadium – vid flera allvarliga symtom eller när sjukdomen sprider sig i kroppen): upp till 6 000 mg per dag.

Magsår: en dos på 750 mg eller 1 000 mg två gånger dagligen i 7 dagar med andra antibiotika och läkemedel för behandling av magsår.

För att undvika en hjärtinfektion under en operation: Dosen varierar beroende på operationens typ. Andra läkemedel kan också användas samtidigt. Din läkare, apotekare eller sjukvårdspersonal kan ge dig mer information.

Den maximalt rekommenderade dosen är 6 000 mg per dag.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kan dosen vara lägre än den vanliga dosen.

Om du har tagit en större mängd av Amoxicillin-ratiopharm® än du borde

Om du har tagit för mycket Amoxicillin-ratiopharm® kan det leda till magproblem (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristallbildning i urinen, vilket kan märkas genom grumlig urin eller problem med urinering. Kontakta din läkare så snart som möjligt. Ta med läkemedlet och visa det för läkaren.

Om du har glömt att ta Amoxicillin-ratiopharm® glömt

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

Ta inte nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.

Ta inte dubbel dos om du har glömt den föregående dosen.

Hur länge ska du ta Amoxicillin-ratiopharm® ?

Ta Amoxicillin-ratiopharm® så länge som din läkare har ordinerat, även om du redan känner dig bättre. Du behöver alla ordinerade doser för att bekämpa din infektion. Om några bakterier överlever kan de orsaka att infektionen återkommer.

Om din behandling är avslutad och du fortfarande känner dig obehaglig, bör du kontakta din läkare.

Torsk (en jästsvampinfektion i fuktiga kroppsregioner som kan orsaka smärta, klåda och vit flytning) kan uppstå när

Amoxicillin-ratiopharm® används under en lång tid. Om det händer, informera din läkare.

Om du Amoxicillin-ratiopharm® tar under en lång tid, kommer din läkare att utföra ytterligare tester för att kontrollera om dina njurar, lever och blod fungerar normalt.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekare.

4. Vilka biverkningar är möjliga?

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, men de behöver inte förekomma hos alla.

Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta Amoxicillin-ratiopharm® och kontakta omedelbart en läkare – du kan behöva akut medicinsk vård:

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 behandlade)

Allergiska reaktioner, symtomen kan vara: klåda i huden eller utslag, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan, kroppen eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och det har ibland lett till dödsfall.

Hudutslag eller knappnålshuvudstora platta röda runda punkter under huden eller små hudblödningar. Detta inträffar vid allergiska reaktioner på grund av inflammation i blodkärlens väggar. Detta kan vara förknippat med ledvärk (artrit) och njurproblem. En fördröjd allergisk reaktion kan vanligtvis inträffa 7 till 12 dagar efter Amoxicillin-ratiopharm® intag, några symtom är: hudutslag, feber, ledvärk och förstörade lymfkörtlar, särskilt under armarna.

En hudreaktion känd som "Erythema multiforme", där du kan få: kliande rödvioletta fläckar på huden, särskilt på handflatorna eller fotsulorna, "nässelutslag" liknande upphöjda svullna områden på huden, känsliga områden på munnens yta, ögon och intimområde. Du kan ha feber och känna dig mycket trött.

Andra allvarliga hudreaktioner kan vara: förändring av hudfärg, knölar under huden, blåsbildning, pustler, hudavflagnings, rodnad, smärta, klåda, fjällning. Dessa kan åtföljas av feber, huvudvärk och kroppssmärter.

Influensaliknande symtom med hudutslag, feber och svullna körtlar samt onormala blodvärden (inklusive förhöjda nivåer av vita blodkroppar [eosinofili] och leverenzym) (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]).

Feber, frossa, halsont eller andra symtom på infektion, eller om du lätt får blåmärken. Detta kan vara tecken på att du har ett problem med blodcellerna.

Jarisch-Herxheimer-reaktionen, som uppstår under behandling av borrelia med Amoxicillin-ratiopharm® orsakar feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärter och hudutslag. Inflammation i tjocktarmen (kolon) med diarré, som ibland innehåller blod, smärta och feber.

Allvarliga biverkningar på levern kan uppstå. Detta drabbar främst personer som har behandlats under lång tid, män och äldre personer. Du måste omedelbart kontakta din läkare om du får följande:

- Allvarlig blodig diarré
- Blåsor, rodnad eller små hudblödningar
- Mörkare urin eller blekare avföring
- Gulning av huden eller det vita i ögonen (gulsot). Se även under anemi nedan, som kan leda till gulsot.

Detta kan inträffa medan du tar läkemedlet eller upp till några veckor efteråt.

Bröstsmärter i samband med allergiska reaktioner, som kan vara ett symtom på en allergisk hjärtinfarkt (Kounis syndrom).

Läkemedelsinducerat enterokolitissyndrom (DIES):

DIES har främst rapporterats hos barn som fått amoxicillin. Det är en specifik typ av allergisk reaktion med huvudsymtomet ihållande kräkningar (1-4 timmar efter intag av läkemedlet). Andra symtom kan vara buksmärter, letargi, diarré och lågt blodtryck.

Utslag med cirkulärt arrangerade blåsor med central skorpa eller liknande ett pärlband (lineär IgA-sjukdom).

Inflammation i hinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen (aseptisk meningit).

Om något av ovanstående gäller dig, sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart en läkare.

Ibland kan mindre allvarliga hudreaktioner uppstå som:

Ett lätt kliande utslag (runda, rosa-röda fläckar), "nässelutslag" på underarmar, ben, handflator och fotsulor. Detta förekommer ibland (kan påverka upp till 1 av 100 behandlade).

Om du märker något av detta, tala med din läkare, eftersom intaget av Amoxicillin-ratiopharm® måste avbrytas.

De andra biverkningarna är:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 behandlade)

Hudutslag
Illamående (nausea)
Diarré.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 behandlade)

Illamående (kräkningar).

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 behandlade)

Svampinfektion (en jästinfektion i vagina, munnen eller i hudveck), du kan få behandling mot svampinfektion av din läkare

Njurproblem

Anfall (kramper), visade sig hos patienter som tog höga doser eller hade njurproblem

Yrsel

Överaktivitet

Tungan kan bli gul, brun eller svart och få ett hårigt utseende

En överdriven nedbrytning av röda blodkroppar, vilket orsakar en form av anemi.

Symtom är: Trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulfärgning av huden och det vita i ögat

Lågt antal vita blodkroppar

Lågt antal celler som är involverade i blodkoagulation

Blodet kan ta längre tid än normalt att koagulera. Du kan märka det om du har näsblod eller skär dig.

Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)

Kristaller i urinen som kan leda till akut njurskada

Rapportering av biverkningar

Om du märker biverkningar, kontakta din läkare eller apotekare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (kontaktinformation se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att mer information om säkerheten för detta läkemedel blir tillgänglig.

Tyskland

Förbundsinstitutet för läkemedel och medicintekniska produkter
Avd. Läkemedelssäkerhet
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Webbplats: <http://www.bfarm.de>

Luxemburg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
eller Divisionen för farmaci och läkemedel
vid Hälsodirektionen
Webbplats: www.guichet.lu/pharmacovigilance

5. Hur är Amoxicillin-ratiopharm® att förvara?

Förvara detta läkemedel oåtkomligt för barn.

Du får inte använda detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blisterförpackningen efter "Används före"/"Anv. före". Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad.

Förvara vid högst 25 °C.

Förvara i originalförpackningen för att skydda innehållet mot fukt.

Kassera aldrig läkemedel i avloppet (t.ex. inte i toaletten eller handfatet). Fråga på ditt apotek hur läkemedlet ska kasseras om du inte längre använder det. Du bidrar därmed till att skydda miljön. Mer information finns på www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Amoxicillin-ratiopharm® innehåller

Den aktiva substansen är: Amoxicillin (som trihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 861 mg amoxicillin-trihydrat, motsvarande 750 mg amoxicillin.

Övriga innehållsämnen är:

Mikrokristallin cellulosa, karboximetylstärkelse-natrium (typ A) (Ph.Eur.), povidon K25, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hypromellos, talk, titandioxid (E 171).

Hur Amoxicillin-ratiopharm® ser ut och förpackningens innehåll

Vita till krämfärgade, ovala, kupade filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidor.

Amoxicillin-ratiopharm® 750 mg finns i förpackningar med 10, 20 och 30 filmdragerade tabletter.

Det är möjligt att inte alla förpackningsstorlekar marknadsförs.

Farmaceutisk företag

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren Tyskland

eller:

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Österrike

Denna bipacksedel uppdaterades senast i januari 2023.

Versionskod: Z14

AAllmänna anvisningar för användning av antibiotika

Antibiotika används för att behandla bakteriella infektioner. De är ineffektiva mot virala infektioner.

Ibland svarar en bakteriell infektion inte på en antibiotikabehandling. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna som orsakar infektionssjukdomen är resistenta mot det använda antibiotikat. Detta innebär att de kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikat.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika av olika skäl. Försiktig användning av antibiotika kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistenta.

Om din läkare ordinerar en antibiotikabehandling är den endast avsedd för att behandla din nuvarande sjukdom. Att följa följande anvisningar kommer att hjälpa till att förhindra uppkomsten av resistenta bakterier som kan hindra antibiotikans effekt.

1. Det är mycket viktigt att du tar antibiotikat i rätt dos, vid rätt tidpunkter och under rätt tid. Läs instruktionerna i bipacksedeln och fråga din läkare eller apotekare om du inte förstår något.
2. Du bör inte ta ett antibiotikum om det inte specifikt har ordinerats för dig och du bör endast använda det för att behandla den infektion det ordinerats för.

3. Du bör inte ta antibiotika som ordinerats till andra personer, även om de hade en liknande infektion.
4. Du bör inte ge antibiotika som ordinerats till dig till andra personer.
5. Om du har något av antibiotikat kvar efter att du avslutat behandlingen enligt din läkares anvisningar, bör du ta det oanvända antibiotikat till ett apotek för korrekt avfallshantering.

Transtoyou