

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Androcur 10, tabletit 10 mg
syproteroniasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mikä Androcur 10 on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MIKÄ ANDROCUR 10 ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Jokainen Androcur 10 -tabletti sisältää hormonia nimeltä syproteroniasetaatti. Hormoni on aine, joka vaikuttaa elimistössä hyvin erityisesti yhteen tai useampaan elimeen. Syproteroniasetaatilla on antiandrogeeninen vaikutus: se estää mieshormonien (androgeenien) vaikutusta. Androgeeneja muodostuu sekä miehillä että naisilla, vaikka naisilla paljon vähemmän.

Naisilla liiallinen androgeenien määrä ilmenee muun muassa liikakarvoitukseksi (hirsutismi; liiallinen karvankasvu miesmäisen mallin mukaan: jaloissa, käsivarsissa, rinnassa ja kasvoissa). Androgeenit stimuloivat myös talirauhasten toimintaa (rauhaset, jotka erittävät talia, rasvaista ainetta), mikä tekee ihosta rasvaisen ja voi aiheuttaa aknea (finnit).

Androcur 10:n syproteroniasetaatti vähentää liikakarvoitusta ja estää androgeenien stimuloivaa vaikutusta talirauhasiin. Tämän seurauksena iho muuttuu vähemmän rasvaiseksi ja finnejä (tukkeutuneita ja/tai tulehtuneita talirauhasia) syntyy vähemmän.

Androcur 10 -hoidon aikana munasarjojen toiminta estyy ja on mahdollista, että ovulaatiota (munasolun irtoamista) ei tapahdu. Kun lopetat Androcur 10:n käytön, munasarjojen toimintaa ei enää estetä.

- Androcur 10:ää käytetään liiallisen karvankasvun (hirsutismin) hoitoon. Lisäksi sitä käytetään vaikeissa aknen (finnit) muodoissa. Tätä lääkettä saa käyttää vain, jos alhaisempaa

syproteroniasetaattia sisältävillä lääkkeillä tai muilla hoidoilla ei ole saavutettu tyydyttäviä tuloksia.

2. MILLOIN ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ LÄÄKETTÄ TAI MILLOIN SINUN TULEE OLLA ERITYISEN VAROVAINEN?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- jos olet raskaana tai imetät
- jos sinulla on maksasairaus:
 - sinulla on maksasairaus, kuten esimerkiksi dubin-johnsonin oireyhtymä tai rotorin oireyhtymä
 - sinulla on hyvän- tai pahanlaatuinen kasvain maksassa tai olet aiemmin sairastanut sellaisen
 - sinulla on ollut keltaisuutta (idiopaattinen raskausikterus) tai jatkuvaa kutinaa (pruritus gestationis) aiemman raskauden aikana
- jos sinulla on meningeooma (yleensä hyvänlaatuinen kasvain aivojen ja kallon välissä) tai olet aiemmin sairastanut sellaisen.
- jos sinulla on ollut rakkulainen ihottuma (herpes gestationis)
- jos olet fyysisesti erittäin heikossa kunnossa ja olet menettänyt paljon painoa ja lihasvoimaa (kakeksia); tämä voi olla esimerkiksi silloin, jos sinulla on pahanlaatuinen kasvain
- jos sinulla on pitkäaikainen (krooninen) ja vakava masennus (olet (vakavasti) alakuloinen ja pessimistinen)
- jos sinulla on veren hyytymishäiriö (tromboembolinen sairaus) tai olet aiemmin sairastanut sellaisen
- jos sinulla on vaikea diabetes (sokeritauti), jossa verisuonesi ovat vaurioituneet
- jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen punasolujen sairaus)
- jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löydät kohdasta 6.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Huomio: Jos sinun on käytettävä Androcur 10:n lisäksi ehkäisytablettiä, sinun on otettava huomioon myös kyseisen pillerin haittavaikutukset, varoitukset, yhteisvaikutukset muiden (lääke)aineiden kanssa sekä tilanteet, joissa et saa käyttää kyseistä pilleriä. Noudata siksi myös ehkäisytabletin pakkausselosteen ohjeita.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ole erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa:

- jos olet nuori ja kuukautiskiirtosi (kuukautisten esiintyminen) ei ole vielä säännöllinen
- jos sinulla on diabetes (sokeritauti): Androcur 10:n käytön aikana sinun on käytävä useammin lääkärissä, koska käyttämiesi lääkkeiden (tabletit tai insuliini) tarve voi muuttua. Keskustele lääkärisi kanssa, onko lääkityksen määrää tarpeen muuttaa.

Syproteroniasetaatin käyttö on yhdistetty yleensä hyvänlaatuisen aivokasvaimen (meningeooman) kehittymiseen. Riski kasvaa erityisesti, kun käytät lääkettä pitkään (useita

vuosia) tai lyhyemmän aikaa suurina annoksina (25 mg päivässä tai enemmän). Jos sinulla todetaan meningeoma, lääkärisi lopettaa hoitosi syproteroniasetaatilla (katso kohta 'Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?'). Jos huomaat oireita, kuten näkökyvyn muutoksia (esimerkiksi kaksoiskuvia tai sumeaa näköä), kuulon heikkenemistä tai tinnitusta, hajuainin menetystä, päänsärkyä, joka pahenee ajan myötä, muistinmenetystä, epileptisiä kohtauksia, heikkoutta käsissä tai jaloissa, kerro siitä välittömästi lääkärillesi.

Ennen kuin aloitat Androcur 10:n käytön, lääkärisi tekee sinulle useita tutkimuksia. Sinulle tehdään rintojen tutkimus ja otetaan irtosolunäyte (kohdunkaulan limakalvon tutkimus). Ennen kuin voit aloittaa Androcur 10:n käytön, on varmistettava, ettet ole raskaana. Myös jos kuukautisesi jäävät pois Androcur 10:n käytön aikana, tehdään raskaustesti ennen kuin voit jatkaa hoitoa.

Ennen hoitoa ja sen aikana verenpaineesi ja painosi tarkistetaan, ja lääkäri tutkii virtsasi ja veresi sekä maksan ja lisämunuaisen toiminnan.

Pitkäaikaisessa Androcur 10:n käytössä suositellaan näiden tutkimusten toistamista kuuden kuukauden välein.

Potilailla, joita on hoidettu Androcur 10:llä, on esiintynyt maksan toimintahäiriöitä. Siksi lääkärisi tarkistaa maksan toiminnan ennen hoidon aloittamista ja sen aikana. Oireet, kuten keltaisuus, maksatulehdus (hepatiitti) ja maksan poikkeava toiminta, voivat viitata maksavaurioon. Jos maksavaurio todetaan, lääkärisi lopettaa Androcur 10 -hoitosi.

Ei ole viitteitä siitä, että Androcur 10 -hoidon lopettamisen jälkeen hedelmällisyys olisi heikentynyt.

Koska Androcur 10:n syproteroniasetaatti vähentää talin eritystä, ihosi voi kuivua.

Androcur 10:n käyttö yhdessä ehkäisytablettien kanssa

Androcur 10 -hoidon aikana et saa tulla raskaaksi. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä Androcur 10:tä yhdessä ehkäisytablettien kanssa. Jos sinun on käytettävä ehkäisytablettiä Androcur 10:n lisäksi, sinun on otettava huomioon myös kyseisen pillerin sivuvaikutukset, varoitukset, yhteisvaikutukset muiden (lääke)aineiden kanssa sekä tilanteet, joissa pilleriä ei saa käyttää. Noudata siksi myös ehkäisytablettien pakkausselosteen ohjeita.

Jos käytät Androcur 10:tä (yhdessä tai ilman ehkäisytablettiä) ja sinulla on sairaus, joka voi pahentua raskauden aikana, sinua on seurattava tarkemmin. Tämä koskee muun muassa seuraavia sairauksia: epilepsia, otoskleroosi (perinnöllinen kuurouden muoto), multippeliskleroosi (keskushermoston sairaus, joka aiheuttaa erilaisten kehon toimintojen heikkenemistä/menetystä), porfyria (häiriö veren punaisen väriaineen tuotannossa, mikä voi aiheuttaa mm. ihon yliherkkyyttä valolle), tetania (sairaus, jossa esiintyy lihaskramppeja), diabetes (sokeritauti) ja korkea verenpaine.

Jos sinun on oksennettava tai saat ripulin muutaman tunnin kuluessa Androcur 10:n ja ehkäisytablettien ottamisesta, noudata ehkäisytablettien pakkausselosteen erityisohjeita.

Jos saat pientä verenvuotoa (tiputteluvuoto: veripisaroita tai -läikkiä) ehkäisytablettien taukoviikon ulkopuolella, älä lopeta tablettien ottamista. Jos verenvuoto taukoviikon ulkopuolella on runsaampaa tai toistuu, on selvítettävä sen syy.

Jos sinulle on tehtävä leikkaus, sinun on pysyttävä vuodelevossa tai et saa kävellä (esimerkiksi jos jalkasi on kipsattu tai sidottu suonikohjujen hoidon vuoksi), suositellaan lopettamaan Androcur 10:n ja ehkäisytablettien käyttö 6 viikkoa ennen leikkausta tai (vuode)lepojaksoa. Tämä johtuu mahdollisesti lisääntyneestä tromboosiriskistä (verihyytymän muodostuminen, joka voi tukkia verisuonen).

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Androcur 10:n lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Jos sinun on käytettävä ehkäisytablettiä Androcur 10:n lisäksi, sinun on otettava huomioon myös (lääke)aineet, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Katso tästä ehkäisytablettien pakkausseloste.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetat, et saa käyttää Androcur 10:tä.

Epäiletkö olevasi raskaana tai haluatko tulla raskaaksi? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Androcur 10 -hoidon ensimmäisten viikkojen aikana voit joskus tuntea väsymystä ja keskittymiskykyysi voi heikentyä. Ota tämä huomioon liikenteessä ja koneita käyttäessäsi.

Androcur 10 sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että et siedä tiettyjä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. MITEN KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Ota tätä lääkettä aina täsmälleen lääkärisi tai apteekkisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Ota Androcur 10 -tabletit joka päivä suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa nesteen (veden) kanssa. Tabletit on nieltävä kokonaisina.

Yksi Androcur 10 -liuska sisältää 15 tablettia.

Milloin sinun tulee ottaa Androcur 10?

Hedelmällisessä iässä olevat naiset (noin 12–50-vuotiaat), joilla on säännöllinen kuukautiskierto

Jos et vielä käytä ehkäisytablettiä, lääkärisi antaa sinulle reseptin. Androcur 10 -hoidon aikana et saa tulla raskaaksi. Ehkäisytabletti antaa suojan raskaudelta ja (uudelleen) säännöllisen kuukautiskierron (säännöllisyys, jolla kuukautisesi tulevat).

Ennen kuin aloitat Androcur 10:n käytön, on varmistettava, ettet ole raskaana. Siksi voi olla tarpeen tehdä raskaustesti. Lääkärisi voi kertoa sinulle lisää tästä.

- Jos et vielä käytä ehkäisytablettiä, sinun tulee aloittaa ensimmäinen ehkäisytabletti kuukautistesi ensimmäisenä päivänä. Olet silloin suojattu raskaudelta ensimmäisestä päivästä lähtien.
- Ota lisäksi 1 tabletti Androcur 10:tä joka päivä 1. päivästä 15. päivään, kun käytät ehkäisytablettiä.
- Näiden viidentoista päivän jälkeen ota 16. päivästä 21. päivään vain ehkäisytablettiä. Nämä ovat liuskan viimeiset kuusi tablettiä.
- Sen jälkeen älä ota tablettiä 7 päivään. Näiden 7 tablettittoman päivän aikana (myös tauko- tai keskeytysviikko) pitäisi alkaa vuoto. Tämä niin sanottu 'tyhjennysvuoto' (kuukautisia muistuttava vuoto) alkaa yleensä taukoviikon 2. tai 3. päivänä.
- Aloita 8. päivänä viimeisen ehkäisytablettin jälkeen seuraava liuska ja Androcur 10:n ottaminen, vaikka vuoto ei olisi vielä ohi. Tämä tarkoittaa, että aloitat aina seuraavan liuskan samana viikonpäivänä, ja myös että tyhjennysvuoto tulee joka kuukausi suunnilleen samoina päivinä.

Vuodon puuttuminen

o Jos et saa vuotoa taukoviikon aikana, älä jatka uuden ehkäisytablettiliuskan tai Androcur 10:n käyttöä ennen kuin sinä tai lääkärisi on tehnyt raskaustestin ja on varmaa, ettet ole raskaana.

Hedelmällisessä iässä olevat naiset (noin 12–50-vuotiaat), joilla on epäsäännöllinen kuukautiskierto

Jos sinulla on epäsäännöllinen kuukautiskierto (et voi ennustaa, milloin kuukautisesi alkavat), tai jos et ole saanut kuukautisia muutamaan kuukauteen, on ensin varmistettava, ettet ole raskaana.

Jos et ole raskaana, voit aloittaa heti Androcur 10:n ja ehkäisytablettien käytön, mutta et ole suojattu raskaudelta ensimmäisestä käyttöpäivästä lähtien. Siksi sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ensimmäisten 7 päivän aikana, kun käytät Androcur 10:tä ja ehkäisytablettiä.

Ota 1 tabletti Androcur 10:tä joka päivä 1.–15. päivänä, kun käytät ehkäisytablettiäsi. Noudata jatkohoidossa ohjeita kohdassa 'Hedelmällisessä iässä olevat naiset (...) säännöllisellä kuukautiskierrolla'.

Vaihdevuosi-ikäiset naiset

Jos olet vaihdevuosissa, sinun ei tarvitse käyttää Androcur 10:tä yhdessä ehkäisytablettien kanssa. Lääkärisi kertoo, kuinka monta tablettiä sinun tulee käyttää.

Naiset, joilta on poistettu kohtu

Jos kohtusi on poistettu kirurgisesti, sinun ei tarvitse käyttää Androcur 10:tä yhdessä ehkäisytablettien kanssa. Lääkärisi kertoo, kuinka monta tablettiä sinun tulee käyttää.

Lääkärisi kertoo, kuinka kauan sinun tulee käyttää Androcur 10:tä. Hoidon kesto Androcur 10:llä riippuu oireiden vakavuudesta (liikakarvoitus, akne tai rasvainen iho). Yleensä liikakarvoituksen kohdalla parannus näkyy 6–9 kuukauden kuluttua. Aknen ja rasvaisen ihon kohdalla tämä tapahtuu usein aikaisemmin.

Jos huomaat, että Androcur 10 vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Oletko käyttänyt tätä lääkettä liikaa?

Ei ole raportoitu vakavista haittavaikutuksista, kun on otettu paljon Androcur 10 -tabletteja samanaikaisesti.

Jos olet käyttänyt liikaa Androcur 10:tä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohdat ottaa Androcur 10 -tabletin, tämä voi heikentää hoidon tulosta. Unohtaminen voi myös johtaa epäsäännölliseen verenvuotoon (tiputteluvuoto tai kevyt vuoto). Jätä unohtuneet Androcur 10 -tabletit väliin (älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen tabletin) ja ota seuraavat Androcur 10 -tabletit tavanomaiseen aikaan yhdessä ehkäisytablettien kanssa.

Mitä tehdä, jos unohdat ehkäisytablettien

- Jos olet alle 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisesta, ehkäisytablettien teho ei ole heikentynyt. Ota tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit taas tavanomaiseen aikaan.
- Jos olet yli 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisesta, ehkäisytablettien teho voi olla heikentynyt. Noudata tässä tapauksessa ehkäisytablettien pakkausselosteessa olevia ohjeita unohtuneen pillerin suhteen.

Mitä tehdä odottamattoman verenvuodon yhteydessä

Jos kolmen viikon aikana, jolloin otat ehkäisytablettiä ja/tai Androcur 10:tä, ilmenee odottamatonta verenvuotoa (tiputteluvuoto tai läpäisyvuoto), älä lopeta tablettien ottamista.

Epäsäännöllinen verenvuoto loppuu yleensä, kun kehosi tottuu kyseiseen pilleriin (noin 3 liuskan jälkeen). Jos se kestää pidempään, pahenee tai alkaa uudelleen, ota yhteyttä lääkäriisi.

Mitä tehdä, jos odotettu vuoto jää pois

Jos et saa tyhjennysvuotoa taukoviikolla sen jälkeen, kun olet unohtanut Androcur 10:n ja ehkäisytablettien, saatat olla raskaana. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi. Älä jatka Androcur 10:n ja ehkäisytablettien käyttöä ennen kuin lääkärisi on todennut, ettet ole raskaana.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Jos lopetat Androcur 10:n käytön, ne vaivat, joiden vuoksi aloitit tämän lääkkeen, voivat palata.

Muut tiedot erityisille potilasryhmille

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Androcur 10 saa käyttää vain naispuolisilla potilailla murrosiän jälkeen.

lääkärit potilaat

Androcur 10 on tarkoitettu vain hedelmällisessä iässä oleville naisille.

Potilaat, joilla on heikentynyt maksan toiminta

Androcur 10:ää ei saa käyttää, jos sinulla on maksasairaus (niin kauan kuin maksasi ei toimi riittävästi). Katso myös kohta 'Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?'.

Potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta

Ei ole tietoa siitä, että annosta tulisi muuttaa, jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikille niitä ei tulekaan. Kerro heti lääkärillesi, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista oireista:

- äkillinen voimakas kipu ylävatsassa, joka ei mene nopeasti ja itsestään ohi.
- pahoinvointi, kuume, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kutina koko kehossa, ihon ja silmien keltaisuus, vaaleanvärisen uloste, tummanvärisen virtsa. Nämä voivat olla merkkejä maksamyrkytyksestä, mukaan lukien maksan tulehdus (hepatiitti).

Androcur 10 -käyttäjillä ilmoitetut haittavaikutukset on esitetty alla:

Harvoin (esiintyy alle yhdellä 1000 käyttäjästä):

- meningeoma (yleensä hyvänlaatuinen kasvain aivokalvojen ja kallon välissä)

Tuntematon (saatavilla olevien tietojen perusteella esiintymistiheyttä ei voida arvioida):

- hyvänlaatuiset ja pahanlaatuiset maksakasvaimet
- yliherkkyysreaktio
- painonnousu tai painonlasku
- epänormaali maksan toiminta, keltaisuus, maksan tulehdus (hepatiitti)
- masentunut mieliala, levottomuus (tilapäinen), libidon väheneminen (seksuaalinen halu), libidon lisääntyminen (seksuaalinen halu)
- verenvuoto vatsaontelossa
- ihottuma
- herkät rinnat, ovulaation estyminen, kevyt verenvuoto (lisätietoja kevyestä verenvuodosta katso kohta 2 'Androcur 10:n käyttö yhdessä ehkäisytablettien kanssa' alakohdassa 'Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?')

Yhdistelmähoidossa ehkäisytablettien kanssa ovulaatio (munasolun irtoaminen) estyy, jolloin olet hedelmätön hoidon aikana. Lisäksi voi esiintyä väsymystä.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan, verkkosivusto: www.fimea.fi. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. MITEN SÄILYTÄT TÄMÄN LÄÄKKEEN?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se löytyy pakkauksen etiketistä 'EXP'. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Älä huuhtele lääkkeitä viemäriin tai wc:hen. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, jotta ne eivät päädy ympäristöön.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on syproteroniasetaatti. Jokainen tabletti sisältää 10 milligrammaa syproteroniasetaattia.
- Muut tämän lääkkeen aineet ovat: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, polyvidoni 25 (E1201), kolloidinen vedetön piidioksidi (E551) ja magnesiumstearaatti (E470b).

Miltä Androcur 10 näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

- Androcur 10 -tabletit ovat valkoisia tai vaaleankeltaisia tabletteja, joissa on toisella puolella jakourre ja toisella puolella kirjaimet 'BW' kuusikulmiossa. Tabletit ovat pyöreitä ja niiden halkaisija on 7 millimetriä.
- Androcur 10 on saatavana 15 tabletin pakkauksissa läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Rekisteröinnin haltija:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Pakkaaja (katso ulkopakkauksen etiketti): Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam tai Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Valmistaja:

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Döbereiner Strasse, 20

99427 Weimar

Saksa

Rekisteröity numerolla

RVG 120911//09078

Androcur 10, tabletit 10 mg (Portugali)

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty elokuussa 2024.

BS001200 – mmjj / 230620-0620_ADAA9B_A