

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Androcur 10, tabletės 10 mg
ciproterono acetatas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jei turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Jei pasireiškia šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje, arba jei pasireiškia šalutinis poveikis, nenurodytas šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Androcur 10 ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. KAS YRA ANDROCUR 10 IR KAM JIS VARTOJAMAS?

Kiekvienoje Androcur 10 tabletėje yra hormono ciproterono acetato. Hormonas yra medžiaga, kuri organizme turi labai specifinį poveikį vienam ar daugiau organų. Ciproterono acetatas turi antiandrogeninį poveikį: jis slopina vyriškų hormonų (androgenų) veikimą. Androgenai gaminami tiek vyrų, tiek moterų organizme, nors moterims jų yra daug mažiau.

Moterims per didelis androgenų kiekis pasireiškia, pavyzdžiui, per dideliu plaukuotumu (hirsutizmu; per didelis plaukų augimas pagal vyrišką modelį: ant kojų, rankų, krūtinės ir veido). Androgenai taip pat skatina riebalinių liaukų veiklą (liaukos, kurios išskiria riebalus, riebalinę medžiagą), todėl oda tampa riebi ir gali atsirasti spuogų (spuogai).

Ciproterono acetatas Androcur 10 mažina per didelį plaukuotumą ir slopina androgenų stimuliuojantį poveikį riebalinėms liaukoms. Dėl to oda tampa mažiau riebi ir atsiranda mažiau spuogų (tai yra užsikimšusios ir/arba uždegusios riebalinės liaukos).

Gydant Androcur 10, slopinama kiaušidžių veikla ir gali neįvykti ovuliacija. Nustojus vartoti Androcur 10, kiaušidžių veikla nebebus slopinama.

- Androcur 10 yra naudojamas per didelio plaukuotumo (hirsutizmo) gydymui. Be to, jis naudojamas sunkių spuogų formų (spuogų) atvejais. Šį vaistą galite naudoti tik tada, kai nepasiekiami patenkinamų rezultatų su vaistais, kuriuose yra mažesnė ciproterono acetato dozė, arba su kitais gydymo būdais.

2. KADA NEGALITE NAUDOTI ŠIO VAISTO ARBA TURITE BŪTI YPAČ ATSARGŪS?

Kada negalite naudoti šio vaisto?

- jei esate nėščia arba maitinate krūtimi
- jei turite kepenų sutrikimą:
turite kepenų ligą, pavyzdžiui, Dubin-Johnson sindromą arba Rotor sindromą
turite gerybinį ar piktybinį kepenų naviką arba jį turėjote praeityje
ankstesnio nėštumo metu turėjote gelta (idiopatinė nėštumo gelta) arba
nuolatinį niežulį (pruritus gestationis)
- jei turite meningiomą (dažniausiai gerybinis navikas tarp smegenų ir kaukolės) arba jį
turėjote praeityje.
- jei turėjote pūslelinį bėrimą (herpes gestationis)
- jei esate fiziškai labai nusilpęs ir praradote daug svorio bei raumenų jėgos (kacheksija); tai
gali būti, jei turite piktybinį naviką
- jei turite ilgalaikę (lėtinę) ir sunkią depresiją (jaučiatės (smarkiai) prislėgtas ir pesimistiškas)
- jei turite kraujo krešėjimo sutrikimą (tromboembolinę ligą) arba jį turėjote
- jei turite sunkią diabeto (cukrinio diabeto) formą, kurioje pažeisti kraujagyslės
- jei turite pjautuvinę anemiją (paveldima raudonųjų kraujo kūnelių liga)
- jei esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Jei abejojate, prieš naudodami šį vaistą, kreipkitės į savo gydytoją.

Atkreipkite dėmesį: jei be Androcur 10 taip pat turite vartoti kontraceptines tabletes, turite atsižvelgti į šių tablečių šalutinius poveikius, įspėjimus, sąveiką su kitais (vaistais) ir situacijas, kuriose negalite jų vartoti. Todėl laikykitės ir atitinkamų kontraceptinių tablečių pakuotės lapelio nurodymų.

Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo vaistu?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Būkite ypač atsargūs vartodami šį vaistą:

- jei esate jaunas ir jūsų menstruacijų ciklas (menstruacijų atsiradimas) dar nėra reguliarus
- jei sergate cukriniu diabetu: vartojant Androcur 10, dažniau turėsite lankytis pas gydytoją, nes gali keistis vaistų, kuriuos vartojate (tabletes ar insulinas), poreikis. Pasitarkite su gydytoju, ar reikia koreguoti vaistų kieki.

Cyproteronacetato vartojimas siejamas su paprastai gerybinio smegenų naviko (meningiomos) atsiradimu. Rizika ypač padidėja, jei vaistą vartojate ilgą laiką (kelerius metus) arba trumpesnę laiką didelėmis dozėmis (25 mg per dieną ar daugiau). Jei jums nustatoma meningioma, gydytojas nutrauks gydymą cyproteronacetatu (žr. skyrių „Kada negalima vartoti šio vaisto?“). Jei pastebite tokius simptomus kaip regėjimo pokyčiai (pvz., dvejinimasis ar neryškus matymas), klausos praradimas ar spengimas ausyse, uoslės praradimas, galvos skausmas, kuris laikui bėgant stiprėja, atminties praradimas, epilepsijos priepuoliai, rankų ar kojų silpnumas, nedelsdami praneškite apie tai savo gydytojui.

Prieš pradėdami vartoti Androcur 10, gydytojas atliks įvairius tyrimus. Jums bus atliktas krūtų tyrimas ir gimdos kaklelio gleivinės tyrimas (tepinėlis). Prieš pradėdami vartoti Androcur 10, turi

būti nustatyta, kad nesate nėščia. Net jei gydymo Androcur 10 metu menstruacijos išnyksta, prieš tęsiant gydymą bus atliktas nėštumo testas.

Prieš ir gydymo metu bus tikrinamas jūsų kraujospūdis ir svoris, gydytojas ištirs jūsų šlapimą ir kraują bei kepenų ir antinksčių žievės funkciją.

Ilgalaikio Androcur 10 vartojimo metu rekomenduojama šiuos tyrimus kartoti kas 6 mėnesius.

Pacientams, gydytiems Androcur 10, buvo pastebėti kepenų funkcijos sutrikimai. Todėl gydytojas patikrins jūsų kepenų funkciją prieš pradėdamas gydymą ir jo metu. Simptomai, tokie kaip gelta, kepenų uždegimas (hepatitas) ir nenormali kepenų funkcija, gali rodyti kepenų pažeidimą. Jei nustatoma, kad atsirado kepenų pažeidimas, gydytojas nutrauks gydymą Androcur 10.

Nėra įrodymų, kad nutraukus gydymą Androcur 10 vaisingumas būtų neigiamai paveiktas.

Kadangi Androcur 10 esantis cyproteronacetatas mažina riebalų išsiskyrimą, gali būti, kad jūsų oda taps sausa.

Androcur 10 vartojimas kartu su kontraceptinėmis tabletėmis

Gydymo Androcur 10 metu negalite pastoti. Vaisingo amžiaus moterims Androcur 10 vartojimas turi būti derinamas su kontraceptinėmis tabletėmis. Jei kartu su Androcur 10 turite vartoti kontraceptines tabletes, taip pat turite atsižvelgti į šių tablečių šalutinį poveikį, įspėjimus, sąveiką su kitais (vaistais) ir situacijas, kai jų negalima vartoti. Todėl laikykitės ir atitinkamų kontraceptinių tablečių pakuotės lapelio nurodymų.

Jei vartojate Androcur 10 (su kontraceptinėmis tabletėmis ar be jų) ir turite būklę, kuri gali pablogėti nėštumo metu, turite būti papildomai stebimi. Tai apima šias būkles: epilepsija, otosklerozė (paveldima kurtumo forma), išsėtinė sklerozė (centrinės nervų sistemos liga, dėl kurios sumažėja/atsiranda įvairių kūno funkcijų sutrikimų), porfirija (kraujodaros sutrikimas, dėl kurio oda gali tapti jautri šviesai), tetanija (būklė su raumenų spazmų priepuoliais), cukrinis diabetas ir padidėjęs kraujospūdis.

Jei per kelias valandas po Androcur 10 ir kontraceptinių tablečių vartojimo turite vemti ar viduriuojate, turite laikytis specialių nurodymų iš kontraceptinių tablečių pakuotės lapelio. Jei ne per kontraceptinių tablečių pertraukos savaitę pastebite lengvą kraujavimą (dėmėjimą: kraujo lašelius ar dėmeles), neturėtumėte nutraukti tablečių vartojimo. Jei kraujavimas ne per pertraukos savaitę yra stipresnis arba kartojasi, reikia ištirti jo priežastį.

Jei turite būti operuojami, tam tikrą laiką turite laikytis lovos režimo arba negalite vaikščioti (pavyzdžiui, jei viena iš jūsų kojų yra gipsuota ar aprišta dėl venų varikozės gydymo), rekomenduojama nutraukti Androcur 10 ir kontraceptinių tablečių vartojimą likus 6 savaitėms iki operacijos ar (lovos) poilsio laikotarpio. Tai susiję su galimai padidėjusia trombozės (kraujo krešulio susidarymo, dėl kurio gali būti užblokuota kraujagyslė) rizika.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus kartu su Androcur 10, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad artimiausiu metu vartosite kitus vaistus? Praneškite apie tai savo gydytojui arba vaistininkui.

Jei kartu su Androcur 10 turite vartoti kontraceptines tabletes, taip pat turite atsižvelgti į vaistus, kurie gali su jomis sąveikauti. Dėl to žiūrėkite kontraceptinių tablečių pakuotės lapelį.

Nėštumas ir žindymas

Jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, Androcur 10 vartoti negalima.

Manote, kad esate nėščia arba norite pastoti? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pirmosiomis Androcur 10 gydymo savaitėmis galite jaustis pavargę ir jūsų koncentracija gali sumažėti. Atsižvelkite į tai vairuodami ir valdydami mechanizmus.

Androcur 10 sudėtyje yra laktozės

Jei gydytojas jums pasakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

3. KAIP VARTOTI ŠĮ VAISTĄ?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Androcur 10 tabletes vartokite kasdien maždaug tuo pačiu metu, jei reikia, su šiek tiek skysčio (vandens). Tabletes reikia nuryti nesukramtytas.

Vienoje Androcur 10 juostelėje yra 15 tablečių.

Kada reikia vartoti Androcur 10?

Vaisingo amžiaus moterys (maždaug nuo 12 iki 50 metų) su reguliariu menstruaciniu ciklu

Jei dar nevartojate kontraceptinių tablečių, gydytojas jums išrašys receptą. Gydymo Androcur 10 metu negalite pastoti. Kontraceptinės tabletės suteikia apsaugą nuo nėštumo ir (vėl) reguliuoja menstruacinį ciklą (reguliarumą, kuriuo gaunate menstruacijas).

Prieš pradėdami vartoti Androcur 10, turite būti tikri, kad nesate nėščia. Todėl gali prireikti atlikti nėštumo testą. Gydytojas gali jums apie tai daugiau papasakoti.

- Jei dar nevartojate kontraceptinių tablečių, pirmąją menstruacijų dieną pradėkite vartoti pirmąją kontraceptinės tabletės tabletę. Nuo pirmosios dienos būsite apsaugota nuo nėštumo.
- Be to, nuo 1 iki 15 dienos, kai vartojate kontraceptines tabletes, kasdien vartokite po 1 Androcur 10 tabletę.
- Po šių penkiolikos dienų nuo 16 iki 21 dienos vartokite tik kontraceptines tabletes. Tai yra paskutinės šešios juostelės tabletės.
- Tada 7 dienas nevartokite tablečių. Per šias 7 dienas be tablečių (dar vadinamas sustojimo ar pertraukos savaitė) turėtų prasidėti kraujavimas. Šis vadinamasis „nutraukimo

kraujavimas“ (menstruacijų tipo kraujavimas) paprastai prasideda 2 arba 3 pertraukos savaitės dieną.

- Pradėkite 8 dieną po paskutinės kontraceptinės tabletės vartoti kitą juostelę ir Androcur 10, net jei kraujavimas dar nesibaigė.
Tai reiškia, kad kiekvieną savaitės dieną pradėsite naują pakuotę, ir taip pat, kad kraujavimas kiekvieną mėnesį bus maždaug tomis pačiomis dienomis.

Kraujavimo nebuvimas

o Jei per pertraukos savaitę kraujavimas neįvyksta, negalite pradėti naujos kontraceptinių tablečių pakuotės ar Androcur 10, kol jūs ar jūsų gydytojas neatlikote nėštumo testo ir nėra tikrumo, kad nesate nėščia.

Moterys vaisingo amžiaus (maždaug nuo 12 iki 50 metų) su nereguliaru menstruaciniu ciklu
Jei turite nereguliarų menstruacinį ciklą (negalite numatyti, kada prasidės menstruacijos), arba jei kelis mėnesius neturėjote menstruacijų, pirmiausia reikia įsitikinti, kad nesate nėščia.

Jei nesate nėščia, galite iš karto pradėti vartoti Androcur 10 ir kontraceptines tabletes, tačiau nuo pirmosios vartojimo dienos nebūsite apsaugota nuo nėštumo. Todėl pirmąsias 7 dienas, kai vartojate Androcur 10 ir kontraceptines tabletes, turite naudoti papildomą kontracepcijos priemonę (pavyzdžiui, prezervatyvą).

Nuo 1 iki 15 dienos, kai vartojate kontraceptines tabletes, kasdien vartokite po 1 Androcur 10 tabletę.

Tolimesniam gydymui sekite nurodymus skyriuje 'Moterys vaisingo amžiaus (...) su reguliaru menstruaciniu ciklu'.

Moterys menopauzėje

Jei esate menopauzėje, Androcur 10 nereikia vartoti kartu su kontraceptinėmis tabletėmis. Jūsų gydytojas pasakys, kiek tablečių turite vartoti.

Moterys, kurios neturi gimdos

Jei jūsų gimda buvo chirurgiškai pašalinta, Androcur 10 nereikia vartoti kartu su kontraceptinėmis tabletėmis. Jūsų gydytojas pasakys, kiek tablečių turite vartoti.

Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turite vartoti Androcur 10. Gydymo Androcur 10 trukmė priklauso nuo simptomų sunkumo (perteklinio plaukuotumo, spuogų ar riebi oda). Paprastai perteklinio plaukuotumo atveju pagerėjimas matomas po 6-9 mėnesių. Spuogų ir riebios odos atveju tai dažnai būna anksčiau.

Jei pastebėjote, kad Androcur 10 veikia per stipriai arba per silpnai, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Nėra pranešimų apie rimtus žalingus padarinius, kai vienu metu suvartojama daug Androcur 10 tablečių.

Jei vartojote per daug Androcur 10, nedelsdami susisiekite su savo gydytoju ar vaistininku.

Ar pamiršote vartoti šį vaistą?

Jei pamiršote išgerti Androcur 10 tabletę, tai gali sumažinti gydymo efektyvumą. Pamiršta tabletė taip pat gali sukelti nereguliarų kraujavimą (kraujavimas dėmėmis arba lengvas kraujavimas). Praleiskite pamirštas Androcur 10 tabletes (negerkite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte pamirštą tabletę) ir toliau vartokite kitas Androcur 10 tabletes įprastu laiku kartu su kontraceptinėmis tabletėmis.

Ką daryti, jei pamiršote išgerti kontraceptinę tabletę

- Jei pavėlavote išgerti tabletę mažiau nei 12 valandų, kontraceptinės tabletės veiksmingumas nesumažėja. Išgerkite tą tabletę, kai tik prisiminsite, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku.
- Jei pavėlavote išgerti tabletę daugiau nei 12 valandų, kontraceptinės tabletės veiksmingumas gali būti sumažėjęs. Tokiu atveju laikykitės nurodymų dėl pamirštos tabletės, pateiktų jūsų kontraceptinių tablečių pakuotės lapelyje.

Ką daryti netikėto kraujavimo atveju

Jei per tris savaites, kai vartojate kontraceptines tabletes ir/arba Androcur 10, atsiranda netikėtas kraujavimas (dėmėtas ar prasiveržimo kraujavimas), nenustokite vartoti tablečių.

Nereguliarus kraujavimas paprastai sustoja, kai jūsų kūnas pripranta prie atitinkamos tabletės (po maždaug 3 pakuočių). Jei tai trunka ilgiau, pablogėja arba vėl prasideda, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Ką daryti, jei laukiamas kraujavimas neįvyksta

Jei per pertraukos savaitę negaunate kraujavimo, kai pamiršote Androcur 10 ir kontraceptines tabletes, galite būti nėščia. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nepradėkite vartoti Androcur 10 ir kontraceptinių tablečių, kol gydytojas nepatvirtins, kad nesate nėščia.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Jei nustojate vartoti Androcur 10, simptomai, dėl kurių pradėjote vartoti šį vaistą, gali vėl pasireikšti.

Kita informacija specialioms pacientų grupėms

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Androcur 10 gali būti vartojamas tik moterims po brendimo.

Vyresnio amžiaus pacientai

Androcur 10 skirtas tik vaisingo amžiaus moterims.

Pacientai su sutrikusia kepenų funkcija

Androcur 10 negalima vartoti, jei turite kepenų sutrikimų (kol jūsų kepenys neveikia pakankamai gerai). Taip pat žiūrėkite skyrių 'Kada negalima vartoti šio vaisto?'.

Pacientai su sutrikusia inkstų funkcija

Nėra duomenų, kad dozę reikėtų koreguoti, jei turite sutrikusią inkstų funkciją.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Nedelsdami praneškite savo gydytojui, jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų:

- staiga atsiradęs stiprus skausmas viršutinėje pilvo dalyje, kuris greitai nepraeina savaime.
- blogos savijautos jausmas, karščiavimas, pykinimas, vėmimas, apetito stoka, niežulys visame kūne, odos ir akių pageltimas, šviesios spalvos išmatos, tamsios spalvos šlapimas. Tai gali būti kepenų apsinuodijimo požymiai, įskaitant kepenų uždegimą (hepatitą).

Žemiau pateikiamas šalutinis poveikis, apie kurį pranešta Androcur 10 vartotojams:

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų):

- meningioma (dažniausiai gerybinis navikas tarp smegenų ir kaukolės audinių sluoksnio)

Nežinomas (remiantis turimais duomenimis, dažnis negali būti nustatytas):

- gerybiniai ir piktybiniai kepenų navikai
- padidėjusio jautrumo reakcija
- svorio padidėjimas arba sumažėjimas
- nenormalus kepenų veikimas, gelta, kepenų uždegimas (hepatitas)
- depresinė nuotaika, neramumas (laikinas), libido sumažėjimas (seksualinio potraukio sumažėjimas), libido padidėjimas (seksualinio potraukio padidėjimas)
- kraujavimas pilvo ertmėje
- odos bėrimas
- jautrios krūtys, ovuliacijos slopinimas, lengvas kraujavimas (daugiau informacijos apie lengvą kraujavimą žr. 2 skyriuje po 'Androcur 10 vartojimas kartu su kontraceptine tablete' poskyryje 'Kada turėtumėte būti ypač atsargūs vartodami šį vaistą?')

Kombinuoto gydymo su kontraceptine tablete metu ovuliacija (kiaušialąstės išsiskyrimas) yra slopinama, todėl gydymo metu esate nevaisinga. Be to, gali pasireikšti nuovargis.

Šalutinio poveikio pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimam šalutiniam poveikiui, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinio poveikio centrą Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. KAIP LAIKYTI ŠĮ VAISTAŲ?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės etiketės po 'EXP'. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Vaistų neišpilkite į kriauklę ar tualetą. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.

6. PAKUOTĖS TURINYS IR KITA INFORMACIJA

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra ciproterono acetatas. Kiekvienoje tabletėje yra 10 miligramų ciproterono acetato.
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra: laktozės monohidratas, kukurūzų krakmolos, polividonas 25 (E1201), koloidinis bevandenis silicio dioksidas (E551) ir magnio stearatas (E470b).

Kaip atrodo Androcur 10 ir kiek jo yra pakuotėje?

- Androcur 10 tabletės yra baltos iki šviesiai gelsvos spalvos, su lūžio linija vienoje pusėje ir raidėmis 'BW' šešiakampyje kitoje pusėje. Tabletės yra apvalios ir jų skersmuo yra 7 milimetrai.
- Androcur 10 tiekiamas pakuotėse po 15 tablečių lizdinėje plokštelėje.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Registracijos turėtojas:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Perpakavėjas (žr. etiketę ant išorinės pakuotės): Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam arba

Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Gamintojas:

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Döbereiner Strasse, 20

99427 Weimar

Vokietija

Registruota registre pagal

RVG 120911//09078 Androcur 10, tabletės 10 mg (Portugalija)

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2024 m. rugpjūčio mėn.

BS001200 – mmjj / 230620-0620_ADAA9B_A