

ULOTKA: INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Androcur 10, tabletki 10 mg
cyproteron octan

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed zastosowaniem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna ponownie.
- Masz pytania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość ulotki

1. Co to jest Androcur 10 i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ANDROCUR 10 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Każda tabletki Androcur 10 zawiera hormon cyproteron octan. Hormon to substancja, która w organizmie wywiera bardzo specyficzne działanie na jeden lub więcej narządów. Hormon cyproteron octan ma działanie antyandrogenne: hamuje działanie męskich hormonów (androgenów). Androgeny są wytwarzane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, choć u kobiet w znacznie mniejszym stopniu.

U kobiet nadmiar androgenów objawia się między innymi w postaci nadmiernego owłosienia (hirsutyzm; nadmierny wzrost włosów według męskiego wzorca: na nogach, ramionach, klatce piersiowej i twarzy). Androgeny stymulują również działanie gruczołów łojowych (gruczołów wydzielających łoż, substancję tłustą), co powoduje, że skóra staje się tłusta i może pojawić się trądzik (pryszczki).

Cyproteron octan w Androcur 10 zmniejsza nadmierne owłosienie i hamuje stymulujące działanie androgenów na gruczoły łojowe. Dzięki temu skóra staje się mniej tłusta i pojawia się mniej pryszczki (są to zablokowane i/lub zapalne gruczoły łojowe).

Podczas leczenia Androcur 10 działanie jajników jest tłumione i może nie wystąpić owulacja. Po zaprzestaniu stosowania Androcur 10 działanie jajników nie jest już hamowane.

- Androcur 10 jest stosowany w leczeniu nadmiernego owłosienia (hirsutyzm). Ponadto jest stosowany w ciężkich postaciach trądziku (pryszczki). Możesz stosować ten lek tylko wtedy, gdy

nie uzyskano zadowalających wyników przy użyciu leków zawierających niższą dawkę octanu cyproteronu lub innych terapii.

2. KIEDY NIE MOŻESZ STOSOWAĆ TEGO LEKU LUB MUSISZ BYĆ SZCZEGÓLNIIE OSTROŻNY?

Kiedy nie możesz stosować tego leku?

- jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią
- jeśli masz zaburzenia wątroby:
 - masz chorobę wątroby, taką jak zespół Dubina-Johnsona lub zespół Rotor
 - masz łagodny lub złośliwy guz wątroby, lub miałeś go w przeszłości
 - miałeś żółtaczkę (idiopatyczna żółtaczka ciążowa) lub uporczywy świąd (pruritus gestationis) podczas wcześniejszej ciąży
- jeśli masz oponiaka (zazwyczaj łagodny guz w oponach mózgowych) lub miałeś go w przeszłości.
- jeśli miałeś wysypkę z pęcherzami (herpes gestationis)
- jeśli jesteś fizycznie bardzo osłabiony i straciłeś dużo wagi i siły mięśniowej (kacheksja); może to być na przykład w przypadku, gdy masz złośliwy nowotwór
- jeśli masz przewlekłą (długotrwałą) i ciężką depresję (jesteś (ciężko) przygnębiony i pesymistyczny)
- jeśli masz zaburzenia krzepnięcia krwi (choroba zakrzepowo-zatorowa) lub miałeś je w przeszłości
- jeśli masz ciężką postać cukrzycy, w której uszkodzone są naczynia krwionośne
- jeśli masz anemię sierpowatą (dziedziczne schorzenie czerwonych krwinek)
- jeśli jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.

W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem przed użyciem tego leku.

Uwaga: Jeśli oprócz Androcur 10 musisz stosować także pigułkę antykoncepcyjną, musisz również wziąć pod uwagę działania niepożądane, ostrzeżenia, interakcje z innymi lekami tej pigułki oraz sytuacje, w których nie możesz jej stosować. Dlatego również postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami z ulotki pigułki antykoncepcyjnej.

Kiedy musisz być szczególnie ostrożny z tym lekiem?

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu tego leku:

- jeśli jesteś młoda i twój cykl menstruacyjny (występowanie miesiączek) nie jest jeszcze regularny
- jeśli masz cukrzycę: podczas stosowania Androcur 10 będziesz musiała częściej kontrolować się u lekarza, ponieważ zapotrzebowanie na leki, które stosujesz (tabletki lub insulina), może się zmienić. Skonsultuj się z lekarzem, czy konieczne jest dostosowanie dawki leków.

Stosowanie octanu cyproteronu wiąże się z ryzykiem wystąpienia zazwyczaj łagodnego guza mózgu (oponiaka). Ryzyko to wzrasta szczególnie, gdy lek stosowany jest przez dłuższy czas (wiele lat) lub przez krótszy czas w wysokich dawkach (25 mg dziennie lub więcej). Jeśli u Ciebie

zostanie zdiagnozowany oponiak, lekarz przerwie leczenie octanem cyproteronu (patrz punkt 'Kiedy nie wolno stosować tego leku?'). Jeśli zauważysz objawy, takie jak zmiany w widzeniu (np. podwójne widzenie lub niewyraźne widzenie), utrata słuchu lub szumy uszne, utrata węchu, ból głowy nasilający się z czasem, utrata pamięci, napady padaczkowe, osłabienie rąk lub nóg, natychmiast powiedz o tym lekarzowi.

Przed rozpoczęciem przyjmowania Androcur 10 lekarz przeprowadzi różne badania. Zostanie przeprowadzone badanie piersi oraz wykonany wymaz (badanie śluzówki szyjki macicy). Przed rozpoczęciem stosowania Androcur 10 należy upewnić się, że nie jesteś w ciąży. Nawet jeśli podczas leczenia Androcur 10 miesiączka zaniknie, przed kontynuacją leczenia zostanie wykonany test ciążowy.

Przed i w trakcie leczenia będą kontrolowane twoje ciśnienie krwi i waga, a lekarz zleci badanie moczu, krwi oraz funkcji wątroby i kory nadnerczy.

Przy długotrwałym stosowaniu Androcur 10 zaleca się powtarzanie tych badań co 6 miesięcy.

U pacjentów leczonych Androcur 10 występowały zaburzenia funkcji wątroby. Dlatego lekarz będzie kontrolował funkcję wątroby przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania. Objawy takie jak żółtaczka, zapalenie wątroby (hepatitis) i nieprawidłowa funkcja wątroby mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby. Jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie wątroby, lekarz przerwie leczenie Androcur 10.

Nie ma dowodów na to, że po zaprzestaniu leczenia Androcur 10 płodność jest negatywnie wpływana.

Ponieważ octan cyproteronu w Androcur 10 zmniejsza wydzielanie sebum, możliwe jest, że twoja skóra stanie się sucha.

Stosowanie Androcur 10 w połączeniu z pigułką antykoncepcyjną

Podczas leczenia Androcur 10 nie wolno zająć w ciążę. U kobiet w wieku rozrodczym stosowanie Androcur 10 musi być połączone z pigułką antykoncepcyjną. Jeśli oprócz Androcur 10 musisz stosować pigułkę antykoncepcyjną, musisz również uwzględnić działania niepożądane, ostrzeżenia, interakcje z innymi lekami tej pigułki oraz sytuacje, w których nie wolno jej stosować. Dlatego postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami z ulotki pigułki antykoncepcyjnej.

Jeśli stosujesz Androcur 10 (z pigułką antykoncepcyjną lub bez niej) i masz schorzenie, które może się pogorszyć w czasie ciąży, musisz być pod szczególną kontrolą. Dotyczy to między innymi następujących schorzeń: padaczka, otoskleroza (dziedziczna forma głuchoty), stwardnienie rozsiane (choroba centralnego układu nerwowego, prowadząca do osłabienia/zaniku różnych funkcji ciała), porfiria (zaburzenie w produkcji czerwonego barwnika krwi, co może powodować nadwrażliwość skóry na światło), tężyczka (choroba z napadami skurczów mięśni), cukrzyca i nadciśnienie.

Jeśli w ciągu kilku godzin po zażyciu Androcur 10 i pigułki antykoncepcyjnej wystąpią wymioty lub biegunka, należy postępować zgodnie ze specjalnymi wskazówkami zawartymi w ulotce pigułki antykoncepcyjnej.

Jeśli poza tygodniem przerwy (od pigułki antykoncepcyjnej) wystąpi lekkie krwawienie (plamienie: krople lub plamki krwi), nie należy przerywać przyjmowania tabletek. Jeśli krwawienie poza tygodniem przerwy jest cięższe lub się powtarza, należy zbadać jego przyczynę.

Jeśli musisz przejść operację, przez jakiś czas musisz leżeć w łóżku lub nie możesz chodzić (na przykład jeśli jedna z nóg jest w gipsie lub bandażowana w związku z leczeniem żyłaków), zaleca się przerwanie stosowania Androcur 10 i pigułki antykoncepcyjnej na 6 tygodni przed operacją lub okresem (łóżkowego) odpoczynku. Jest to związane z możliwym zwiększonym ryzykiem zakrzepicy (tworzenie się skrzepu krwi, który może zablokować naczynie krwionośne).

Czy stosujesz inne leki?

Czy stosujesz inne leki oprócz Androcur 10, czy robiłaś to niedawno lub istnieje możliwość, że w najbliższej przyszłości będziesz stosować inne leki? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli oprócz Androcur 10 musisz stosować pigułkę antykoncepcyjną, musisz również uwzględnić leki, które mogą z nią wchodzić w interakcje. Zobacz ulotkę pigułki antykoncepcyjnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, nie wolno Ci stosować Androcur 10.

Czy podejrzewasz, że jesteś w ciąży lub chcesz zajść w ciążę? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Podczas pierwszych tygodni leczenia Androcur 10 możesz czasami odczuwać zmęczenie i mieć zmniejszoną koncentrację. Weź to pod uwagę w ruchu drogowym i podczas obsługi maszyn.

Androcur 10 zawiera laktozę

Jeśli lekarz poinformował Cię, że nie tolerujesz niektórych cukrów, skontaktuj się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ TEN LEK?

Zawsze przyjmuj ten lek dokładnie tak, jak zalecił Ci lekarz lub farmaceuta. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmuj tabletki Androcur 10 codziennie o tej samej porze, w razie potrzeby z niewielką ilością płynu (woda). Tabletki należy połykać w całości.

Blister Androcur 10 zawiera 15 tabletek.

Kiedy należy przyjmować Androcur 10?

Kobiety w wieku rozrodczym (około między 12 a 50 rokiem życia) z regularnym cyklem menstruacyjnym

Jeśli nie przyjmujesz jeszcze pigułki antykoncepcyjnej, lekarz przepisze Ci receptę. Podczas leczenia Androcur 10 nie wolno Ci zajść w ciążę. Pigułka antykoncepcyjna zapewnia ochronę przed ciążą oraz (ponownie) regularny cykl menstruacyjny (regularność, z jaką występują miesiączki).

Przed rozpoczęciem stosowania Androcur 10 należy upewnić się, że nie jesteś w ciąży. Może być konieczne wykonanie testu ciążowego. Lekarz może Ci o tym więcej powiedzieć.

- Jeśli nie stosujesz jeszcze pigułki antykoncepcyjnej, powinnaś rozpocząć przyjmowanie pierwszej tabletki pigułki antykoncepcyjnej w pierwszym dniu miesiączki. Od 1. dnia jesteś chroniona przed ciążą.
- Dodatkowo, od 1. do 15. dnia stosowania pigułki antykoncepcyjnej, przyjmuj codziennie 1 tabletkę Androcur 10.
- Po tych piętnastu dniach, od 16. do 21. dnia, przyjmuj tylko pigułkę antykoncepcyjną. To są ostatnie sześć tabletek z blistra.
- Następnie przez 7 dni nie przyjmuj żadnej tabletki. W ciągu tych 7 dni bez tabletek (zwanym również tygodniem przerwy) powinna rozpocząć się krwawienie. Tak zwane 'krwawienie z odstawienia' (krwawienie podobne do menstruacji) zwykle zaczyna się 2. lub 3. dnia tygodnia przerwy.
- Rozpocznij przyjmowanie kolejnego blistra i Androcur 10 w 8. dniu po ostatniej tabletkę pigułki antykoncepcyjnej, nawet jeśli krwawienie jeszcze się nie skończyło. Oznacza to, że zawsze zaczynasz nowy blister tego samego dnia tygodnia, a także, że krwawienie z odstawienia występuje co miesiąc mniej więcej w tych samych dniach.

Brak krwawienia

o Jeśli podczas przerwy nie wystąpi krwawienie, nie wolno kontynuować nowego blistra antykoncepcyjnego ani Androcur 10, dopóki Ty lub Twój lekarz nie przeprowadzicie testu ciążowego i nie będzie pewności, że nie jesteś w ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym (około między 12 a 50 rokiem życia) z nieregularnym cyklem menstruacyjnym

Jeśli masz nieregularny cykl menstruacyjny (momenty, w których występuje miesiączka, są nieprzewidywalne) lub jeśli nie miałaś miesiączki przez kilka miesięcy, najpierw należy ustalić, że nie jesteś w ciąży.

Jeśli nie jesteś w ciąży, możesz od razu rozpocząć stosowanie Androcur 10 i antykoncepcji, ale nie jesteś chroniona przed ciążą od pierwszego dnia stosowania. Dlatego przez pierwsze 7 dni stosowania Androcur 10 i antykoncepcji należy używać dodatkowego środka antykoncepcyjnego (na przykład prezerwatywy).

Podczas 1. do 15. dnia stosowania antykoncepcji przyjmuj codziennie 1 tabletkę Androcur 10.

Postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami podanymi w sekcji 'Kobiety w wieku rozrodczym (...) z regularnym cyklem menstruacyjnym'.

Kobiety w okresie menopauzy

Jeśli jesteś w okresie menopauzy, nie musisz stosować Androcur 10 w połączeniu z antykoncepcją. Twój lekarz powie Ci, ile tabletek należy stosować.

Kobiety, które nie mają już macicy

Jeśli Twoja macica została usunięta operacyjnie, nie musisz stosować Androcur 10 w połączeniu z antykoncepcją. Twój lekarz powie Ci, ile tabletek należy stosować.

Twój lekarz powie Ci, jak długo należy stosować Androcur 10. Czas trwania leczenia Androcur 10 zależy od nasilenia objawów (nadmierne owłosienie, trądzik lub tłusta skóra). Zazwyczaj poprawa nadmiernego owłosienia jest widoczna po 6-9 miesiącach. W przypadku trądziku i tłustej skóry często następuje to wcześniej.

Jeśli zauważysz, że Androcur 10 działa zbyt silnie lub zbyt słabo, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy użyłeś zbyt dużo tego leku?

Nie zgłoszono poważnych szkodliwych skutków jednoczesnego przyjęcia dużej ilości tabletek Androcur 10.

Jeśli użyłeś lub przyjąłeś zbyt dużo Androcur 10, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy zapomniałeś użyć tego leku?

Jeśli zapomnisz przyjąć tabletkę Androcur 10, może to zmniejszyć skuteczność leczenia. Pominięcie tabletki może również prowadzić do nieregularnych krwawień (plamienia lub lekkiego krwawienia). Pomiń zapomniane tabletki Androcur 10 (nie przyjmuj podwójnej dawki, aby nadrobić zaległości) i przyjmij kolejne tabletki Androcur 10 o zwykłej porze, razem z tabletką antykoncepcyjną.

Co zrobić, gdy zapomnisz przyjąć tabletkę antykoncepcyjną

- Jeśli spóźnisz się z przyjęciem tabletki o mniej niż 12 godzin, skuteczność tabletki antykoncepcyjnej nie jest zmniejszona. Przyjmij tę tabletkę, gdy tylko sobie przypomnisz, a kolejne tabletki przyjmuj o zwykłej porze.
- Jeśli spóźnisz się z przyjęciem tabletki o więcej niż 12 godzin, skuteczność twojej tabletki antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zapomnienia tabletki, które znajdują się w ulotce twojej tabletki antykoncepcyjnej.

Co zrobić w przypadku niespodziewanego krwawienia

Jeśli podczas trzech tygodni przyjmowania tabletki antykoncepcyjnej i/lub Androcur 10 wystąpi niespodziewane krwawienie (plamienie lub krwawienie przełomowe), nie przerywaj przyjmowania tabletek.

Nieregularne krwawienie zazwyczaj ustaje, gdy organizm przyzwyczai się do danej tabletki (po około 3 opakowaniach). Jeśli trwa dłużej, nasila się lub zaczyna się ponownie, skontaktuj się z lekarzem.

Co zrobić, gdy oczekiwane krwawienie nie wystąpi

Jeśli w tygodniu przerwy nie wystąpi krwawienie z odstawienia po zapomnieniu Androcur 10 i tabletki antykoncepcyjnej, możesz być w ciąży. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie

kontynuuj przyjmowania Androcur 10 i tabletki antykoncepcyjnej, dopóki lekarz nie potwierdzi, że nie jesteś w ciąży.

Jeśli przestaniesz stosować ten lek

Jeśli przestaniesz stosować Androcur 10, dolegliwości, dla których rozpoczęto stosowanie tego leku, mogą powrócić.

Pozostałe informacje dla specjalnych grup pacjentów

Dzieci i młodzież do 18 lat

Androcur 10 może być stosowany wyłącznie u pacjentek po okresie dojrzewania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Androcur 10 jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet w wieku rozrodczym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Androcur 10 nie powinien być stosowany, jeśli masz zaburzenia czynności wątroby (dopóki twoja wątroba nie działa wystarczająco dobrze). Zobacz także sekcję 'Kiedy nie należy stosować tego leku?'.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma danych wskazujących na konieczność dostosowania dawki w przypadku zaburzeń czynności nerek.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Natychmiast powiedz swojemu lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

- nagły, silny ból w górnej części brzucha, który nie ustępuje szybko i samoistnie.
- złe samopoczucie, gorączka, nudności, wymioty, brak apetytu, swędzenie całego ciała, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwione stolce, ciemno zabarwiony mocz. Mogą to być objawy zatrucia wątroby, w tym zapalenia wątroby (hepatitis).

Działania niepożądane zgłaszane przez użytkowników Androcur 10 są przedstawione poniżej:

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 użytkowników):

- oponiak (zwykle łagodny guz tkanki między mózgiem a czaszką)

Nieznana (na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości występowania):

- łagodne i złośliwe guzy wątroby
- reakcja nadwrażliwości
- przyrost masy ciała lub utrata masy ciała
- nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, żółtaczką, zapalenie wątroby (hepatitis)
- depresyjny nastrój, niepokój (przejściowy), spadek libido (ochoty na seks), wzrost libido (ochoty na seks)
- krwawienia w jamie brzusznej
- wysypka skórna

- wrażliwość piersi, zahamowanie owulacji, lekkie krwawienie (więcej informacji na temat lekkiego krwawienia znajduje się w punkcie 2 pod 'Stosowanie Androcur 10 w połączeniu z pigułką antykoncepcyjną' w podpunkcie 'Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?')

Podczas leczenia skojarzonego z pigułką antykoncepcyjną owulacja (jajczkowanie) jest zahamowana, co powoduje, że podczas leczenia jesteś niepełodna. Ponadto może wystąpić zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do Holenderskiego Centrum Działań Niepożądanych Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TEN LEK?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na etykiecie opakowania po

'EXP'. Podana jest tam miesiąc i rok. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności.

Nie wyrzucać leków do kanalizacji ani do toalety. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Zostaną one zniszczone w odpowiedzialny sposób i nie trafią do środowiska.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Jakie substancje zawiera ten lek?

- Substancją czynną w tym leku jest octan cyproteronu. Każda tabletki zawiera 10 miligramów octanu cyproteronu.
- Inne substancje w tym leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, poliwinylpiperolidon 25 (E1201), koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu (E551) i stearynian magnezu (E470b).

Jak wygląda Androcur 10 i ile znajduje się w opakowaniu?

- Tabletki Androcur 10 są białe do jasnożółtych, z linią podziału po jednej stronie i literami 'BW' w sześciokącie po drugiej stronie. Tabletki są okrągłe i mają średnicę 7 milimetrów.
- Androcur 10 jest dostępny w opakowaniach po 15 tabletek w blisterze.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent

Podmiot odpowiedzialny:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Przepakowujący (patrz etykieta na opakowaniu zewnętrznym): Brocacef B.V., Maroastraat 43,
1060 LG Amsterdam lub
Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Producent:

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereiner Strasse, 20
99427 Weimar
Niemcy

Zarejestrowany pod numerem

RVG 120911//09078 Androcur 10, tabletki 10 mg (Portugalia)

Ta ulotka została zatwierdzona w sierpniu 2024.

BS001200 – mmjj / 230620-0620_ADAA9B_A