

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ANDROCUR® 50 mg tablett
tsüproteroonatsetaat

Lugege kogu seda infolehte hoolikalt enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad kui teil. Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on Androcur ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Androcur'i võtmist
3. Kuidas Androcur'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Androcur'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Androcur ja milleks seda kasutatakse

Mis on Androcur?

Androcur on ravim, mis sisaldab tsüproteroonatsetaati. See on antiandrogeenne ravi. See blokeerib meessuguhormoonide (androgeenide) toime ja vähendab kehas toodetavate meessuguhormoonide hulka.

Milleks Androcur'i kasutatakse?

Androcur'i kasutatakse seksuaalse iha kontrollimiseks meestel, kellel on suurenenud sugutung (hüperseksuaalsus) ja/või seksuaalne kõrvalekalle.

Seksuaalsete kõrvalekallete juhtimise vähendamiseks peaksite võtma tsüproteroonatsetaati 50 mg ainult siis, kui teie arst leiab, et muud sekkumised ei ole sobivad.

2. Mida peate teadma enne Androcur'i võtmist

Teie arst võib paluda teil enne Androcur'i määramist allkirjastada tunnistajaga kokkulepe raviks. Samuti võidakse teil teha test, et kontrollida teie sperma arvu ja funktsiooni enne ravi alustamist, kuna Androcur võib seda mõjutada. Teie toodetavate spermide üldarv väheneb ja rohkem sperme kui tavaliselt on ebanormaalse kujuga.

Ärge võtke Androcur'i, kui teil on:

maksahaigused (sealhulgas varasemad või olemasolevad maksakasvajad, kasvajadmis tahes tüüpi vähk (välja arvatud eesnäärmevähk) kunagi diagnoositud meningeoom (üldiselt healoomuline kasvaja kasvaja kurnatushaigused (haigused, mis hõlmavad tahtmatut kaalukaotust või lihaste kadu) verehüübed (tromboos või emboolia) või kui teil on neid kunagi olnud raske diabeet, mis mõjutab teie vereringet ebanormaalsed punased verelibled (sirprakuline aneemia aneemia) raske depressioon, mis on kestnud mitu kuud

või kui:
oled allergiline tsüproteroonatsetaadi või Androcure'i mõne muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)
oled alla 18-aastane või kui sinu munandid või luud ei ole veel täielikult välja arenenud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne Androcure'i võtmist

Selle ravimi võtmise ajal võib olla vajalik teha mitmeid vereanalüüse või kontrole:

maksaprobleemid, mõned neist rasked või isegi surmavad, on teatatud tsüproteroonatsetaadi ravi ajal. Teie arst võib korraldada regulaarseid maksakatseid enne ja ravi ajal, et seda jälgida, ja võib vajadusel ravi lõpetada. Vaadake ka lõik 4.

selliste ravimite nagu Androcure kasutamine on väga harva seotud healoomuliste (mittepahaloomuliste) maksa kasvajate ja mõnede maksavähi vormidega (pahaloomulised maksa kasvajaMaks kasvaja verehüübed on teatatud patsientidel, kes võtavad seda ravimit, mis võib olla seotud ka põhjusega, miks te Androcure'i saate. Teatage oma arstile, kui mõni

Tsüproteroonatsetaadi kasutamine on seotud üldiselt healoomulise ajukasvaja tekkega kasvaja (meningiroom). Risk suureneb eriti siis, kui kasutate seda pikema aja jooksul (mitu aastat) või lühema aja jooksul suurte annustega (25 mg päevas ja rohkem). Kui teil diagnoositakse meningiroom, lõpetab teie arst ravi tsüproteroonatsetaadiga (vt lõik 'Ärge võtke Androcure'i'). Kui märkate mingeid sümptomeid, nagu nägemise muutused (nt kahelinägemine või hägusus), kuulmislanguus või kohin kõrvades, lõhnataju kaotus, peavalud, mis aja jooksul süvenevad, mälukaotus, krambid, nõrkus kätes või jalgades, peate sellest kohe oma arstile teatama.

verehüübed on teatatud patsientidel, kes võtavad seda ravimit, mis võib olla seotud ka põhjusega, miks te saate Androcure'i. Rääkige oma arstile, kui mõni järgmistest järgmised kehtivad teie kohta, kuna teil võib olla suurenenud risk saadaverehüüve. Kui teil on:

verehüüvete, insultide või südameatakkide ajalugu vähk

ebanormaalsed punased verelibled (sirprakuline aneemia)
raske diabeet, mis mõjutab teie vereringet

mõjud verele (aneemia) on harva teatatud pikaajalise ravi ajal selle ravimiga.
Vaata ka jaotist 4.

õhupuudust on teatatud patsientidel, kes võtavad seda ravimit suurtes
annustes (300 mg
päevas)

Androcur võib muuta teie veresuhkru taset. Kui olete diabeetik, kontrollige
regulaarselt oma veresuhkru taset. Teie arst võib muuta diabeedi raviks
kasutatava ravimi annust

Teie arst kontrollib teie neerupealiste funktsiooni, kuna need võivad
Androcur-ravi ajal alla surutud olla. Sümptomiteks võivad olla väsimus,
kurnatus, isutus, kaalulangus, madal veresuhkur, madal vererõhk,
dehüdratsioon, peavalu, ärrituvus ja depressioon, lihasvalu, kõhuvalu, soolase
toidu iha, iiveldus ja kõhulahtisus..

Öelge oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või võite võtta mingeid muid
ravimeid.

Mõned ravimid võivad takistada Androcuri korralikku toimimist.

Mõned ravimid võivad takistada Androcuri korralikku toimimist. Samuti Androcur
võib muuta teiste ravimite lagunemist teie kehas.

Öelge oma arstile, kui te võtate regulaarselt mingeid teisi ravimeid, eriti:
ravimid nagu rifampitsiin tuberkuloosi raviks
ravimid nagu fenütoiin, mida kasutatakse epilepsia või muude haiguste raviks
tooted, mis sisaldavad ravimtaime, mida tuntakse naistepuna (*Hypericum
perforatum*) nime all
ravimid nagu ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool seenhaiguste raviks
ravimid nagu ritonaviir, mida kasutatakse HIV-infektsioonide raviks
kolesterooli alandavad ravimid nagu statiinid. Androcur võib statiinide
kõrvaltoimeid halvendada, näiteks lihaste lagunemist
ravimid nagu glitasoonid diabeedi raviks.

Kui teil on diabeet, võib teie arst vajada diabeedi raviks vajaliku ravimi annuse
muutmist. Vaadake jaotist 2 'Hoiatused ja ettevaatusabinõud'.

Androcur koos toidu, joogi ja alkoholiga
Androcur ei toimi hästi meestel, kes joovad regulaarselt palju alkoholi.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine
Ravi ajal võite tunda väsimust ja nõrkust. Kui see juhtub, ärge juhtige autot,
kasutage masinaid ega tehke midagi, kus need sümptomid võivad ohustada teid või
teisi.

Oluline teave mõnede Androcuri koostisosade kohta Androcur sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et teil on talumatus mõne suhkru suhtes, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas Androcur'i võtta

Teie arst otsustab, millise annuse te võtate, sõltuvalt teie ravist. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaline annus on 1 tablett kaks korda päevas. Kui soovitud toime on saavutatud, võib teie annust järk-järgult vähendada. Võtke tablett pärast hommiku- ja õhtusööki ning neelake see tervelt alla koos klaasi veega.

Androcur ei ole mõeldud kasutamiseks alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Androcur'i rohkem kui ette nähtud Niipea kui võimalik, rääkige oma arstiga, kes ütleb teile, mida teha. Ühekordse suure Androcur'i annuse võtmisega seotud tõsiseid haigusjuhte ei ole teatatud.

Kui te unustate Androcur'i võtta
Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui meelde tuleb, ja võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui te lõpetate Androcur'i võtmise
Ärge vähendage annust ega lõpetage tablettide võtmist, kui arst ei ole seda teile öelnud.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib hingamis- või neelamisraskusi, võib see olla harvaesineva allergilise reaktsiooni tunnus - võtke kohe ühendust oma arstiga või minge haiglasse.

Teabe saamiseks alkoholi tarbimise kohta selle ravimi võtmise ajal vaadake jaotist 2, Androcur koos toidu, joogi ja alkoholiga.

Need on Androcur'i võimalikud kõrvaltoimed, alustades sagedasematest:

Väga sage

võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st vähendatud spermatooside arv

vähendatud ejakulaadi maht

Sage

võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st kaalu langus või tõus, mis võib olla seotud vedelikupeetusega masendunud meeleolu rahutus rindade turse, mõnikord valulikkusega kuumahood, higistamine väsimus hingeldus maksaprobleemid, mõned neist rasked või isegi surmavad, on teatatud tsüproteroonatsetaadi annuste 100 mg ja rohkem puhul. Teie arst võib korraldada teile regulaarseid maksakatseid ravi ajal, et seda jälgida, ja võib vajadusel ravi lõpetada

Aeg-ajalt

võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st inimest lööve

Harv

võib mõjutada kuni 1 inimest 1 000-st allergiline reaktsioon (võib-olla põhjustades löövet, sügelust või harvemini hingeldust. Kui teil on hingamis- või neelamisraskusi, võtke kohe ühendust oma arstiga või minge haiglasse) valulikud tükid rindades ja piimja vedeliku eritumine nibudest. Need mõjud kaovad tavaliselt, kui ravi lõpetatakse või kui Androcure'i annust vähendatakse meningioma, vt ka lõik 2 'Hoiatused ja ettevaatusabinõud' valulikud tükid rindades ja piimja vedeliku eritamine nibudest. Need mõjud kaovad tavaliselt, kui ravi lõpetatakse või kui Androcure'i annust vähendatakse meningioma, vt ka jaotis 2 'Hoiatused ja ettevaatusabinõud'

Väga harv

healoomulised (mittepahaloomulised) maksa

kasvajad kasvajadmõned maksavähi vormid (pahaloomulised maksa

kasvajad kasvavad). Maks kasvavad võivad põhjustada verejooksu kõhuõõnes, mis võib olla eluohtlik. Kui teil tekib uus kõhu ebamugavustunne või valu, mis ei kao kiiresti, peate sellest kohe oma arstile teatama

Androcure'i mõju spermale

Pärast selle ravimi võtmist mõne kuu jooksul ei pruugi teie seemnevedelikus olla spermatooside. Tõenäoliselt ei saa te kedagi rase, kuid pidage meeles, et see ei juhtu kohe. Ärge kunagi lootke sellele ravimile rasestumisvastase vahendina. Kuigi teie toodetud spermatoosidide üldarv väheneb, on rohkem teie spermatooside kui tavaliselt ebanormaalse kujuga. Mõned inimesed arvavad, et need ebanormaalsed spermatoosidid võivad võimalusel tekitada ebanormaalseid lapsi. Teie arst saab teid edasi nõustada, kui te kaalute laste saamist.

Muud teatatud muutused hõlmavad:

verehüübed on teatatud patsientidel, kes võtavad seda ravimit, kuid neid ei ole kindlalt seostatud Androcure'iga. Vaadake ka jaotist 2 'Hoiatused ja ettevaatusabinõud'

meningioomide (üldiselt healoomuline kasvaja ajukelme ja kolju vahelise koe kihis) esinemine on teatatud seoses Androcure'i pikaajalise kasutamisega (aastate jooksul) annustes 25 mg päevas ja rohkem

kuiv nahk ja akne paranemine

ajutine keha karvade laiguline kadu, karvakasvu vähenemine kehal,

suurenenud karvakasv peas, juuste värvuse heledamaks muutumine värv,

naissoost tüüpi häbemekarvade kasv

mõju verele (aneemia) on teatatud selle ravimi pikaajalise kasutamise ajal.

Teie arst võib korraldada teile regulaarseid vereanalüüse ravi ajal, et seda jälgida

luude hõrenemine (osteoporoos)

väsimus, kurnatus, isutus, kaalulangus, madal veresuhkur, madal vererõhk,

dehüdratsioon, peavalu, ärrituvus ja depressioon, valutavad lihased (sageli

lihaskrambid), kõhuvalu, soolase toidu iha, iiveldus või oksendamine ja

kõhulahtisus (neerupealiste allasurumine).

Pärast ravi lõpetamist

Pärast ravi lõpetamist taastuvad sugutungijärgi vähenemine, spermatoosidide arvu vähenemine ja rindade turse üldiselt normaalseks.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest otse teatada (vt allpool toodud üksikasju). Kõrvaltoimetest teatades kõrvaltoimed saate aidata anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

Ühendkuningriik

Kollase kaardi skeem

Veebisait: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Kuidas Androcure'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid ära kanalisatsiooni või olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Androcur sisaldab:

toimeaine on tsüproteroonatsetaat. Iga tablett sisaldab 50 mg tsüproteroonatsetaati

teised koostisosad on: maisitärklis, povidoon 25000, magneesiumstearaat (E572), laktoos, ränidioksiid (aerosil) (E551).

Kuidas Androcur välja näeb ja pakendi sisu Iga Androcuri pakend sisaldab 60 ümmargust, valget tabletti.

Müügiloa omanik ja tootja

Müügiloa omanik: ADVANZ PHARMA Limited Üksus 17, Northwood House,
Northwood Crescent, Dublin 9,
Iirimaa D09 V504
Tootja:

Bayer AG

Bayer AG
Berliin
Saksamaa

või

Bayer Weimar GmbH und Co KG
Weimar
Saksamaa

Seda infolehte uuendati viimati septembris 2024.

Muud formaadid:

Selle infolehe kuulamiseks või Braille'i kirjas, suurkirjas või audiona koopia saamiseks helistage tasuta:

0800 198 5000 (ainult Ühendkuningriigis)

Palun olge valmis andma järgmist teavet:

Toote nimi	Viitenumber
Androcur 50 mg	PL 56734/0016

See on teenus, mida pakub Kuninglik Pimedate Instituut.

Transtoyou