

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

ANORO ELLIPTA 55 mikrogrammaa/22 mikrogrammaa inhalaatiojauhe, esijauhettu umeclidinium/vilanterol

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.

Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka mainitaan kohdassa 4? Tai saatko

haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Sisältö tästä pakkausselosteesta pakkausseloste

1. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
2. Miten tätä lääkettä käytetään?
3. Mahdolliset
4. haittavaikutukset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muut tiedot Vaiheittaiset ohjeet

1. Mitä ANORO ELLIPTA on ja mihin sitä käytetään?

Mitä ANORO ELLIPTA on?

ANORO ELLIPTA sisältää kaksi vaikuttavaa ainetta, umeclidiniumbromidi ja vilanteroli. Ne kuuluvat lääkeryhmään, jota kutsutaan keuhkoputkia laajentaviksi lääkkeiksi.

Mihin tätä lääkettä käytetään?

ANORO ELLIPTAa käytetään aikuisten kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden (COPD) hoitoon. COPD on pitkäaikainen sairaus, jolle on ominaista hengitysvaikeudet, jotka pahenevat hitaasti.

COPD:ssa hengitysteiden ympärillä olevat lihakset supistuvat. Tämä lääke estää näiden lihasten supistumisen keuhkoissa, jolloin ilma pääsee helpommin keuhkoihin ja sieltä ulos. Säännöllinen käyttö auttaa hallitsemaan hengitysvaikeuksiasi ja vähentämään COPD:n vaikutuksia päivittäiseen elämääsi.

ANORO ELLIPTAa ei saa käyttää äkillisen hengenahdistus- tai vinkumiskohtauksen lievittämiseen.

AJos saat tällaisen kohtauksen, sinun tulee käyttää nopeasti vaikuttavaa hätäinhalaattoria (kuten salbutamolia). Jos sinulla ei ole nopeasti vaikuttavaa hätäinhalaattoria, ota yhteyttä lääkäriisi.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löydät kohdasta 6. Jos luulet, että yllä oleva koskee sinua, älä käytä tätä lääkettä ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä:

jos sinulla on astma (älä käytä ANORO ELLIPTA -valmistetta astman hoitoon)

jos sinulla on sydänongelmia tai korkea verenpaine

jos sinulla on silmäongelma, jota ahdaskulmaglaukooma kutsutaan

jos sinulla on suurentunut eturauhanen, virtsaamisongelmia tai tukos virtsarakossa

jos sinulla on epilepsia on

jos sinulla on kilpirauhasongelmia on

jos sinulla on alhaiset kaliumarvot veressäsi

jos u diabetes on

jos u vakavia maksavaivoja on

Keskustele lääkärisi kanssa, jos luulet, että jokin yllä mainituista kohdista saattaa koskea sinua.

Akuutit hengitysvaikeudet

Jos tunnet heti ANORO ELLIPTA -inhalaattorin käytön jälkeen puristusta rinnassa, tai jos alat yskiä, hengityksesi vinkuu tai hengästyit:

lopeta tämän lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, koska sinulla saattaa olla vakava tila nimeltä paradoksaalinen bronkospasmi.

Silmien ongelmat ANORO ELLIPTA -hoidon aikana

Jos saat ANORO ELLIPTA -hoidon aikana kipua tai vaivaa silmissäsi, näet tilapäisesti sumeasti, näet renkaita tai värikkäitä kuvia yhdessä punasilmäisyyden kanssa:

lopeta tämän lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, koska nämä oireet voivat viitata akuuttiin kapeakulmaglaukoomaan.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai nuorille alle 18 vuotta.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö ANORO ELLIPTA:n lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Jos et ole varma, mitä lääkkeesi sisältää, keskustele siitä lääkärisi tai apteekkarisi kanssa.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa tämän lääkkeen toimintaan tai lisätä haittavaikutusten riskiä.

Tämä ovat muun muassa:

lääkkeet beetasalpaajat (kuten propranololi), joita käytetään korkean verenpaineen tai muiden sydänongelmien hoitoon

ketokonatsoli klaritromysiini

tai telitromysiini, joita käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon

ritonaviri, käytetään HIV-infektioiden hoitoon

lääkkeet jotka alentavat veren kaliumpitoisuutta, kuten jotkut diureetit (nesteenpoistolääkkeet) tai jotkut astman hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten metyyliksantiini tai steroidit) muut pitkävaikutteiset lääkkeet, jotka ovat samanlaisia kuin tämä lääke ja joita käytetään hengitysvaikeuksien hoitoon, kuten tiotropium ja indakateroli. Älä käytä ANORO ELLIPTA -valmistetta, jos käytät jo näitä lääkkeitä.

Kerro lääkäriillesi tai apteekkarillesi, jos käytät jotain näistä lääkkeistä. Lääkärisi saattaa haluta seurata sinua tarkasti, jos käytät jotain näistä lääkkeistä, koska ne voivat pahentaa ANORO ELLIPTA -valmisteen sivuvaikutuksia.

#### Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, suunnitteletko raskautta tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana, ellei lääkärisi kehota sinua käyttämään sitä.

Ei tiedetä, voivatko ANORO ELLIPTA -valmisteen ainesosat siirtyä äidinmaitoon. Jos imetät, keskustele asiasta lääkärisi kanssa ennen ANORO ELLIPTA -valmisteen käyttöä. Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, ellei lääkärisi kehota sinua käyttämään sitä.

#### Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että ANORO ELLIPTA vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.

#### ANORO ELLIPTA sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että et siedä tiettyjä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### 3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

Suosittelun annostus on yksi inhalaatio päivässä samaan aikaan päivästä. Sinun tarvitsee inhaloida vain kerran päivässä, koska tämän lääkkeen vaikutus kestää 24 tuntia. Älä käytä enempää kuin lääkärisi on määrännyt.

#### Käytä ANORO ELLIPTA -valmistetta säännöllisesti

On erittäin tärkeää, että käytät ANORO ELLIPTA -valmistetta joka päivä lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Tämä auttaa pitämään sinut oireettomana päivin ja öin.

ANORO ELLIPTA -valmistetta ei saa käyttää äkillisen hengenahdistus- tai vinkumiskohtauksen lievittämiseen. Jos saat tällaisen kohtauksen, sinun tulee käyttää nopeasti vaikuttavaa hätäinhalaattoria (kuten salbutamolia).

#### Kuinka käytät inhalaattoria?

Katso tämän pakkausselosteen lopussa olevat 'Vaiheittaiset ohjeet' saadaksesi täydelliset tiedot.

ANORO ELLIPTA on tarkoitettu inhalaatiokäyttöön. Käyttääksesi ANORO ELLIPTA -valmistetta, hengitä se keuhkoihisi suun kautta ELLIPTA-inhalaattorilla.

Jos oireesi eivät parane

Jos COPD-oireesi (hengenhadistus, vinkuminen, yskä) eivät parane tai pahenevat tai jos käytät nopeasti vaikuttavaa inhalaattoriasi useammin:

ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi.

Oletko käyttänyt tätä lääkettä liikaa?

Jos käytät vahingossa liikaa tätä lääkettä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin saadaksesi neuvoja, koska saatat tarvita lääkärin apua. Näytä mahdollisuuksien mukaan inhalaattori, pakkaus tai tämä pakkausseloste. Saatat huomata, että sydämesi lyö nopeammin kuin normaalisti, tunnet itsesi vapisevaksi tai sinulla on näköhäiriöitä, suun kuivumista tai päänsärkyä.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Älä hengitä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen. Hengitä seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos hengityksesi vinkuu tai sinulla on hengenhadistusta, käytä nopeasti vaikuttavaa hätäinhalaattoriasi (kuten salbutamolia) ja ota sitten yhteyttä lääkäriin.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Käytä tätä lääkettä niin kauan kuin lääkärisi suosittelee. Se on tehokas vain niin kauan kuin käytät sitä. Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi neuvo toisin, vaikka tuntisit olosi paremmaksi, koska oireesi voivat pahentua.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia on, vaikka kaikki eivät sitä koe.

Allergiset reaktiot

Jos sinulla on jokin seuraavista oireista ANORO ELLIPTA -valmisteen käytön jälkeen, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja kerro siitä heti lääkärillesi.

Joskus esiintyvät haittavaikutukset (esiintyvät alle yhdellä 100 käyttäjästä):

ihottuma (nokkosihottuma) tai punoitus

Harvoin esiintyvät haittavaikutukset (esiintyvät alle yhdellä 1000 käyttäjästä):

turvotus, joskus kasvojen tai suun (angioedeema)

vaikea hengityksen vinkuminen, yskä tai hengitysvaikeudet viime aikoina hengityksen

vinkuminen, yskä tai hengitysvaikeudet

äkillisesti heikoksi tai huimaavaksi (tämä voi johtaa pyörtymiseen tai tajunnan

menetykseen) Akuutit hengitysvaikeudet

Akuutti hengitysvaikeus

Akuutit hengitysvaikeudet ANORO ELLIPTAn käytön jälkeen ovat harvinaisia. Jos tunnet heti tämän lääkkeen käytön jälkeen puristusta rinnassa, tai jos alat yskiä tai hengityksesi vinkuu tai hengästyit:

tämän lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, koska sinulla saattaa olla vakava tila nimeltä paradoksaalinen bronkospasmi. ja tämän lääkkeen käytön kanssa ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, koska sinulla saattaa olla vakava tila nimeltä paradoksaalinen bronkospasmi.

#### Muut haittavaikutukset

##### Yleinen (esiintyy alle 1:llä 10:stä käyttäjästä)

kipu virtsatessa tai tiheä virtsaamistarve (nämä voivat olla merkkejä virtsatieinfektiosta)  
yhdistelmä kurkkukipu ja vuotava nenä  
kipeä kurkku  
paineen tunne tai kipu poskissa ja otsassa (nämä voivat olla merkkejä poskiontelotulehduksesta, nimeltään sinuiitti)  
päänsärky  
yskä  
kipu ja ärsytys suun takaosassa ja kurkussa  
ummetus  
kuiva suu  
infektio ylempien hengitysteiden hengitystiet

##### epäsäännöllinen

sydämenlyönti nopeampi  
sydämenlyönti tuntea  
sydämenlyönnit (sydämentykytys) lihasnykäykset  
vapina  
tärinämuuttunut  
maku käheys  
käheys

##### Harvinainen (esiintyy alle yhdellä 1000 käyttäjästä)

näkö nähdä  
lisääntyminen of the mitattu silmänpaine  
väheneminen näkökyvyn heikkeneminen tai kipu silmissäsi (mahdollisia merkkejä glaukoomasta)  
vaikea virtsaaminen ja kipu virtsatessa – nämä voivat olla merkkejä virtsarakon tukkeutumisesta tai virtsaumpi

##### Tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella)

huimaus

#### Haittavaikutusten ilmoittaminen alkaen haittavaikutuksista

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, kuten mainittu liitteessä V. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

#### 5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta, rasiasta ja inhalaattorista merkinnän 'EXP' jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Säilytä inhalaattori suljetussa rasiassa kosteudelta suojaamiseksi ja ota se pois vasta juuri ennen ensimmäistä käyttöä. Kun rasia on avattu, inhalaattoria voidaan käyttää enintään 6 viikkoa siitä päivästä, kun rasia avattiin. Kirjoita päivämäärä, jolloin inhalaattori on hävitettävä, inhalaattorin etikettiin sille varattuun tilaan. Päivämäärä on merkittävä heti, kun inhalaattori otetaan pois rasiasta.

Säilytä alle 30 °C.

Jos inhalaattoria säilytetään jääkaapissa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi vähintään tunnin ajan ennen käyttöä.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeit oikein, ne tuhotaan vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitkä aineet ovat tässä valmisteessa?

Tämän valmisteen vaikuttavat aineet ovat umeclidiniumbromidi ja vilanteroli.

Jokainen yksittäinen inhalaatio antaa annoksen (annos, joka poistuu suukappaleesta) 55 mikrogrammaa umeclidinium (vastaa 65 mikrogrammaa umeclidiniumbromidia) ja 22 mikrogrammaa vilanterolia (trifenataattina trifenataatti).

Muut tämän lääkkeen aineet ovat laktoosimonohydraatti (katso kohta 2 alla 'ANORO ELLIPTA sisältää laktoosia') ja magnesiumstearaatti.

Miltä ANORO ELLIPTA näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

ANORO ELLIPTA on inhalaatiojauhe, esijauhettu.

Ellipta Ellipta Vaikuttavat aineet ovat valkoisena jauheena erillisissä läpipainopakkauksissa inhalaattorissa. ANORO ELLIPTA on saatavilla pakkauksissa, joissa on 1 inhalaattori, joko 7 tai 30 annosta, ja

Vaikuttavat aineet ovat valkoisena jauheena erillisissä läpipainopakkauksissa inhalaattorissa. ANORO ELLIPTA on saatavana pakkauksissa, joissa on 1 inhalaattori, joko 7 tai 30 annosta ja monipakkaukset Myyntiluvan haltijapakkaukset kaupassa.

GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti D24 YK11

Valmistaja:

Glaxo Wellcome Production  
Teollisuusalue No.2  
23 Katu Lavoisier  
27000 Evreux  
Ranska

Ota yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan saadaksesi kaikki tiedot tästä lääkkeestä:

Belgia/Belgique/Belgien  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Liettua  
UAB "BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC"  
Tel: +370 52 691 947  
lt@berlin-chemie.com

Bulgaria  
"Berliini-Chemi/A. Menarini  
Bulgaria" EООД  
Tel.: +359 2 454 0950  
bcsofia@berlin-chemie.com

Luxemburg/Luxemburg  
GlaxoSmithKline Lääkkeet s.a./n.v.  
BelgiaBelgia  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tšekki tasavalta  
GlaxoSmithKline, s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
cz.info@gsk.com

Unkari  
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.  
Tel.: +36 23501301  
bc-hu@berlin-chemie.com

Tanska  
GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Puh.: + 45 36 35 91 00 dk-  
info@gsk.com

Malta  
GlaxoSmithKline Trading  
Services Limited  
Puh: +356 80065004

Saksa  
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Puh.: +  
49 (0)89 36044 8701  
produkt.info@gsk.com

Eesti  
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  
Puh: +372 667 5001 ee@berlin-  
chemie.com

Ελλάδα  
Menarini Hellas A.E.  
Puh: +30 210 83161 11-13

España  
GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202  
700 es-ci@gsk.com

Ranska  
Laboratorio GlaxoSmithKline Puh: + 33 (0)1  
39 17 84 44  
diam@gsk.com

Kroatia  
Berlin-Chemie Menarini Kroatia d.o.o. Puh: +385 1 4821 361  
office-croatia@berlin-chemie.com

Irlanti  
GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Puh: + 353 (0)1 4955000

Islanti Vistor hf.  
Puhelin: + 354 535 7000

Alankomaat  
GlaxoSmithKline BV  
Puh: + 31 (0)33 2081100

Norge  
GlaxoSmithKline AS  
Puh: + 47 22 70 20 00

Österreich  
GlaxoSmithKline Pharma GmbH  
Puh: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Puola  
GSK Services Sp. z o.o.  
Puh.: + 48 (0)22 576 9000

Portugali  
GlaxoSmithKline – Tuotteet  
Farmaseuttiset, Lda.  
Puh: + 351 21 412 95 00  
FI.PT@gsk.com

Romania  
GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Puh: +40 800672524

Slovenia  
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution  
Ljubljana d.o.o.  
Puh: +386 (0)1 300 2160  
slovenia@berlin-chemie.com

Slovakian tasavalta  
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution  
Slovakia s.r.o.  
Puh: +421 2 544 30 730 slovakia@berlin-  
chemie.com

GlaxoSmithKline S.p.A.

Puh: + 39 (0)45 774 1111  
Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Puh: +357 80070017

Ruotsi

GlaxoSmithKline AB  
Puh: + 46 (0)8 638  
93 00  
info.produkt@gsk.co  
m

Latvia

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic  
Puh: +371 67103210  
[lv@berlin-chemie.com](mailto:lv@berlin-chemie.com)

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty

Muut tietolähteet

Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla:  
<http://www.ema.europa.eu>.

## Vaiheittaiset ohjeet

### Mikä on ELLIPTA-inhalaattori?

Kun käytät ANORO ELLIPTA -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, sinun ei tarvitse tarkistaa, toimiiko inhalaattori oikein; se sisältää jo esijakautuneet annokset en on heti käyttövalmis.

Inhalaattori on pakattu astiaan. Älä avaa astiaa ennen kuin olet valmis aloittamaan uuden inhalaattorin käytön. Kun olet valmis käyttämään inhalaattoria, vedä astian suojakalvo auki avataksesi sen. Astiassa on kuivausainepussi kosteuden vähentämiseksi. Hävitä tämä kuivausainepussi. – sitä ei saa avata, syödä tai hengittää.

Kun otat inhalaattorin astiasta, se on 'suljetussa' asennossa. Älä avaa inhalaattoria ennen kuin olet valmis hengittämään lääkkeen annoksen. Kun astia avataan, kirjoita 'Hävitä viimeistään' -päivämäärä inhalaattorin etikettiin sille varattuun tilaan. 'Hävitä viimeistään' -päivämäärä on 6 viikkoa astian avaamispäivästä. Tämän päivämäärän jälkeen et saa enää käyttää inhalaattoria. Voit hävittää astian ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Jos inhalaattoria säilytetään jääkaapissa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi vähintään tunnin ajan ennen käyttöä.

Alla olevat inhalaattorin vaiheittaiset käyttöohjeet koskevat sekä 30 annoksen inhalaattoria (30 päivän varasto) että 7 annoksen inhalaattoria (7 päivän varasto).

### 1) Lue tämä ennen aloittamista

Jos avaat ja suljet suojakannen ilman, että hengität lääkettä, annos menetetään. Menetetty annos pysyy turvallisesti inhalaattorissa, mutta ei ole enää saatavilla. Ei ole mahdollista ottaa vahingossa ylimääräistä lääkettä tai kaksoisannosta yhden inhalaation aikana.

### 2) Annos valmistelu

Odota suojakannen avaamista, kunnes olet valmis hengittämään annoksesi.n. Inhalaattoria ei saa ravistaa.

Liuta suojakorkkia alaspäin, kunnes kuulet 'klik'-äänen.

Lääkkeesi voidaan nyt inhaloida.

Annostelija laskee yhdellä vahvistaakseen tämän.

Jos annostelija ei laske, kun kuulet 'klik'-äänen, inhalaattori ei anna lääkettä. Palauta se apteekkiin saadaksesi neuvoja.

### 3) Sinun lääkkeesi inhalaatio

Hengitä mahdollisimman syvään ulos pitäen inhalaattori poissa suustasi. Älä uloshengitä inhalaattoriin.

Aseta suukappale huultesi väliin ja sulje huulesi tiukasti sen ympärille.

Älä peitä ilmanottoaukkoa sormillasi.

Hengitä kerran pitkään, tasaisesti ja syvään. Pidätä hengitystäsi niin kauan kuin mahdollista (vähintään 3-4 sekuntia).

Ota inhalaattori pois suustasi.

Hengitä hitaasti ja rauhallisesti ulos.

Et ehkä maista tai tunne lääkettä, vaikka käyttäisit inhalaattoria oikein.kt.

Jos haluat puhdistaa suukappaleen, käytä kuivaa liinaa ennen kuin suljet suojakannen.

#### 4) Sulje inhalaattori

Liuta suojakansi mahdollisimman ylös peittääksesi suukappaleen.

Transtoyou