

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

ANORO ELLIPTA 55 mikrogramai/22 mikrogramai inhaliaciniai milteliai, iš anksto dozuoti umeclidinijus/vilanterolis

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.  
Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.  
Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.  
Ar pasireiškė kuri nors iš 4 skyriuje nurodytų šalutinių poveikių? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra ANORO ELLIPTA ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija Žingsnis po žingsnio instrukcijos

1. Kas yra ANORO ELLIPTA ir kam šis vaistas vartojamas?

Kas yra ANORO ELLIPTA?

ANORO ELLIPTA sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, umeclidinumbromidas ir vilanterolis. Jos priklauso vaistų grupei, vadinamai bronchus plečiančiais vaistais.

Kam šis vaistas vartojamas?

ANORO ELLIPTA vartojamas lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) gydymui suaugusiems. LOPL yra ilgalaikė būklė, kuriai būdingi kvėpavimo sunkumai, kurie palaipsniui blogėja.

Sergant LOPL, raumenys aplink kvėpavimo takus susitraukia. Šis vaistas blokuoja šių raumenų susitraukimą plaučiuose, todėl oras lengviau patenka į plaučius ir iš jų išeina. Reguliariai vartojant, jis padės kontroliuoti jūsų kvėpavimo sunkumus ir sumažinti LOPL poveikį jūsų kasdieniam gyvenimui.

ANORO ELLIPTA negalima vartoti staigaus dusulio ar švokštimo priepuolio palengvinimui. Atsiradus tokiam priepuoliui, turite naudoti greitai veikiančią skubios pagalbos inhaliatorių (pvz., salbutamolį). Jei neturite greitai veikiančio skubios pagalbos inhaliatoriaus, susisiekite su savo gydytoju.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje. Jei manote, kad aukščiau paminėta informacija jums tinka, nevartokite šio vaisto, kol nepasikalbėsite su savo gydytoju.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju:

jei sergate astma (nenaudokite ANORO ELLIPTA astmos gydymui)

jei turite širdies problemų arba aukštą kraujospūdį

jei turite akių problemą, kuri vadinama uždaro kampo glaukoma vadinamas

jei turite padidėjusią prostatą, šlapinimosi problemų arba šlapimo pūslės užsikimšimą

jei turite epilepsiją turi

jei turite skydliaukės problemų turi

jei turite mažą kalio kiekį kraujyje

jei sergate cukriniu diabetu turite

jei jūs rimtų kepenų problemų turite

Pasitarkite su savo gydytoju, jei manote, kad kuris nors iš aukščiau paminėtų punktų gali jums tikti.

Ūmus kvėpavimo sunkumas

Jei iškart po ANORO ELLIPTA inhaliatoriaus naudojimo jaučiate krūtinės spaudimą, arba jei pradodate kosėti, švokšti ar sunkiai kvėpuoti:

nutraukite tada šio vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes galbūt turite rimtą būklę, vadinamą paradoksinio bronchų spazmu.

Akių problemos gydymo ANORO ELLIPTA metu

Jei gydymo ANORO ELLIPTA metu jaučiate akių skausmą ar diskomfortą, laikinai matote neryškiai, matote žiedus ar spalvotus vaizdus kartu su raudonomis akimis:

nutraukite tada šio vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes šie simptomai gali rodyti ūminį uždaro kampo glaukomos.

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Neduokite šio vaisto vaikams ar paaugliams iki 18 metų.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be ANORO ELLIPTA, ar neseniai vartojote, arba ar planuojate artimiausiu metu vartoti kitus vaistus? Pasakykite apie tai savo gydytojui arba vaistininkui. Jei nesate tikri, kas yra jūsų vaistuose, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Kai kurie vaistai gali paveikti šio vaisto veikimą arba padidinti šalutinio poveikio riziką. Tai yra tarp kitų::

vaistai beta adrenoblokatoriai (tokie kaip propranololis), kurie naudojami aukšto kraujospūdžio ar kitų širdies problemų gydymui

ketokonazolas klaritromicinas

arba telitromicinas, naudojami bakterinių infekcijų gydymui

irtonaviras, naudojamas ŽIV infekcijų gydymui, naudojamas ŽIV infekcijoms gydyti

vaistai kurie mažina kalio kiekį kraujyje, tokie kaip kai kurie diuretikai (šlapimą varantys vaistai) arba kai kurie vaistai astmai gydyti (tokie kaip metilksantinai ar steroidai)

kiti ilgai veikiančios vaistai, panašūs į šį vaistą, naudojami kvėpavimo problemoms gydyti, tokie kaip tiotropiumas ir indakaterolis. Nenaudokite ANORO ELLIPTA, jei jau vartojate šiuos vaistus.

Praneškite savo gydytojui ar vaistininkui, jei vartojate bet kurį iš šių vaistų. Jūsų gydytojas gali norėti atidžiai stebėti jus, jei vartojate bet kurį iš šių vaistų, nes jie gali sustiprinti ANORO ELLIPTA šalutinį poveikį.

#### Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar žindote kūdikį? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju. Nenaudokite šio vaisto, jei esate nėščia, nebent jūsų gydytojas nurodė, kad galite jį vartoti.

Nežinoma, ar ANORO ELLIPTA sudedamosios dalys gali patekti į motinos pieną. Jei žindote kūdikį, turėtumėte tai aptarti su savo gydytoju prieš vartodami ANORO ELLIPTA. Nenaudokite šio vaisto, jei žindote kūdikį, nebent jūsų gydytojas nurodė, kad galite jį vartoti.

#### Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Mažai tikėtina, kad ANORO ELLIPTA paveiks jūsų gebėjimą vairuoti ar naudoti mechanizmus.

#### ANORO ELLIPTA sudėtyje yra laktozės

Jei jūsų gydytojas jums pasakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju.

### 3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.

Rekomenduojama dozė yra viena inhaliacija kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Jums reikia inhaliuoti tik kartą per dieną, nes šio vaisto poveikis trunka 24 valandas. Nenaudokite daugiau, nei nurodė jūsų gydytojas.

#### Reguliariai vartokite ANORO ELLIPTA

Labai svarbu, kad ANORO ELLIPTA naudotumėte kasdien, kaip nurodė jūsų gydytojas. Tai padės jums išlikti be simptomų dieną ir naktį.

ANORO ELLIPTA negalima naudoti staigaus dusulio ar švokštimo priepuolio palengvinimui. Jei patiriate tokį priepuolį, turite naudoti greitai veikiančią skubios pagalbos inhaliatorių (pvz., salbutamolį).

#### Kaip naudoti inhaliatorių?

Visą informaciją rasite „Žingsnis po žingsnio instrukcijose“ šio pakuotės lapelio pabaigoje.

ANORO ELLIPTA skirtas naudoti įkvėpiant. Norėdami naudoti ANORO ELLIPTA, įkvėpkite jį į plaučius per burną su ELLIPTA inhaliatoriumi.

#### Jei jūsų simptomai nepagerėja

Jei jūsų LOPL simptomai (dusulys, švokštimas, kosulys) nepagerėja arba pablogėja, arba jei dažniau naudojate greitai veikiančią inhaliatorių:

kreipkitės kuo greičiau į savo gydytoją.

Ar naudojote per daug šio vaisto?

Jei netyčia naudojote per daug šio vaisto, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją ar vaistininką patarimo, nes jums gali prireikti medicininės pagalbos. Jei įmanoma, parodykite inhaliatorių, pakuotę ar šį pakuotės lapelį. Galbūt pastebėsite, kad jūsų širdis plaka greičiau nei įprastai, jaučiatės drebulys arba turite regos sutrikimų, sausą burną ar galvos skausmą.

Ar pamiršote naudoti šį vaistą?

Neįkvėpkite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę. Tiesiog įkvėpkite kitą dozę įprastu laiku.

Jei jūsų kvėpavimas pradeda švokšti arba jaučiate dusulį, naudokite greitai veikiančią skubios pagalbos inhaliatorių (pvz., salbutamolį) ir tada kreipkitės į gydytoją.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Naudokite šį vaistą tol, kol jūsų gydytojas rekomenduoja. Jis veiksmingas tik tol, kol jį naudojate. Nenustokite vartoti šio vaisto, nebent jūsų gydytojas tai patartų, net jei jaučiatės geriau, nes jūsų simptomai gali pablogėti.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį turi, nors ne visi su tuo susiduria.

**Alerginės reakcijos**

Jei po ANORO ELLIPTA vartojimo pasireiškia bet kuris iš šių simptomų, nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsdami praneškite savo gydytojui.

Kartais pasireiškiančios šalutinės reakcijos (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų):

odos bėrimas (dilgėlinė) arba paraudimas

Retai pasireiškiančios šalutinės reakcijos (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų):

patinimas, kartais veido ar burnos (angioedema)

stipriai pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys ar sunkumas kvėpuoti

staiga staiga pasijusti silpnam ar apsvaigusiam (tai gali sukelti alpimą ar sąmonės netekimą)

**Ūminiai kvėpavimo sunkumai**

Ūminiai kvėpavimo sunkumai po ANORO ELLIPTA vartojimo yra reti. Jei iškart po šio vaisto vartojimo jaučiate krūtinės spaudimą, kosulį ar pasunkėjusį kvėpavimą arba dusulį:

nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į medikus, nes gali būti, kad turite sunkią būklę, vadinamą paradoksinio bronchų spazmu.

Kiti šalutiniai poveikiai

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

skausmas šlapinantis arba dažnas šlapinimasis (tai gali būti šlapimo takų infekcijos požymiai)  
derinys gerklės skausmas ir sloga  
skausminga gerklė  
jausmas spaudimo ar skausmo skruostuose ir kaktoje (tai gali būti sinusų uždegimo, vadinamo sinusitu, požymiai)  
galvos skausmas  
kosulys  
skausmas ir dirginimas gerklės gale burnoje ir gerklėje  
vidurių užkietėjimas  
sausą burna  
infekcija iš viršutinių kvėpavimo takų

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

nereguliarus širdies ritmas  
greitesnis širdies ritmas  
jaučiasi širdies plakimas (palpitacijos)  
raumenų spazmai  
drebulys/virpėjimas  
pakitęs skonis  
užkimimas

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų)

neryškus matymas  
padidėjimas iš išmatuoto akių spaudimo  
sumažėjimas regėjimo ar skausmas akyse (galimi glaukomos požymiai)  
sunku šlapintis ir skausmas šlapinantis – tai gali būti šlapimo pūslės obstrukcijos ar šlapimo susilaikymo požymiai

Nežinomas (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis)

galvos svaigimas

Šalutinių reiškinių pranešimas šalutinis poveikis nacionalinę pranešimų sistemą, kaip nurodyta priede V priedas V Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, kuris nurodytas ant dėžutės, pakuotės ir inhaliatoriaus po „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Laikykite inhaliatorių uždarytoje pakuotėje, kad apsaugotumėte nuo drėgmės, ir išimkite jį tik prieš pirmą naudojimą. Kai pakuotė atidaryta, inhaliatorių galima naudoti ne ilgiau kaip 6 savaites nuo pakuotės atidarymo dienos. Užrašykite datą, kada inhaliatorių reikia išmesti, ant inhaliatoriaus etiketės tam skirtoje vietoje. Data turi būti užrašyta iškart, kai inhaliatorius išimamas iš pakuotės.

Laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Jei inhaliatorius laikomas šaldytuve, prieš naudojimą leiskite jam bent vieną valandą pasiekti kambario temperatūrą.

Vaistų neišpilkite į kriauklę ar tualetą ir nemeskite į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebenaudojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie sunaikinami atsakingai ir nepatenka į aplinką.

## 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kuris stVeikliosios medžiagos šiame vaistiniame preparate yra

umeclidiniumbromidas ir vilanterolis. ir vilanterolis.

umeclidinium (atitinka 65 mikrogramus umeclidiniumbromido ) ir 22 mikrogramus vilanterolio (kaiptrifenataatas trifenatatas).

Kitos šio vaisto medžiagos yra laktozės monohidratas (žr. 2 skyrių „ANORO ELLIPTA sudėtyje yra laktozės“) ir magnio stearatas.

Kaip atrodo ANORO ELLIPTA ir kiek yra pakuotėje?

ANORO ELLIPTA yra inhaliaciniai milteliai, iš anksto dozuoti.

Ellipta Ellipta Veikliosios medžiagos yra kaip balti milteliai atskirose lizdinėse plokštelėse inhaliatoriuje. ANORO ELLIPTA yra prieinama pakuotėse su 1 inhaliatoriumi, turinčiu arba 7, arba 30 dozių, ir

Veikliosios medžiagos yra kaip balti milteliai atskirose lizdinėse plokštelėse inhaliatoriuje.

ANORO ELLIPTA yra tiekiamas pakuotėse su 1 inhaliatoriumi, kuriame yra arba 7, arba 30 dozių ir daugiafunkcinės pakuotės Leidimoprekiuoti turėtojas:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija D24 YK11

Gamintojas:

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2

23 Rue Lavoisier

27000 Evreux

Prancūzija

Dėl visos informacijos apie šį vaistą kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

Belgija/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

UAB "BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC"

Tel: +370 52 691 947

lt@berlin-chemie.com

Bulgarija  
"Berlynas-Chemi/A. Menarini  
Bulgarija" EООД  
Tel.: +359 2 454 0950  
bcsofia@berlin-chemie.com

Liuksemburgas/Luxemburg  
GlaxoSmithKline Farmacija s.a./n.v.  
BelgiqueBelgien  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Čekija respublika  
GlaxoSmithKline, s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
[cz.info@gsk.com](mailto:cz.info@gsk.com)

Vengrija  
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.  
Tel.: +36 23501301  
bc-hu@berlin-chemie.com

Danmark  
GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Tlf.: + 45 36 35 91 00 dk-  
info@gsk.com

Malta  
GlaxoSmithKline Trading  
Services Limited  
Tel: +356 80065004

Transtoyou

Vokietija  
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Nyderlandai  
GlaxoSmithKline BV  
Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti  
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  
Tel: +372 667 5001 ee@berlin-chemie.com

Norvegija  
GlaxoSmithKline AS  
Tlf: + 47 22 70 20 00

Graikija  
Menarini Hellas A.E.  
Tel: +30 210 83161 11-13

Austrija  
GlaxoSmithKline Pharma GmbH  
Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Ispanija  
GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700 es-ci@gsk.com

Lenkija  
GSK Services Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Prancūzija  
Laboratorija GlaxoSmithKline Tel: + 33 (0)1 39 17 84 44  
diam@gsk.com

Portugalija  
GlaxoSmithKline – Produktai Farmaciniai,  
Lda.  
Tel: + 351 21 412 95 00  
FI.PT@gsk.com

Kroatija  
Berlin-Chemie Menarini Kroatija d.o.o. Tel: +385 1 4821 361  
office-croatia@berlin-chemie.com

Rumunija  
GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: +40 800672524

Airija  
GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovėnija  
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution  
Ljubljana d.o.o.  
Tel: +386 (0)1 300 2160  
slovenia@berlin-chemie.com

Islandija Vistor hf.  
Telefonas: + 354 535 7000

Slovakija respublika  
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution  
Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 544 30 730 slovakia@berlin-chemie.com

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 774 1111  
Suomija/Finlandija

GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: +357 80070017

Švedija

GlaxoSmithKline AB  
Tel: + 46 (0)8 638 93  
00  
info.produkt@gsk.co  
m

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

[lv@berlin-chemie.com](mailto:lv@berlin-chemie.com)

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas

Kiti informacijos šaltiniai

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros svetainėje:  
<http://www.ema.europa.eu>.

## Žingsnis po žingsnio instrukcijos

### Kas yra ELLIPTA inhaliatorius?

Pirmą kartą naudodami ANORO ELLIPTA, nereikia tikrinti, ar inhaliatorius veikia tinkamai; jis jau turi jau iš anksto dozuotas dozes en yra tiesiogiai paruoštas naudojimui.

Inhaliatorius yra supakuotas į dėžutę. Neatidarykite dėžutės, kol nebūsate pasiruošę pradėti naudoti savo naują inhaliatorių. Kai būsite pasiruošę naudoti inhaliatorių, nuplėškite apsauginę plėvelę nuo dėžutės, kad ją atidarytumėte. Dėžutėje yra sausiklio maišelis, skirtas sumažinti drėgmės kiekį. Išmeskite šį sausiklio maišelį. – jo negalima atidaryti, suvalgyti ar įkvėpti.

Kai išimate inhaliatorių iš dėžutės, jis yra „uždarytoje“ padėtyje. Neatidarykite inhaliatoriaus, kol nebūsate pasiruošę įkvėpti vaisto dozę. Kai dėžutė atidaroma, užrašykite „Išmesti iki“ datą ant inhaliatoriaus etiketės tam skirtoje vietoje. „Išmesti iki“ data yra 6 savaitės po dėžutės atidarymo datos. Nuo šios datos inhaliatoriaus naudoti nebegalima. Dėžutę galite išmesti po pirmojo atidarymo.

Jei inhaliatorius laikomas šaldytuve, leiskite jam bent vieną valandą prieš naudojimą sušilti iki kambario temperatūros.

Toliau pateiktos žingsnis po žingsnio inhaliatoriaus naudojimo instrukcijos galioja tiek 30 dozių inhaliatoriui (30 dienų atsargai), tiek 7 dozių inhaliatoriui (7 dienų atsargai).

### 1) Perskaitykite tai prieš pradėdami

Jei atidarote ir uždarote apsauginį dangtelį neįkvėpę vaisto, dozė prarandama.

Prarasta dozė saugiai laikoma inhaliatoriuje, bet ji nebepasiekiamo.

Neįmanoma per vieną įkvėpimą netyčia paimti papildomos vaisto dozės ar dvigubos dozės.

### 2) Paruošti dozėparuošti

Palaukite, kol būsite pasiruošę įkvėpti dozę, prieš atidarydami apsauginį dangtelį. Inhaliatoriaus ne kratykite purtyti.

Nuleiskite apsauginį dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Dabar galite įkvėpti savo vaistą.

Dozės skaitiklis sumažės 1, kad tai patvirtintų.

Jei dozės skaitiklis nesumažėja, kai išgirsite spragtelėjimą, inhaliatorius neišleis vaisto. Gražinkite jį savo vaistininkui patarimui.

### 3) Jūsų vaistas įkvėpti

Iškvėpkite kuo giliau, laikydami inhaliatorių toliau nuo burnos. Ne iškvėpkite į inhaliatorių.

Įdėkite kandiklį tarp lūpų ir tvirtai uždarykite lūpas aplink jį.

Neužblokuokite oro angos pirštais.

Įkvėpkite ilgai, tolygiai ir giliai. Sulaikykite kvėpavimą kuo ilgiau (bent 3-4 sekundes).  
Išimkite inhaliatorių iš burnos.  
Iškvėpkite lėtai ir ramiai.

Galbūt nejaučiate ar nejaučiate vaisto, net jei inhaliatorių naudojate teisingai.kt.

Jei norite išvalyti kandiklį, naudokite sausą šluostę prieš uždarydami apsauginį dangtelį.

4) Uždarykite inhaliatorių

Stumkite apsauginį dangtelį kuo aukščiau, kad uždengtumėte kandiklį.

Transtoyou