

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ARCOXIA 30 mg kaetud tabletid
ARCOXIA 60 mg kaetud tabletid
ARCOXIA 90 mg kaetud tabletid
ARCOXIA 120 mg kaetud tabletid
etorikoksiib

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht läbi enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest siin on oluline teave teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust teie arst või apteeker.

Sisu sellest sellest pakendi infoleht

1. Mis on ARCOXIA ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit võtta või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit võtta?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on ARCOXIA ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Mis on ARCOXIA?

ARCOXIA sisaldab toimeainet etorikoksiib. ARCOXIA kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse selektiivseteks COX-2 inhibiitoriteks. Need kuuluvad ravimite klassi, mida mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID-id) nimetatakse.

Milleks seda ravimit kasutatakse?

ARCOXIA aitab 16-aastastel ja vanematel inimestel artroosi, reumatoidartriidi, Bechterewi tõve ja podagra korral vähendada valu ja turset (põletikku) liigestes ja lihastes.

ARCOXIA-d kasutatakse ka 16-aastastel ja vanematel inimestel mõõduka valu lühiajaliseks raviks pärast hambaravi protseduuri.

Mis on artroos?

Artroos on liigeste haigus. See on tingitud kõhre järkjärgulisest lagunemisest, mis katab luude otsi. See põhjustab turset (põletikku), valu, tundlikkust, jäikust ja füüsilisi piiranguid.

Mis on reumatoidartriit?

Reumatoidartriit on pikaajaline põletikuline liigeste haigus. See põhjustab valu, jäikust ja turset, mille tõttu kahjustatud liigesed muutuvad järjest vähem liikuvaks. See võib põhjustada ka põletikku teistes kehaosades.

Mis on podagra?

Podagra on haigus, mille puhul esinevad äkilised, korduvad väga valuliku põletiku ja liigeste punetuse hood. Selle põhjuseks on mineraalkristallide kogunemine liigestes.

Mis on Bechterewi tõbi?

Bechterewi tõbi (Spondüliit anküloseeriv) on lülisamba ja suurte liigeste põletikuline haigus.

2. Millal ei tohi te seda ravimit võtta või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit võtta?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiab selle pakendi infolehe jaotisest 6.

Te olete allergiline mitte-steroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID-id), sealhulgas aspiriini ja COX-2 inhibiitorite suhtes (vt jaotis 4 'Võimalikud kõrvaltoimed').

Kui teil on praegu haavand või verejooks maos või soolestikus.

Kui teil on raske maksahaigus.

Kui teil on raske neeruhaigus.

Kui olete rase või võite olla rase või kui toidate last rinnaga (vt 'Rasedus, imetamine ja viljakus').

Kui olete alla 16-aastane.

Kui teil on põletikuline soolehaigus, nagu Crohn, soolepõletikud haavanditega (haavandiline koliit) või jämesoolepõletik (koliit).

Kui teil on kõrge vererõhk, mida ravi ei suuda piisavalt kontrolli all hoida (konsulterige oma arsti või õega, kui te pole kindel, kas teie vererõhk on piisavalt kontrolli all).

Kui teie arst on tuvastanud südameprobleeme, sealhulgas südamepuudulikkust (mõõdukas või raske vorm) või stenokardiat (valu rinnus).

Kui teil on olnud südameatakk, bypass-operatsioon või perifeerne arteriaalne veresoonehaigus (halb vereringe jalgades või jalgades kitsaste või blokeeritud arterite tõttu).

Kui teil on olnud mingi insuldi vorm (sealhulgas kerge insult või TIA (mööduv isheemiline atakk)). Etorikoksiib võib veidi suurendada südameataki või insuldi riski ja seetõttu ei tohi seda kasutada inimesed, kellel on juba olnud südameprobleeme või insult.

Kui arvate, et mõni ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta, ärge võtke tablette enne, kui olete oma arstiga konsulteenud.

Millal peaksite selle ravimiga eriti ettevaatlik olema?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi võtmist, kui:

Teil on kunagi diagnoositud mao verejooks või maohaavandid.

Te olete dehüdreeritud, näiteks pikaajalise oksendamise või kõhulahtisuse tõttu.

Teil on turse vedelikupeetuse tõttu.

Teil on kunagi diagnoositud südamepuudulikkus või mõni muu südamehaigus.

Kui teil on kunagi diagnoositud kõrge vererõhk. ARCOXIA võib mõnel inimesel vererõhku tõsta, eriti suurtes annustes, ja teie arst soovib aeg-ajalt teie vererõhku kontrollida.

Kui teil on kunagi diagnoositud maksa- või neeruhaigus.

Kui teid ravitakse infektsiooni vastu. ARCOXIA võib alla suruda palavikku, mis on infektsiooni sümptom.

Kui teil on diabeet, kõrge kolesteroolitase või te suitsetate. See võib suurendada teie riski südamehaiguste tekkeks.

Kui olete naine, kes üritab rasestuda.
Kui olete üle 65 aasta vana.

Kui te pole kindel, kas mõni ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta, pidage enne ARCOXIA võtmist nõu oma arstiga, et teada saada, kas see ravim sobib teile.

ARCOXIA toimib eakatel patsientidel sama hästi kui noorematel täiskasvanud patsientidel. Kui olete üle 65 aasta vana, soovib teie arst teid regulaarselt jälgida. Üle 65-aastastel patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Lapsed ja noorukid kuni 16 aastat
Ärge andke seda ravimit lastele ja noorukitele kuni 16 aastat.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?
Kas te kasutate lisaks ARCOXIA-le veel teisi ravimeid, kas olete seda hiljuti teinud või kavatsete seda varsti teha? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti.

Eriti kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, võib teie arst soovida teid jälgida, et veenduda, et teie ravimid toimivad endiselt hästi, kui olete alustanud ARCOXIA kasutamist:

ravimid mis vedeldavad verd (antikoagulandid), nagu varfariin
rifampitsiin (üks antibiootikum)
metotreksaat (ravim, mis pärsib immuunsüsteemi ja mida kasutatakse sageli reumatoidartriidi korral)
tsüklosporiin või takroliimus (ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi)
liitium (ravim teatud tüüpi depressiooni raviks)
ravimid kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse vastu, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks ja angiotensiiniretseptori blokaatoriteks, nagu enalapriil ja ramipriil, losartaan ja valsartaan
diureetikumid (veetabletid)
digoksiin (ravim südamepuudulikkuse ja ebaregulaarse südamerütmi vastu)
minoksidiil (ravim kõrge vererõhu vastu)
salbutamool, tabletid või lahus, suu kaudu manustamiseks (ravim astma korral)
de pill (kombinatsioon võib suurendada kõrvaltoimete riski)
hormonaalne asendusravi (kombinatsioon võib suurendada kõrvaltoimete riski)
aspiriin; maohaavandite risk on suurem, kui kasutate ARCOXIA-t koos aspiriiniga.
aspiriin südameatakkide või insuldi ennetamiseks:
ARCOXIA võib kasutada koos madala annuse aspiriiniga. Kui te võtate praegu madalaid annuseid aspiriini südameataki või insuldi ennetamiseks, ärge lõpetage selle võtmist ilma arstiga konsulteerimata.
aspiriin ja teised mitte-steroidseid põletikuvastased ravimid (NSAID-id):
Ärge kasutage suuri annuseid aspiriini või teisi põletikuvastaseid ravimeid, kui te kasutate ARCOXIA-t.

Millele peaksite tähelepanu pöörama söögi ja joogi osas?
ARCOXIA võib kiiremini toimima hakata, kui seda võetakse ilma toiduta.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

ARCOXIA tablette ei tohi kasutada raseduse ajal. Kui olete rase või arvate end olevat, või kui soovite rasestuda, ärge kasutage tablette. Kui te rasestute, lõpetage tablettide võtmine ja konsulteerige oma arstiga. Konsulteerige oma arstiga, kui olete ebakindel või soovite rohkem nõu.

Imetamine

Ei ole teada, kas ARCOXIA eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha, konsulteerige oma arstiga enne ARCOXIA kasutamist. Kui te kasutate ARCOXIA-t, ärge andke rinnaga.

Viljakus

ARCOXIA ei ole soovitatav naistele, kes soovivad rasestuda.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Pearinglus ja unisus on teatatud mõnede patsientide poolt, kes kasutasid ARCOXIA-t.

Ärge juhtige autot, kui tunnete peeringlust või unisust.

Ärge kasutage tööriistu ega masinaid, kui tunnete peeringlust või unisust.

ARCOXIA sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

ARCOXIA sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe kilekattega tableti kohta, mis tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit võtta?

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te pole kindel, kuidas seda kasutada, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage rohkem kui teie seisundile soovitatud annus. Teie arst soovib aeg-ajalt teie ravi arutada. On oluline, et kasutaksite madalaimat võimalikku annust, mis teie valu veel leevendab, ja te ei tohiks ARCOXIA't kasutada kauem kui vajalik. See on sellepärast, et pikaajalise ravi korral võib südameataki või insuldi risk suurenedada, eriti suurte annuste korral.

Sellel ravimil on saadaval erinevad tugevused. Sõltuvalt teie seisundist määrab arst teile kõige sobivama tugevuse.

Soovitatav annus on:

Artroos

Soovitatav annus on 30 mg üks kord päevas, vajadusel suurendage kuni maksimaalselt 60 mg üks kord päevas.

Reumatoidartriit

Soovitatav annus on 60 mg üks kord päevas, vajadusel suurendage kuni maksimaalselt 90 mg üks kord päevas.

Bechterewi tõbi

Soovitatav annus on 60 mg üks kord päevas, vajadusel suurendage maksimaalselt 90 mg-ni üks kord päevas.

Ägeda valuga seisundid

Etoricoxib tohib kasutada ainult ägeda valu perioodil.

Podagra

Soovitatav annus on 120 mg üks kord päevas ja seda tohib kasutada ainult ägeda valu perioodil, maksimaalselt 8 päeva jooksul.

Valu pärast hambaravi protseduuri

Soovitatav annus on 90 mg üks kord päevas, maksimaalselt 3 päeva jooksul.

Patsiendid koos maksaprobleemidega

Kui teil on kerge maksahaigus, ei tohi te võtta rohkem kui 60 mg üks kord päevas.

Kui teil on mõõdukas maksahaigus, ei tohi te võtta rohkem kui 30 mg üks kord päevas.

Lapsed ja noorukid kuni 16 aastat

ARCOXIA tabletid ei tohi kasutada lastel või noorukitel kuni 16 aastat.

Eakad

Eakate patsientide puhul ei ole vaja annust kohandada. Nagu teiste ravimite puhul, tuleb seda ravimit eakatel patsientidel ettevaatlikult kasutada.

Manustamisviis

ARCOXIA tabletid tuleb võtta üks kord päevas suu kaudu. ARCOXIA't võib võtta koos toiduga või ilma.

Kas olete võtnud liiga palju seda ravimit?

Te ei tohi kunagi võtta rohkem tablette, kui arst soovitab. Kui olete võtnud liiga palju ARCOXIA tablette, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kas olete unustanud seda ravimit võtta?

On oluline võtta ARCOXIA't nii, nagu arst on määranud. Kui unustate annuse, jätkake järgmisel päeval tavapärase ajakava järgi. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud tabletti tasa teha.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Mitte kõigil ei esine neid.

Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, peate ARCOXIA võtmise lõpetama ja kohe oma arstiga nõu pidama (vt lõik 2 'Millal ei tohi seda ravimit võtta või millal peate olema eriti ettevaatlik'):

kui teil tekib hingeldus, valu rinnus või tursed pahkludes, või need süvenevad

kui nahk ja silmad muutuvad kollaseks (kollatõbi) – see viitab maksaprobleemidele

kui teil on tugev või püsiv kõhuvalu või teie väljaheide muutub mustaks
kui teil tekib allergiline reaktsioon, sealhulgas võimalikud nahaprobleemid nagu
haavandid või villid, või näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib raskendada hingamist.

Järgmisi termineid kasutatakse, et näidata, kui sageli on kõrvaltoimeid teatatud:

Väga sageli (esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

Sageli (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10-st)

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st)

Harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 1000-st)

Väga harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda ARCOXIA-ravi ajal:

Väga sageli:

kõhuvalu

Sageli:

kuiv hambasomp (põletik ja valu pärast hamba või hamba eemaldamist)

turse jalgades ja/või jalgades vedelikupeetuse tõttu (ödeem)

pearinglus, peavalu

südamepekslemine (kiire või ebaregulaarne südametegevus), häiresüdamerütmia (arütmia)

kõrgenenud vererõhk

vilistav hingamine või hingeldus (bronhospasm)

kõhukinnisus, gaasid, mao limaskesta põletik (gastriit), kõrvetised, kõhulahtisus,

seedehäired (düspepsia) / maovaevused, iiveldus, oksendamine, söögitoru põletik, suuhaavandid

muutused vereanalüüside tulemustes maksa kohta

sinised verevalumid

nõrkus ja väsimus, gripilaadne haigus

Mõnikord:

gastro-enteriit (mao-soolepõletik / kõhugripp), ülemiste hingamisteede infektsioon, kuseteede infektsioon

muutused laboratoorsete uuringute tulemustes (punaste ja valgete vereliblede vähenemine, trombotsüütide vähenemine)

ülitundlikkusreaktsioon (allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi, mis võib olla nii tõsine, et vajate kohest arstiabi)

suurenenud või vähenenud isu, kaalutõus

ärevus, depressioon, vähenenud teravus, asjade nägemine, tundmine või kuulmine, mida pole olemas (hallutsinatsioonid)

muutunud maitse, unetus, tuimus või surin, unisus

hägune nägemine, silmade ärritus ja punetus

kõrvalheli, peapööritus

südamerütmihäired (kodade virvendus), kiirenenud südametegevus,

südamepuudulikkus, ahistav, valulik raskustunne rinnus (stenokardia), südameatakk

liigne punetus, insult, kerge insult (TIA), tõsiselt kõrgenenud vererõhk, veresoonte põletik

köha, hingeldus, ninaverejooks

paistes magu või kõht, muutus teie väljaheite mustris, suukuivus, maohaavand, mao limaskestast põletik, mis võib muutuda tõsiseks ja hakata veritsema, ärritunud soole sündroom, kõhunäärme põletik
turse näol, nahalööve või sügelus, naha punetus
lihaste kramp/spasm, lihasvalujäikus
kõrgeenenud kaaliumisisaldus veres, muutused neerude vere- või uriinianalüüside tulemustes, tõsised neeruprobleemid
valu peal rind

Harva:

angio-ödeem (allergiline reaktsioon, mille korral nägu, huuled, keel ja/või kõri võivad paistetada, põhjustades hingamis- või neelamisraskusi, ning mis võib olla nii tõsine, et vajab kohest arstiabi) / anafülaktiline / anafülaktoidne reaktsioon, sealhulgas šokk (tõsine allergiline reaktsioon, mis vajab kohest arstiabi)
segasus, rahutus
maksaprobleemid (hepatiit)
madal naatriumisisaldus veres veri
maksapuudulikkus, naha või silmade kollane värvumine (kollatõbi)
raske nahareaktsioonid

Teatamine kõrvaltoimetest alates kõrvaltoimed

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Te võite kõrvaltoimetest teatada ka Hollandi kõrvaltoimete keskuse kaudu Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg on märgitud karbile pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Pudelid: hoidke pudel hoolikalt suletuna, et kaitsta niiskuse eest.

Blisterpakendid: hoidke originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need õigesti ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on etoricoxib. Iga kilekattega tablett sisaldab 30, 60, 90 või 120 mg etoricoxib.

Selle ravimi muud ained on:

Südamik: veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumkroskarmelloos
Tableti kate:

karnaubavaha laktoosmonohüdraathüpromelloos laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), triatsetiin. Tabletid 30, 60 ja 120 mg sisaldavad ka kollast raudoksiidi (E172, värvaine) ja indigotiini (E132, värvaine).

Kuidas ARCOXIA välja näeb ja mis on pakendis?

ARCOXIA tabletid on saadaval neljas tugevuses:

30 mg tabletid: sinakasrohelised, õunakuju, kaksikkumerad kilekattega tabletid, mille ühel küljel on 'ACX 30' ja teisel küljel '101'.

60 mg tabletid: tumerohelised, õunakuju, kaksikkumerad kilekattega tabletid, mille ühel küljel on 'ARCOXIA 60' ja teisel küljel '200'.

90 mg tabletid: valged, õunakuju, kaksikkumerad kilekattega tabletid, mille ühel küljel on 'ARCOXIA 90' ja teisel küljel '202'.

120 mg tabletid: kahvaturhelised, õunakuju, kaksikkumerad kilekattega tabletid, mille ühel küljel on 'ARCOXIA 120' ja teisel küljel '204'.

Pakendi suurused:

30 mg:

blisterpakendid koos 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 tableti või suurpakenditega 98 (2 pakki 49) tabletti.

60 mg

blisterpakendid koos 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tableti või suurpakenditega 98 (2 pakki 49) tabletti; või pudelid 30 ja 90 tabletiga koos kuivatuskapslitega. Kuivatuskapsel (üks või kaks kapslit) pudelis on mõeldud tablettide kuivana hoidmiseks, mitte sissevõtmiseks.

90 mg:

blisterpakendid koos 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tableti või suurpakenditega 98 (2 pakki 49) tabletti; või pudelid 30 ja 90 tabletiga koos kuivatuskapslitega. Kuivatuskapsel (üks või kaks kapslit) pudelis on mõeldud tablettide kuivana hoidmiseks, mitte sissevõtmiseks.

120 mg:

blisterpakendid koos 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 tableti või suurpakenditega 98 (2 pakki 49) tabletti; või pudelid 30 ja 90 tabletiga koos kuivatuskapslitega. Kuivatuskapsel (üks või kaks kapslit) pudelis on mõeldud tablettide kuivana hoidmiseks, mitte sissevõtmiseks.

60, 90 ja 120 mg: alumiinium/alumiinium blisterpakendid ühekordseks kasutamiseks 5, 50 või 100 tabletiga. Kõiki loetletud pakendisuurusi ei pruugita turustada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Tel.: 00800 66550123

E-post: dpoc.benelux@organon.com

Tootja:

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland

Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Vianex S.A (ainult Kreeka
jaoks)
15th Km Marathonos
Ave.
15351 Pallini
Attikis
Ateena
Kreeka

Registrisse kantud RVG 34279 (30 mg), RVG 27705 (60 mg), RVG 27706 (90 mg) ja RVG 27707 (120 mg) all.

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

Belgia, Luksemburg	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletid kaetud
Taani, Eesti, Island, Norra	Arcoxia
Iririmaa, Ühendatud Kuningriik	ARCOXIA 30, 60, 90 või 120 mg kaetud tabletid
Küpros, Malta	ARCOXIA 60, 90, 120 mg kaetud tabletid
Saksamaa	ARCOXIA 30/60/90/120 mg Filmtabletid
Soome	Arcoxia 30, 60, 90 ja 120 mg tablett, kilekattega
Prantsusmaa	ARCOXIA 30, 60 mg tablett kaetud
Kreeka	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg kaetud tabletid
Ungari	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg kaetud tablett
Itaalia	ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg tabletid kaetud kaetud kile
Läti	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg ja 120 mg kaetud tabletid
Leedu	Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg kile kaetud tabletid
Holland	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, kilekaetud tabletid
Austria	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg-Kaetud tabletid
Poola	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletid

	kaetud
Portugal	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletid kaetud filmiga kaetud
Sloveenia	Arcoxia 30/60/90/120 mg filmiga kaetud tabletid
Slovakkia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Hispaania	ARCOXIA 30, 60, 90 ja 120 mg tabletid kaetud koos kilekattega
Tšehhi	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, kaetud tabletid
Rootsi	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg ja 120 mg kilekattega tabletid

Seda infolehte on viimati kinnitatud novembris 2023.

Muud teabeallikad

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Ravimiameti veebisaidilt (www.cbg-meb.nl).