

Notice : information pour l'utilisateur

ARCOXIA 30 mg pelliculés comprimés
ARCOXIA 60 mg pelliculés comprimés
ARCOXIA 90 mg pelliculés comprimés
ARCOXIA 120 mg pelliculés comprimés
étoricoxib

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Vous avez des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit uniquement. Cela pourrait être dangereux pour d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous.

Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce qu'ARCOXIA et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?
2. Quand ne devez-vous pas prendre ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Effets indésirables
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'ARCOXIA et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Qu'est-ce qu'ARCOXIA ?

ARCOXIA contient la substance active étoricoxib. ARCOXIA appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la COX-2. Ceux-ci appartiennent à une classe de médicaments qui non stéroïdiens anti-inflammatoires (AINS) sont appelés.

À quoi sert ce médicament ?

ARCOXIA aide les personnes de 16 ans et plus souffrant d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Bechterew et de goutte à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles.

ARCOXIA est également utilisé chez les personnes de 16 ans et plus pour un traitement de courte durée de la douleur modérée après une intervention dentaire.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une affection des articulations. Elle résulte d'une dégradation progressive du cartilage qui recouvre les extrémités des os. Cela provoque un gonflement (inflammation), de la douleur, de la sensibilité, de la raideur et des limitations physiques.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque douleur, raideur et gonflement, rendant les articulations touchées de plus en plus

difficiles à bouger. Elle peut également causer une inflammation dans d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie caractérisée par des crises soudaines et récurrentes d'inflammation très douloureuse et de rougeur des articulations. Elle est causée par l'accumulation de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la maladie de Bechterew ?

La maladie de Bechterew (Spondylite ankylosante) est une affection inflammatoire de la colonne vertébrale et des grandes articulations.

2. Quand ne devez-vous pas prendre ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas prendre ce médicament ?

Vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous trouverez ces substances à la rubrique 6 de cette notice.

Vous êtes allergique aux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs de la COX-2 (voir rubrique 4 'Effets indésirables possibles').

Si vous avez actuellement un ulcère ou un saignement dans l'estomac ou les intestins.

Si vous avez une maladie hépatique sévère.

Si vous avez une maladie rénale sévère.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez (voir 'Grossesse, allaitement et fertilité').

Si vous avez moins de 16 ans.

Si vous avez une maladie intestinale inflammatoire, telle que la maladie de Crohn, inflammations intestinales avec ulcères (colite ulcéreuse) ou inflammation du côlon (colite).

Si vous avez une hypertension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée par le traitement (consultez votre médecin ou infirmier/ère si vous n'êtes pas sûr que votre tension artérielle soit suffisamment contrôlée).

Si votre médecin a diagnostiqué des problèmes cardiaques, y compris une insuffisance cardiaque (formes modérées ou sévères) ou une angine de poitrine (douleur thoracique).

Si vous avez eu une crise cardiaque, pontage ou une maladie artérielle périphérique (mauvaise circulation sanguine dans les jambes ou les pieds due à des artères rétrécies ou bloquées).

Si vous avez eu une forme d'accident vasculaire cérébral (y compris un accident ischémique transitoire ou AIT (transitoire ischémique attaque)). Etoricoxib peut légèrement augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral et ne doit donc pas être utilisé par les personnes ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un AVC.

Si vous pensez qu'un des points ci-dessus s'applique à vous, ne prenez pas les comprimés avant d'avoir consulté votre médecin.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?

Contactez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si :

Des saignements ou des ulcères gastriques ont déjà été diagnostiqués chez vous.
Vous êtes déshydraté, par exemple à cause de vomissements ou de diarrhées prolongés.

Vous avez un gonflement dû à une rétention d'eau.

Une insuffisance cardiaque ou une autre maladie cardiaque a déjà été diagnostiquée chez vous.

Si on vous a déjà diagnostiqué une hypertension artérielle. ARCOXIA peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes, surtout à fortes doses, et votre médecin voudra contrôler votre pression artérielle de temps en temps.

Si on vous a déjà diagnostiqué une maladie du foie ou des reins.

Si vous êtes traité pour une infection. ARCOXIA peut masquer la fièvre, qui est un symptôme d'infection.

Si vous êtes diabétique, avez un taux de cholestérol élevé ou si vous fumez. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Si vous êtes une femme qui essaie de devenir enceinte.

Si vous avez plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus s'applique à vous, consultez d'abord votre médecin pour savoir si ARCOXIA vous convient avant de prendre ce médicament.

ARCOXIA est aussi efficace chez les patients âgés que chez les jeunes adultes. Si vous avez plus de 65 ans, votre médecin voudra vous surveiller régulièrement. Pour les patients de plus de 65 ans, il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie.

Enfants et adolescents jusqu'à 16 ans

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Prenez-vous d'autres médicaments?

Prenez-vous d'autres médicaments en plus d'ARCOXIA, l'avez-vous fait récemment ou allez-vous peut-être le faire bientôt? Informez-en votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux médicaments pour lesquels vous n'avez pas besoin d'ordonnance.

Surtout si vous prenez l'un des médicaments suivants, votre médecin voudra peut-être vous surveiller pour s'assurer que vos médicaments fonctionnent toujours bien lorsque vous commencez ARCOXIA:

médicaments qui fluidifient le sang (anticoagulants), comme la warfarine

rifampicine (un antibiotique)

méthotrexate (un médicament pour supprimer le système immunitaire souvent utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde)

ciclosporine ou tacrolimus (médicaments qui suppriment le système immunitaire)

lithium (un médicament pour le traitement de certains types de dépression)

médicaments contre l'hypertension et l'insuffisance cardiaque appelés inhibiteurs de l'ECA et bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine tels que énalapril et ramipril,

losartan et valsartan

diurétiques (comprimés diurétiques)

digoxine (un médicament contre l'insuffisance cardiaque et les arythmies)

minoxidil (un médicament contre l'hypertension)

salbutamol, comprimés ou solution, à prendre par voie orale (un médicament pour l'asthme)

la pilule (la combinaison peut augmenter le risque d'effets secondaires)

thérapie hormonale substitutive (la combinaison peut augmenter le risque d'effets secondaires)

aspirine; le risque d'ulcères gastriques est plus élevé si vous utilisez ARCOXIA avec de l'aspirine.

aspirine pour la prévention des crises cardiaques ou d'un AVC :

ARCOXIA peut être utilisé avec une faible dose d'aspirine. Si vous prenez actuellement de faibles doses d'aspirine pour prévenir une crise cardiaque ou un AVC, vous ne devez pas arrêter sans consulter votre médecin.

aspirine et autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

N'utilisez pas de fortes doses d'aspirine ou d'autres médicaments anti-inflammatoires si vous prenez ARCOXIA.

N'utilisez pas de fortes doses d'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires si vous prenez ARCOXIA.

À quoi devez-vous faire attention avec la nourriture et les boissons ?

ARCOXIA peut agir plus rapidement s'il est pris sans nourriture.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, ou si vous souhaitez devenir enceinte, n'utilisez pas les comprimés. Si vous tombez enceinte, arrêtez de prendre les comprimés et consultez votre médecin. Consultez votre médecin si vous êtes incertaine ou si vous souhaitez plus de conseils.

Allaitement

On ne sait pas si ARCOXIA passe dans le lait maternel. Si vous allaitez ou envisagez de le faire, consultez votre médecin avant d'utiliser ARCOXIA. Si vous utilisez ARCOXIA, n'allaites pas.

Fertilité

Fertilité

ARCOXIA n'est pas recommandé pour les femmes qui souhaitent devenir enceintes.

Conduite et utilisation de machines

Ne conduisez pas si vous remarquez que vous êtes étourdi ou somnolent.

N'utilisez pas d'outils ou de machines si vous remarquez que vous êtes étourdi ou somnolent.

ARCOXIA contient du lactose

Si votre médecin vous a dit que vous ne tolérez pas certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

ARCOXIA contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé pelliculé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement 'sans sodium'.

3. Comment prendre ce médicament ?

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur l'utilisation correcte ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

N'utilisez pas plus que la dose recommandée pour votre condition. Votre médecin voudra discuter de votre traitement avec vous de temps en temps. Il est important que vous utilisiez la dose la plus faible qui soulage encore votre douleur et vous ne devez pas utiliser ARCOXIA plus longtemps que nécessaire. C'est parce que le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral peut augmenter après un traitement prolongé, surtout à fortes doses.

Il existe différentes forces de ce médicament disponibles. Selon votre condition, votre médecin prescrira la force qui vous convient le mieux.

La posologie conseillée est :

Arthrose

La dose conseillée est de 30 mg une fois par jour, à augmenter si nécessaire jusqu'à un maximum de 60 mg une fois par jour.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose conseillée est de 60 mg une fois par jour, à augmenter si nécessaire jusqu'à un maximum de 90 mg une fois par jour.

Maladie de Bechterew

La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmenter si nécessaire jusqu'à un maximum de 90 mg une fois par jour.

Affections avec douleur aiguë

Étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour et ne doit être utilisée que pendant la période de douleur aiguë, avec un maximum de 8 jours de traitement.

Douleur après une intervention dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, avec un maximum de 3 jours de traitement.

Patients avec problèmes hépatiques

Si vous avez une forme légère de maladie du foie, vous ne devez pas prendre plus de 60 mg une fois par jour.

Si vous avez une forme modérée de maladie du foie, vous ne devez pas prendre plus de 30 mg une fois par jour.

Enfants et adolescents jusqu'à 16 ans

Les comprimés ARCOXIA ne doivent pas être utilisés par les enfants ou les adolescents jusqu'à 16 ans.

Personnes âgées

Pour les patients âgés, il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie. Comme avec d'autres médicaments, ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les patients âgés.

Mode d'administration

ARCOXIA comprimés doivent être pris une fois par jour par voie orale. ARCOXIA peut être pris avec ou sans nourriture.

Avez-vous pris trop de ce médicament ?

Vous ne devez jamais prendre plus de comprimés que ce que votre médecin recommande. Si vous prenez trop de comprimés d'ARCOXIA, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Avez-vous oublié de prendre ce médicament ?

Il est important de prendre ARCOXIA comme prescrit par votre médecin. Si vous oubliez une dose, continuez simplement le lendemain avec le schéma habituel. Ne prenez pas de dose double pour compenser un comprimé oublié.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets secondaires. Tout le monde n'y est pas sujet.

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, vous devez arrêter ARCOXIA et consulter immédiatement votre médecin (voir rubrique 2 'Quand ne pas prendre ce médicament ou quand être particulièrement prudent ?'):

vous avez des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques ou des chevilles enflées, ou ces symptômes s'aggravent
la peau et les yeux deviennent jaunes (jaunisse) – cela indique des problèmes hépatiques
douleurs abdominales sévères ou persistantes ou vos selles deviennent noires
une réaction allergique, y compris des problèmes de peau tels que des ulcères ou des cloques, ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge rendant la respiration difficile.

Les termes suivants sont utilisés pour indiquer la fréquence des effets secondaires signalés :

Très fréquent (survient chez plus de 1 utilisateur sur 10)

Fréquent (survient chez moins de 1 utilisateur sur 10)

Parfois (survient chez moins de 1 utilisateur sur 100)

Rare (survient chez moins de 1 utilisateur sur 1 000)

Très rare (survient chez moins de 1 utilisateur sur 10 000)

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors du traitement par ARCOXIA :

Très fréquent:

douleur à l'estomac

Fréquent :

alvéolite sèche (inflammation et douleur après l'extraction d'une dent ou d'une molaire)
gonflement
gonflement vertiges
vertigemaux de tête palpitations
(battements de cœur rapides ou irréguliers), stoo (rythme cardiaque rapide ou irrégulier), trotroubles du rythme cardiaque (arythmie)
augmentée pression artérielle
sifflante respiration ou essoufflement (bronchospasme)
constipation, flatulences, gastrite, brûlures d'estomac, diarrhée, dyspepsie/troubles digestifs, nausées, vomissements, œsophagite, ulcères buccaux
changements dans les résultats des tests sanguins pour votre foie
bleus ecchymoses
faiblesse et fatigue, état grippal maladie

Parfois :

gastro-entérite (gastro-entérite) infection des voies respiratoires supérieures, infection urinaire
changements dans les résultats des analyses de laboratoire (diminution des globules rouges et blancs, diminution des plaquettes)
réaction d'hypersensibilité (une réaction allergique incluant l'urticaire, qui peut être si grave que vous avez besoin de soins médicaux immédiats)
augmentation ou diminution appétit, prise de poids
anxiété, dépression, diminution de la lucidité, voir, sentir ou entendre des choses qui n'existent pas (hallucinations)
altération du goût, incapacité à dormir, sensation d'engourdissement ou de picotements, somnolence
vision floue voir, irritation et rougeur de l'œil
acouphènes, vertiges
arythmies cardiaques (fibrillation auriculaire), tachycardie, insuffisance cardiaque, sensation oppressante, douleur thoracique (angine de poitrine), crise cardiaque
excessif rougeur, accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire (AIT), hypertension artérielle sévère, inflammation des vaisseaux sanguins
toux, essoufflement, épistaxis
gonflé estomac ou abdomen, changement de votre transit intestinal, bouche sèche, ulcère gastrique, inflammation de la paroi de l'estomac qui peut devenir grave et saigner, syndrome du côlon irritable, inflammation du pancréas
gonflement du visage, éruption cutanée ou démangeaisons, rougeur de la peau
crampe musculaire/spasme, douleurs musculaires/raideur
augmenté taux de potassium dans votre sang, modifications des résultats des tests sanguins ou urinaires pour vos reins, problèmes rénaux graves
douleur sur la poitrine

Rarement:

angio-œdème (une réaction allergique avec gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés respiratoires ou de déglutition et nécessitant des soins médicaux immédiats) / réaction anaphylactique/anaphylactoïde y compris choc (une réaction allergique grave nécessitant des soins médicaux immédiats)
confusion, agitation
problèmes hépatiques (hépatite)

diminué taux de sodium dans le sang
insuffisance hépatique, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse)
grave réactions cutanées

Le signaler des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web : www.lareb.nl. En signalant les effets indésirables, vous nous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Celle-ci est indiquée sur la boîte après EXP. Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Flacons : garder le flacon soigneusement fermé pour le protéger de l'humidité.

Plaquettes : conserver dans l'emballage d'origine pour protéger de l'humidité.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous éliminez les médicaments correctement, ils seront détruits de manière appropriée et ne pollueront pas l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles substances contient ce médicament ?

La substance active dans ce médicament est etoricoxib. Chaque comprimé pelliculé contient 30, 60, 90 ou 120 mg etoricoxib.

Les autres substances dans ce médicament sont :

Noyau : phosphate de calcium anhydre, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline.

Pelliculage : cire de carnauba, lactose monohydraté, hypromellose, dioxyde de titane (E171), triacétine. Les comprimés de 30, 60 et 120 mg contiennent également de l'oxyde de fer jaune (E172, colorant) et de l'indigotine (E132, colorant).

À quoi ressemble ARCOXIA et que contient un emballage ?

Comprimés ARCOXIA sont disponibles en quatre dosages :

Comprimés de 30 mg : bleu-vert, en forme de pomme, biconvexe pelliculés comprimés avec 'ACX 30' d'un côté et '101' de l'autre côté.

Comprimés de 60 mg : vert foncé, en forme de pomme, biconvexe pelliculés comprimés avec 'ARCOXIA 60' d'un côté et '200' de l'autre côté.

Comprimés de 90 mg : blancs, en forme de pomme, biconvexe pelliculés comprimés avec 'ARCOXIA 90' d'un côté et '202' de l'autre côté.

Comprimés de 120 mg : vert pâle, en forme de pomme, biconvexe pelliculés comprimés avec 'ARCOXIA 120' d'un côté et '204' de l'autre côté.

Tailles d'emballage :

30 mg :

blisters avec 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 comprimés ou grands conditionnements de 98 (2 emballages de 49) comprimés.

60 mg

emballages sous blister avec 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 comprimés ou grands conditionnements avec 98 (2 emballages de 49) comprimés; ou flacons avec 30 et 90 comprimés avec capsules dessiccantes. La capsule dessiccante (une ou deux capsules) dans le flacon est destinée à garder les comprimés au sec et ne doit pas être ingérée.

90 mg:

emballages sous blister avec 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 comprimés ou grands conditionnements avec 98 (2 emballages de 49) comprimés; ou flacons avec 30 et 90 comprimés avec capsules dessiccantes. La capsule dessiccante (une ou deux capsules) dans le flacon est destinée à garder les comprimés au sec et ne doit pas être ingérée.

120 mg:

emballages sous blister avec 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 comprimés ou grands conditionnements avec 98 (2 emballages de 49) comprimés; ou flacons avec 30 et 90 comprimés avec capsules dessiccantes. La capsule dessiccante (une ou deux capsules) dans le flacon est destinée à garder les comprimés au sec et ne doit pas être ingérée.

60, 90 et 120 mg: emballages sous blister aluminium/aluminium à usage unique de 5, 50 ou 100 comprimés. Toutes les tailles de conditionnement mentionnées ne sont pas commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation: N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Tél.: 00800 66550123

E-mail: dpoc.benelux@organon.com

Fabricant:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Pays-Bas

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgique

Vianex S.A (uniquement pour la Grèce)
15e Km Marathonos
Ave.
15351 Pallini
Attikis
Athènes
Grèce

Enregistré sous RVG 34279 (30 mg), RVG 27705 (60 mg), RVG 27706 (90 mg) et RVG 27707 (120 mg).

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'EEE sous les noms suivants :

Belgique, Luxembourg	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimés pelliculés
Danemark, Estonie, Islande, Norvège	Arcoxia
Irlande, Royaume Uni	ARCOXIA 30, 60, 90 ou 120 mg comprimés pelliculés
Chypre, Malte	ARCOXIA 60, 90, 120 mg comprimés pelliculés
Allemagne	ARCOXIA 30/60/90/120 mg comprimés pelliculés
Finlande	Arcoxia 30, 60, 90 et 120 mg comprimé, pelliculé
France	ARCOXIA 30, 60 mg comprimé pelliculé
Grèce	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimés pelliculés
Hongrie	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimé pelliculé
Italie	ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg comprimés enrobés avec film
Lettonie	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg et 120 mg pelliculées comprimés
Lituanie	Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg pellicule enrobées comprimés
Pays-Bas	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, pelliculés comprimés
Autriche	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg- Comprimés pelliculés
Pologne	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimés pelliculés
Portugal	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimés enrobés par film
Slovénie	Arcoxia 30/60/90/120 mg pelliculés enrobés comprimés
Slovaquie	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Espagne	ARCOXIA 30, 60, 90 et 120 mg comprimés enrobés

	avec pellicule
Tchéquie	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, comprimés enrobés comprimés
Suède	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg et 120 mg comprimés pelliculés comprimés

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en novembre 2023.

Autres sources d'information

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce médicament sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament (www.cbg-meb.nl).

Transtoyou