

Prospect: informații pentru utilizator

ARCOXIA 30 mg filmate comprimate
ARCOXIA 60 mg filmate comprimate
ARCOXIA 90 mg filmate comprimate
ARCOXIA 120 mg filmate comprimate
etoricoxib

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.

Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Conținutul acestui prospect prospect medicamentos

1. Când nu trebuie să luați acest medicament sau când trebuie să fiți deosebit de atent?
2. Cum se administrează acest medicament?
3. Posibile
4. efecte secundare Cum se păstrează acest medicament?
5. Conținutul ambalajului și alte informații
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este ARCOXIA?

ARCOXIA conține substanța activă

etoricoxib etoricoxib. ARCOXIA face parte dintr-un grup de medicamente numite inhibitori selectivi ai COX-2. Acestea fac parte dintr-o clasă de medicamente numite nesteroidiene antiinflamatoare (AINS).

Pentru ce se utilizează acest medicament?

ARCOXIA ajută persoanele de 16 ani și peste cu artroză, artrită reumatoidă, boala Bechterew și gută să reducă durerea și umflarea (inflamația) în articulații și mușchi. ARCOXIA este de asemenea utilizat la persoanele de 16 ani și peste pentru un tratament de scurtă durată al durerii moderate după o intervenție dentară.

Ce este artroza?

Artroza este o afecțiune a articulațiilor. Aceasta este rezultatul unei degradări treptate a cartilajului care acoperă capetele oaselor. Aceasta cauzează umflături (inflamație), durere, sensibilitate, rigiditate și limitări fizice.

Ce este artrita reumatoidă?

Artrita reumatoidă este o afecțiune inflamatorie de lungă durată a articulațiilor. Aceasta cauzează durere, rigiditate și umflături, iar articulațiile afectate pot deveni din ce în ce mai greu de mișcat. Poate provoca, de asemenea, inflamații în alte părți ale corpului.

Ce este gutta?

Guta este o boală cu atacuri bruște, recurente de inflamație foarte dureroasă și roșeață a articulațiilor. Este cauzată de acumularea de cristale minerale în articulații.

Ce este boala Bechterew?

Boala Bechterew (Spondilita anchilozantă) este o afecțiune inflamatorie a coloanei vertebrale și a articulațiilor mari.

2. Când nu trebuie să luați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să luați acest medicament?

Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6 a acestui prospect.

Sunteți alergic la steroidiene medicamente antiinflamatoare (AINS), inclusiv aspirină și inhibitori COX-2 (vezi secțiunea 4 'Reacții adverse posibile').

Dacă aveți în prezent un ulcer sau sângerare în stomac sau intestine.

Dacă aveți o boală hepatică severă.

Dacă aveți o boală renală severă.

Dacă sunteți gravidă sau ați putea fi gravidă sau dacă alăptați (vezi 'Sarcină, alăptare și fertilitate').

Dacă aveți sub 16 ani.

Dacă aveți o boală intestinală inflamatorie, cum ar fi boala Crohn, inflamații intestinale cu ulcere (colită ulcerativă) sau inflamația colonului (colită).

Dacă aveți hipertensiune arterială care nu este suficient controlată prin tratament (consultați-vă cu medicul sau asistenta dacă nu sunteți sigur dacă tensiunea arterială este suficient controlată).

Dacă medicul dumneavoastră a constatat probleme cardiace, inclusiv insuficiență cardiacă (forme moderate sau severe) sau angină pectorală (durere în piept).

Dacă ați avut un atac de cord, operație de bypass sau boală arterială periferică (circulație sanguină deficitară în picioare sau picioare din cauza arterelor îngustate sau blocate).

Dacă ați avut o formă de accident vascular cerebral (inclusiv un accident vascular cerebral ușor sau AIT (tranzitorie ischemică atac)). Etoricoxib poate crește ușor riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral și, prin urmare, nu trebuie utilizat de persoanele care au avut deja probleme cardiace sau un accident vascular cerebral.

Dacă credeți că unul dintre punctele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, nu luați comprimatele până nu ați consultat medicul.

Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a lua acest medicament dacă:

La dumneavoastră au fost diagnosticate vreodată sângerări gastrice sau ulcere gastrice.

Sunteți deshidratat, de exemplu, din cauza vărsăturilor prelungite sau a diareei.

Aveți o umflare din cauza retenției de lichide.

La dumneavoastră a fost diagnosticată vreodată insuficiență cardiacă sau o altă afecțiune cardiacă.

Dacă vi s-a constatat vreodată hipertensiune arterială. ARCOXIA poate crește tensiunea arterială la unele persoane, mai ales la doze mari, și medicul dumneavoastră va dori să vă verifice tensiunea arterială din când în când.

Dacă vi s-a constatat vreodată o boală de ficat sau de rinichi.

Dacă sunteți tratat pentru o infecție. ARCOXIA poate suprima febra, care este un simptom al infecției.

Dacă aveți diabet, colesterol crescut sau fumați. Acest lucru poate crește riscul de a dezvolta o afecțiune cardiacă.

Dacă sunteți o femeie care încearcă să rămână însărcinată.

Dacă aveți peste 65 de ani.

Dacă nu sunteți sigur dacă vreunul dintre punctele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, consultați mai întâi medicul dumneavoastră pentru a vedea dacă ARCOXIA este potrivit pentru dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

ARCOXIA funcționează la pacienții vârstnici la fel de bine ca la pacienții adulți mai tineri. Dacă aveți peste 65 de ani, medicul dumneavoastră va dori să vă monitorizeze regulat. Pentru pacienții cu vârsta peste 65 de ani, nu este necesară ajustarea dozei.

Copii și adolescenți până la 16 ani

Nu administrați acest medicament copiilor și adolescenților sub 16 ani.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați alte medicamente pe lângă ARCOXIA, ați făcut-o recent sau intenționați să o faceți în curând? Informați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și medicamentelor pentru care nu aveți nevoie de prescripție medicală.

Mai ales dacă utilizați unul dintre următoarele medicamente, medicul dumneavoastră va dori să vă monitorizeze pentru a se asigura că medicamentele dumneavoastră funcționează bine atunci când începeți tratamentul cu ARCOXIA:

medicamente care subțiază sângele (anticoagulante), cum ar fi warfarina
rifampicina (un antibiotic)

metotrexat (un medicament pentru a suprima sistemul imunitar, adesea utilizat în
artrita reumatoidă)

ciclosporină sau tacrolimus (medicamente care suprimă sistemul imunitar)

litiu (un medicament pentru tratamentul anumitor tipuri de depresie)

medicamente pentru hipertensiune arterială și insuficiență cardiacă numite inhibitori ai
ECA și blocante ale receptorilor de angiotensină, cum ar fi enalapril și ramipril, losartan
și valsartan

diuretice (comprimate filmate)

digoxină (un medicament împotriva insuficienței cardiace și a aritmiilor)

minoxidil (un medicament împotriva hipertensiunii arteriale)

salbutamol, comprimate sau soluție, administrate pe cale orală (un medicament pentru
astm)

pilula (combinația poate crește riscul de efecte secundare)

terapia de substituție hormonală (combinația poate crește riscul de efecte secundare)

aspirină; riscul de ulcere gastrice este mai mare dacă utilizați ARCOXIA împreună cu
aspirina.

aspirină pentru prevenirea atacurilor de cord sau a unui accident vascular
cerebral:

ARCOXIA poate fi utilizat împreună cu o doză mică de aspirină. Dacă în prezent
luați doze mici de aspirină pentru prevenirea unui atac de cord sau accident

vascular cerebral, nu trebuie să opriți administrarea fără a consulta medicul dumneavoastră.

aspirină și alte medicamente anti-inflamatoare nesteroidiene medicamente antiinflamatoare (AINS):

Nu utilizați doze mari de aspirină sau alte medicamente antiinflamatoare dacă utilizați ARCOXIA.

La ce trebuie să fiți atenți în privința alimentelor și băuturilor?

ARCOXIA poate începe să acționeze mai rapid dacă este luat fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sarcina

Comprimatele ARCOXIA nu trebuie utilizate în timpul sarcinii. Dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi, sau dacă intenționați să rămâneți gravidă, nu utilizați comprimatele. Dacă rămâneți gravidă, opriți administrarea comprimatelor și consultați medicul dumneavoastră. Consultați medicul dumneavoastră dacă aveți incertitudini sau doriți mai multe sfaturi.

Alăptarea

Nu se știe dacă ARCOXIA trece în laptele matern. Dacă alăptați sau intenționați să alăptați, consultați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza ARCOXIA. Dacă utilizați ARCOXIA, nu alăptați.

Fertilitatea

ARCOXIA nu este recomandat femeilor care doresc să rămână gravide.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Amețeli și somnolență au fost raportate de câțiva pacienți care au utilizat ARCOXIA.

Nu conduceți dacă observați că sunteți amețit sau somnoros.

Nu folosiți unelte sau utilaje dacă observați că sunteți amețit sau somnoros.

ARCOXIA conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul înainte de a lua acest medicament.

ARCOXIA conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per filmomogen comprimat, ceea ce înseamnă că este în esență „fără sodiu”.

3. Cum se administrează acest medicament?

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul.

Nu utilizați mai mult decât doza recomandată pentru afecțiunea dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va dori să discute periodic tratamentul cu dumneavoastră. Este important să utilizați cea mai mică doză posibilă care încă vă suprimă durerea și nu trebuie să utilizați ARCOXIA mai mult decât este necesar. Acest lucru se datorează faptului că riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral poate crește după un tratament de lungă durată, în special la doze mari.

Există diferite concentrații ale acestui medicament disponibile. În funcție de afecțiunea dumneavoastră, medicul va prescrie concentrația care este cea mai potrivită pentru dumneavoastră.

Doza recomandată este:

Artroză

Doza recomandată este de 30 mg o dată pe zi, crescând dacă este necesar până la maximum 60 mg o dată pe zi.

Artrită reumatoidă

Doza recomandată este de 60 mg o dată pe zi, crescând dacă este necesar până la maximum 90 mg o dată pe zi.

Boala Bechterew

Doza recomandată este de 60 mg o dată pe zi, crescând dacă este necesar până la maximum 90 mg o dată pe zi.

Afecțiuni cu durere acută

Etoricoxib trebuie utilizat doar în perioada cu durere acută.

Guta

Doza recomandată este de 120 mg o dată pe zi și trebuie utilizată doar în perioada cu durere acută, cu un tratament de maximum 8 zile.

Durere după o intervenție stomatologică

Doza recomandată este de 90 mg o dată pe zi, cu un tratament de maximum 3 zile.

Pacienți cu probleme hepatice

Dacă aveți o formă ușoară de boală hepatică, nu trebuie să luați mai mult de 60 mg o dată pe zi.

Dacă aveți o formă moderată de boală hepatică, nu trebuie să luați mai mult de 30 mg o dată pe zi.

Copii și adolescenți până la 16 ani

Comprimatele ARCOXIA nu trebuie utilizate de copii sau adolescenți până la 16 ani.

Vârstnici

Pentru pacienții vârstnici nu este necesară ajustarea dozei. Ca și în cazul altor medicamente, acest medicament trebuie utilizat cu precauție la pacienții vârstnici.

Mod de administrare

Comprimate ARCOXIA trebuie administrate o dată pe zi pe cale orală. ARCOXIA poate fi luat cu sau fără alimente.

Ați luat prea mult din acest medicament?

Nu trebuie să luați niciodată mai multe comprimate decât vă recomandă medicul dumneavoastră. Dacă luați prea multe comprimate ARCOXIA, contactați imediat medicul sau farmacistul.

Ați uitat să luați acest medicament?

Este important să luați ARCOXIA așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Dacă uitați o doză, continuați pur și simplu cu schema obișnuită a doua zi. Nu luați o doză dublă pentru a compensa un comprimat uitat.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul.

4. Posibile reacții adverse

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse. Nu toată lumea le experimentează.

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, trebuie să opriți administrarea ARCOXIA și să consultați imediat medicul (vezi secțiunea 2 'Când nu trebuie să luați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?'):

aveți respirație scurtă, durere în piept sau glezne umflate, sau acestea se agravează
pielea și ochii devin galbeni (icter) – acest lucru indică probleme hepatice
durere abdominală severă sau persistentă sau scaunul devine negru
o reacție alergică, inclusiv probleme ale pielii cum ar fi ulcere sau bășici, sau umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului care poate îngreuna respirația.

Următorii termeni sunt folosiți pentru a indica frecvența cu care au fost raportate reacțiile adverse:

Foarte frecvent (apare la mai mult de 1 din 10 utilizatori)

Frecvent (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

Uneori (apare la mai puțin de 1 din 100 utilizatori)

Rar (apare la mai puțin de 1 din 1000 utilizatori)

Foarte rar (apare la mai puțin de 1 din 10.000 utilizatori)

Următoarele reacții adverse pot apărea în timpul tratamentului cu ARCOXIA:

Foarte frecvent:

durere de stomac

Frecvent:

uscată cavitate dentară (inflamație și durere după extracția unui dinte sau măsea)

umflarea picioarelor și/sau a picioarelor din cauza acumulării de lichid (edem)

amețeli, dureri de cap

palpitații (bătăi rapide sau neregulate ale inimii), stooaritmii în ritmul cardiac (aritmie)

crescut tensiune arterială

șuierătoare respirație sau dificultăți de respirație (bronhospasm)

constipație, flatulență, inflamația mucoasei stomacului (gastrită), arsuri la stomac,

diaree, tulburări digestive (dispepsie) / probleme gastrice, greață, vărsături, inflamația

esofagului, ulceratii în gură

modificări în rezultatele analizelor de sânge pentru ficatul dumneavoastră

vânătăi vânătăi

slăbiciune și oboseală, boală asemănătoare gripei boală

Uneori:

gastro-enterită (inflamația stomacului și intestinelor / gripă abdominală), infecție a căilor respiratorii superioare, infecție urinară
modificări în rezultatele analizelor de laborator (scăderea globulelor roșii și albe, scăderea trombocitelor)
reacție de hipersensibilitate (o reacție alergică inclusiv urticarie, care poate fi atât de severă încât necesită îngrijire medicală imediată)
creșterea sau scăderea apetitului, creștere în greutate
anxietate, depresie, scăderea acuității mentale, a vedea, simți sau auzi lucruri care nu există (halucinații)
modificarea gustului, insomnie, amorțeală sau furnicături, somnolență
vedere încețoșată vedere, iritație și roșeață a ochiului
tinitus, amețeală
aritmii cardiace (fibrilație atrială), ritm cardiac accelerat, insuficiență cardiacă, senzație de apăsare, durere grea în piept (angină pectorală), atac de cord
excesiv înroșire, accident vascular cerebral, accident vascular cerebral ușor (AIT), hipertensiune arterială severă, inflamația vaselor de sânge
tuse, dificultăți de respirație, sângerare nazală
umflat stomac sau abdomen, schimbare în tiparul de defecare, gură uscată, ulcer gastric, inflamația mucoasei stomacului care poate deveni severă și poate sângera, sindrom de colon iritabil, inflamația pancreasului
umflare a feței, erupție cutanată sau mâncărime, roșeață a pielii
crampe musculare/spasm, dureri musculare/rigiditate
crescut nivel de potasiu în sânge, modificări ale rezultatelor testelor de sânge sau urină pentru rinichi, probleme renale severe
durere pe piept

Rareori:

angio-edem (o reacție alergică cu umflarea feței, buzelor, limbii și/sau gâtului care poate provoca dificultăți de respirație sau înghițire și care poate fi atât de severă încât necesită îngrijire medicală imediată)/reacție anafilactică/anafilactoidă inclusiv șoc (o reacție alergică severă care necesită îngrijire medicală imediată)
confuzie, neliniște
probleme hepatice (hepatită)
scăzut nivel de sodiu în sânge
insuficiență hepatică, îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter)
severe reacții cutanate

Raportarea efectelor adverse efecte secundare

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul Centrului Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse , site web: www.lareb.nl. Raportând efectele adverse, ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament., site web: www.lareb.nl. Raportând efectele secundare, ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe cutie după EXP. Aceasta constă dintr-o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Flacoane: păstrați flaconul bine închis pentru a-l proteja de umiditate.

Blistere: păstrați în ambalajul original pentru a proteja de umiditate.

Nu aruncați medicamentele pe canalizare sau în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea vor fi distruse corect și nu vor ajunge în mediu.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce trebuie să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea vor fi distruse în mod adecvat și nu vor ajunge în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este etoricoxib. Fiecare filmofilmă comprimat conține 30, 60, 90 sau 120 mg etoricoxib.

Celelalte substanțe din acest medicament sunt:

Nucleu: fosfat de calciu anhidru, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu, celuloză microcristalină.

Învelișul comprimatului: ceară de carnauba, lactoză monohidrat, hipromeloză, dioxid de titan (E171), triacetină. Comprimatele de 30, 60 și 120 mg conțin, de asemenea, oxid de fier galben (E172, colorant) și indigotină (E132, colorant).

Cum arată ARCOXIA și ce conține un ambalaj?

Comprimate ARCOXIA sunt disponibile în patru concentrații:

Comprimate de 30 mg: verde-albăstrui, în formă de măr, biconvexe filmate comprimate cu 'ACX 30' pe o parte și '101' pe cealaltă parte.

Comprimate de 60 mg: verde închis, în formă de măr, biconvexe filmate comprimate cu 'ARCOXIA 60' pe o parte și '200' pe cealaltă parte.

Comprimate de 90 mg: albe, în formă de măr, biconvexe filmate comprimate cu 'ARCOXIA 90' pe o parte și '202' pe cealaltă parte.

Comprimate de 120 mg: verde pal, în formă de măr, biconvexe filmate comprimate cu 'ARCOXIA 120' pe o parte și '204' pe cealaltă parte.

Mărimi de ambalaj:

30 mg:

ambalaje blister cu 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 comprimate sau ambalaje mari de 98 (2 ambalaje de 49) comprimate.

60 mg

ambalaje blister cu 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 comprimate sau ambalaje mari cu 98 (2 ambalaje de 49) comprimate; sau flacoane cu 30 și 90 comprimate cu capsule desicant.

Desicantul (una sau două capsule) din flacon este destinat să mențină comprimatele uscate și nu pentru a fi ingerat.

90 mg:

ambalaje blister cu 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 comprimate sau ambalaje mari cu 98 (2 ambalaje de 49) comprimate; sau flacoane cu 30 și 90 comprimate cu capsule desicant. Desicantul (una sau două capsule) din flacon este destinat să mențină comprimatele uscate și nu pentru a fi ingerat.

120 mg:

ambalaje blister cu 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 comprimate sau ambalaje mari cu 98 (2 ambalaje de 49) comprimate; sau flacoane cu 30 și 90 comprimate cu capsule desicant. Desicantul (una sau două capsule) din flacon este destinat să mențină comprimatele uscate și nu pentru a fi ingerat.

60, 90 și 120 mg: ambalaje blister din aluminiu/aluminiu pentru unică folosință de 5, 50 sau 100 comprimate. Nu toate mărimile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul autorizației: N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Tel.: 00800 66550123

E-mail: dpoc.benelux@organon.com

Producător:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Olanda

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Vianex S.A (doar pentru

Grecia)

15th Km Marathonos

Ave.

15351 Pallini

Attikis

Atena

Grecia

Înregistrat în registru sub RVG 34279 (30 mg), RVG 27705 (60 mg), RVG 27706 (90 mg) și RVG 27707 (120 mg).

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Belgia, Luxemburg	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimate filmate
Danemarca, Estonia, Islanda, Norvegia	Arcoxia
Irlanda, Regatul Unit	ARCOXIA 30, 60, 90 sau 120 mg comprimate filmate
Cipru, Malta	ARCOXIA 60, 90, 120 mg comprimate filmate
Germania	ARCOXIA 30/60/90/120 mg comprimate filmate
Finlanda	Arcoxia 30, 60, 90 și 120 mg comprimat, filmate
Franța	ARCOXIA 30, 60 mg comprimate filmate
Grecia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate
Ungaria	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate
Italia	ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg comprimate filmate cu film
Letonia	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg și 120 mg acoperite comprimate
Lituania	Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg cu film acoperite comprimate
Țările de Jos	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, filmate comprimate
Austria	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg- Comprimate filmate
Polonia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate
Portugalia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate cu peliculă
Slovenia	Arcoxia 30/60/90/120 mg film acoperite comprimate
Slovacia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Spania	ARCOXIA 30, 60, 90 y 120 mg comprimate filmate cu film
Cehia	ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, filmate comprimate
Suedia	Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg și 120 mg filmate comprimate

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în noiembrie 2023.

Alte surse de informații

Mai multe informații despre acest medicament pot fi găsite pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului (www.cbg-meb.nl).