

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Atorvastatine Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės

Atorvastatine Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės

Atorvastatine Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės

Atorvastatine Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės

atorvastatinas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikta svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, nenurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Atorvastatine Accord ir kam šis vaistas vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Atorvastatine Accord ir kam šis vaistas vartojamas?

Šis vaistas priklauso vaistų grupei, žinomai kaip statinai. Tai yra lipidų kiekį reguliuojantys vaistai (vaistai, kurie veikia riebalų kiekį kraujyje).

Šis vaistas vartojamas kraujyje esančių riebalų (lipidų), tokių kaip cholesterolis ir trigliceridai, kiekiui mažinti, kai mažai riebalų turinti dieta ir gyvenimo būdo pokyčiai nebuvo pakankamai veiksmingi. Jei turite padidėjusią širdies ligų riziką, šis vaistas taip pat gali būti naudojamas tokiai rizikai sumažinti, net jei jūsų cholesterolio lygis yra normalus. Standartinė cholesterolio kiekį mažinanti dieta turi būti tęsiama gydymo metu.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto sudedamajai daliai. Šias medžiagas galite rasti šio pakuotės lapelio 6 skyriuje.
- Turite kepenų ligą arba esate ją turėjęs.
- Kraujo tyrimai parodė nepaaiškinamus, neįprastus kepenų funkcijos (kepenų funkcijos) rodiklius.
- Esate moteris, kuri gali pastoti ir nenaudojate patikimo vaisto nėštumui išvengti (kontracepcijos).

- Esate nėščia arba bandote pastoti.
- Žindote kūdikį.
- Jei vartojate glecaprevir/pibrentasvir derinį hepatito C gydymui.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju, vaistininku ar slaugytoju

- jei turite sunkiai sutrikusią plaučių funkciją
- jei šiuo metu arba per pastarąsias 7 dienas vartojote vaistą, vadinamą fusidino rūgštimi (naudojamą bakterinėms infekcijoms gydyti), per burną arba injekcijomis. Fusidino rūgštis ir šio vaisto derinys gali sukelti rimtų raumenų problemų (rabdomiolizę, raumenų audinio irimą, pasireiškiantį raumenų spazmais, karščiavimu ir raudonai rudu šlapimo spalvos pasikeitimu)
- jei anksčiau patyrėte smegenų kraujavimą arba turite smegenų pūslelių dėl ankstesnių insultų
- jei turite inkstų problemų
- jei turite sumažėjusią skydliaukės funkciją (hipotireozę)
- jei turėjote pasikartojantį ar nepaaiškinamą raumenų skausmą, asmeninę ar šeimos raumenų problemų istoriją
- jei anksčiau turėjote raumenų problemų gydymo kitais riebalus mažinančiais (lipidus mažinančiais) vaistais metu (pavyzdžiui, kitais '-statino' ar '-fibrato' vaistais)
- jei reguliariai vartojate didelius kiekius alkoholio
- jei turite kepenų ligos istoriją
- jei esate vyresnis nei 70 metų
- jei sergate miastenija (liga, kai pasireiškia bendras raumenų silpnumas, kai kuriais atvejais taip pat raumenyse, naudojamuose kvėpavimui) arba akių miastenija (liga, sukianti akių raumenų silpnumą) arba esate sirgęs, nes statinai kartais gali pabloginti būklę arba sukelti miastenijos atsiradimą (žr. 4 skyrių).

Jei kuris nors iš šių įspėjimų jums tinka, jūsų gydytojas prieš gydymą šiuo vaistu ir galbūt jo metu turės atlikti kraujo tyrimą, kad numatytų jūsų raumenų šalutinio poveikio riziką. Yra žinoma, kad raumenų šalutinio poveikio, tokio kaip raumenų audinio irimas, pasireiškiantis raumenų spazmais, karščiavimu ir raudonai rudos spalvos šlapimu (rabdomiolizė), rizika padidėja, jei tam tikri vaistai vartojami tuo pačiu metu (žr. 2 skyrių „Ar vartojate kitus vaistus?“).

Taip pat susisiekite su savo gydytoju ar vaistininku, jei nuolat jaučiate raumenų silpnumą. Gali prireikti papildomų tyrimų ir vaistų, kad tai būtų nustatyta ir gydoma.

Vartojant šį vaistą, jūsų gydytojas atidžiai stebės, ar sergate cukriniu diabetu, ar turite padidėjusią riziką jį išsivystyti. Jūs galite turėti padidėjusią riziką susirgti cukriniu diabetu, jei turite aukštą cukraus ir riebalų kiekį kraujyje, jei turite antsvorio ir jei turite padidėjusį kraujospūdį.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Atorvastatine Accord, ar neseniai vartojote, ar galbūt ketinate vartoti artimiausiu metu? Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui. Kai kurie vaistai gali paveikti Atorvastatine Accord veikimą arba gali būti paveikti Atorvastatine Accord. Toks sąveikos tipas gali padaryti vieną ar abu vaistus mažiau veiksmingus.

Be to, tai gali padidinti šalutinio poveikio riziką ar sunkumą, įskaitant svarbią raumenų irimo ligą, žinomą kaip rabdomiolizė, kaip aprašyta 4 skyriuje:

- vaistai, naudojami paveikti jūsų imuninės sistemos (natūralios gynybos) veikimą, pavyzdžiui, ciklosporinas
- tam tikri vaistai nuo tam tikrų bakterinių infekcijų (antibiotikai) arba priešgrybeliniai vaistai, pavyzdžiui, eritromicinas, klaritromicinas, telitromicinas, ketokonazolas, itrakonazolas, vorikonazolas, flukonazolas, posakonazolas, rifampicinas, fuzido rūgštis
- kiti vaistai, skirti paveikti riebalų kiekį kraujyje (lipidų lygį), pavyzdžiui, gemfibrozilis, kiti fibratai, kolestipolis
- kai kurie kalcio kanalų blokatoriai, naudojami krūtinės skausmui (angina pectoris) ar padidėjusiam kraujospūdžiui gydyti, pavyzdžiui, amlodipinas, diltiazemas, vaistai, skirti paveikti jūsų širdies ritmą, pavyzdžiui, digoksinas, verapamilis, amiodaronas
- letermoviras, vaistas, padedantis išvengti citomegaloviruso sukeltos ligos
- vaistai, naudojami ŽIV gydymui, pavyzdžiui, ritonaviras, lopinaviras, atazanaviras, indinaviras, darunaviras, tipranaviro/ritonaviro derinys ir t.t.
- kai kurie vaistai, naudojami hepatito C (tam tikros rūšies kepenų uždegimo) gydymui, pavyzdžiui, telapreviras, bocepreviras ir elbasviro/grazopreviro ledipasviro/sofosbuviro derinys
- kiti vaistai, žinomi dėl sąveikos su Atorvastatine Accord, yra ezetimibas (mažina cholesterolį), varfarinas (mažina kraujo krešėjimą), per burną vartojami vaistai nėštumui išvengti (kontraceptikai), stiripentolis (vaistas nuo nekontroliuojamų kūno traukulių, dažnai kaip epilepsijos priepuolio dalis, naudojamas epilepsijai gydyti), cimetidinas (naudojamas rėmeniui ir skrandžio-opoms gydyti), fenazonas (skausmą malšinantis vaistas), kolchicinas (naudojamas podagros gydymui) ir vaistai, kurie suriša skrandžio rūgštį (antacidai), kuriuose yra aliuminio arba magnio
- vaistai, kurie yra prieinami be recepto: jonažolė
- Jei turite vartoti fuzidino rūgštį per burną bakterinei infekcijai gydyti, turite laikinai nutraukti Atorvastatine Accord vartojimą. Jūsų gydytojas pasakys, kada vėl saugiai galite pradėti vartoti Atorvastatine Accord. Kartu vartojant Atorvastatine Accord ir fuzidino rūgštį, retais atvejais gali atsirasti raumenų silpnumas, jautrumas ar skausmas (rabdomiolizė). Daugiau informacijos apie rabdomiolizę rasite 4 skyriuje.

Į ką turėtumėte atkreipti dėmesį vartodami gėrimus ir alkoholį?

Žr. 3 skyrių dėl instrukcijų, kaip vartoti šį vaistą.

Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

Greipfrutų sultys

Negerkite daugiau nei vieno ar dviejų mažų stiklinių greipfrutų sulčių per dieną, nes dideli greipfrutų sulčių kiekiai gali pakeisti šio vaisto poveikį.

Alkoholis

Venkite gerti per daug alkoholio vartodami šį vaistą. Daugiau informacijos rasite 2 skyriuje „Kada turėtumėte būti ypač atsargūs vartodami šį vaistą?“

Nėštumas ir žindymas

Nevartokite šio vaisto, jei esate nėščia arba bandote pastoti.

Nevartokite šio vaisto, jei galite pastoti, nebent naudojate patikimas kontracepcijos priemones (pvz., prezervatyvą ar tabletes).

Nevartokite šio vaisto, jei maitinate krūtimi.

Šio vaisto saugumas nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu dar nėra įrodytas. Prieš vartodami vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Paprastai šis vaistas neturi įtakos jūsų gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus. Tačiau nevairuokite, jei šis vaistas veikia jūsų vairavimo gebėjimus. Nenaudokite įrankių ar mechanizmų, jei jūsų gebėjimas juos naudoti yra paveiktas šio vaisto.

Atorvastatine Accord sudėtyje yra laktozės

Jei gydytojas jums sakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą kreipkitės į gydytoją.

Atorvastatine Accord sudėtyje yra natrio

Šio vaisto sudėtyje yra mažiau nei 1 mmol (23 mg) natrio vienoje tabletėje, todėl jis iš esmės yra „be natrio“.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Ar abejojate dėl teisingo vartojimo? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

Prieš pradėdant gydymą, jūsų gydytojas paskirs jums cholesterolio kiekį mažinančią dietą, kurios turite laikytis ir gydymo šiuo vaistu metu.

Rekomenduojama pradinė šio vaisto dozė yra 10 mg kartą per parą suaugusiems ir vaikams nuo 10 metų. Jei reikia, gydytojas gali padidinti dozę, kol pasieksite reikiamą kiekį. Gydytojas koreguos dozę kas 4 savaites ar ilgiau. Didžiausia šio vaisto dozė yra 80 mg kartą per parą.

Tabletes reikia nuryti visas, užgeriant vandeniu, ir jas galima vartoti bet kuriuo paros metu, su maistu arba be jo. Tačiau stenkitės vartoti tabletę kasdien tuo pačiu metu.

Gydymo šiuo vaistu trukmę nustato jūsų gydytojas.

Susisiekite su savo gydytoju, jei manote, kad šio vaisto poveikis yra per stiprus arba per silpnas.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Jei netyčia išgėrėte per daug šio vaisto (daugiau nei įprasta paros dozė), kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausią ligoninę patarimo.

Ar pamiršote išgerti šį vaistą?

Jei pamiršote išgerti dozę, išgerkite kitą suplanuotą dozę tinkamu laiku. Negerkite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei nustojote vartoti šį vaistą Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą arba norite nutraukti gydymą šiuo vaistu? Susisiekiite su savo gydytoju arba vaistininku.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį. Ne visi jį patiria.

Jei pasireiškia vienas iš šių sunkių šalutinių poveikių ar simptomų, nustokite vartoti tabletes ir nedelsdami susisiekiite su savo gydytoju arba kreipkitės į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių.

- Retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų:
- Sunkios alerginės reakcijos, sukeliančios veido, liežuvio ir gerklės patinimą, galinčios sukelti rimtų kvėpavimo sunkumų.
- Sunkios ligos su stipriu odos pleiskanojimu ir patinimu, pūslių susidarymu ant odos, burnos, akių ir lytinių organų bei karščiavimu. Odos bėrimas su rausvai raudonomis dėmėmis, ypač ant delnų ar padų, galimas su pūslių susidarymu.
- Raumenų silpnumas, jautrumas, skausmas ar plyšimas arba raudonai rudas šlapimo spalvos pasikeitimas, ypač jei jaučiatės blogai arba turite karščiavimą. Tai gali būti sukelta neįprasto raumenų irimo (rabdomiolizės). Šis neįprastas raumenų irimas ne visada išnyksta, net jei nustojote vartoti šį vaistą, ir gali būti pavojingas gyvybei bei sukelti inkstų problemų.

Labai retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų

- Jei patiriate netikėtų ar neįprastų kraujavimų ar mėlynių, tai gali rodyti kepenų ligą. Kuo greičiau susisiekiite su savo gydytoju.
- Lupus sindromas (įskaitant bėrimą, sąnarių sutrikimus ir poveikį kraujo ląstelėms)

Kiti galimi šio vaisto šalutiniai poveikiai

Dažnai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų

- nosies ertmės uždegimas, gerklės skausmas, kraujavimas iš nosies
- alerginės reakcijos
- padidėjęs cukraus kiekis kraujyje (jei sergate diabetu, turite atidžiai stebėti cukraus kiekį kraujyje), padidėjusi raumenų skilimo produktų (kreatinkinazės) koncentracija kraujyje
- galvos skausmas
- pykinimas, vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, virškinimo sutrikimai, viduriavimas
- sąnarių skausmas, raumenų skausmas ir nugaros skausmas
- kraujo tyrimų rezultatai, rodantys, kad jūsų kepenų funkcija gali būti neįprasta

Kartais: pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų

- apetito stoka (anoreksija), svorio padidėjimas, sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje (jei sergate diabetu, turite atidžiai stebėti cukraus kiekį kraujyje)
- košmarai, nemiga
- galvos svaigimas, pirštų ir kojų pirštų tirpimas ar dilgčiojimas, sumažėjęs skausmo ar lytėjimo pojūtis, skonio pokyčiai, atminties praradimas
- neryškus matymas
- spengimas ausyse ir/arba galvoje

- vėmimas, raugėjimas, skausmas apatinėje ir viršutinėje pilvo dalyje, kasos uždegimas, pasireiškiantis stipriu skausmu viršutinėje pilvo dalyje, plintančiu į nugarą, pykinimu ir vėmimu (pankreatitas)
- kepenų uždegimas (hepatitas)
- bėrimas, odos bėrimas ir niežulys, dilgėlinė, plaukų slinkimas
- kaklo skausmas, pavargę raumenys.
- nuovargis, bloga savijauta, silpnumas, krūtinės skausmas, patinimas, ypač kulkšnių (skysčių kaupimasis audiniuose (edema)), karščiavimas
- šlapimo tyrimai, kurie yra teigiami dėl baltųjų kraujo kūnelių

Retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų

- regėjimo sutrikimai (regos sutrikimai)
- netikėtas kraujavimas ar mėlynės
- tulžies kaupimasis tulžies latakuose dėl sutrikusio tulžies nutekėjimo į žarnyną, dėl ko oda ir akių baltymai pagelsta (cholestazė)
- sausgyslių pažeidimas

Labai retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų

- alerginė reakcija – simptomai gali būti staigus švokštimas ir skausmas ar spaudimas krūtinėje, akių vokų, veido, lūpų, burnos, liežuvio ar gerklės patinimas, kvėpavimo sunkumai, staigus sąmonės netekimas (kolapsas)
- klausos praradimas
- krūtų padidėjimas vyrams (ginekomastija)

Nežinoma: dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis

- nuolatinis raumenų silpnumas
- miastenija gravis (liga, sukianti bendrą raumenų silpnumą, kai kuriais atvejais raumenyse, naudojamuose kvėpavimui);
- akių miastenija (liga, sukianti akių raumenų silpnumą)

Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate rankų ar kojų silpnumą, kuris pablogėja po aktyvumo laikotarpių, dvejinimasi akyse ar nukarusius akių vokus, rijimo sunkumus ar dusulį.

Galimos šalutinės reakcijos, apie kurias pranešta vartojant kai kurias statinas (tos pačios rūšies vaistus):

- seksualinės problemos
- depresija
- kvėpavimo problemos, įskaitant nuolatinį kosulį ir/ar dusulį arba karščiavimą
- cukrinis diabetas. Rizika padidėja, jei turite aukštą cukraus ir riebalų kiekį kraujyje, turite antsvorį ir padidėjusį kraujospūdį. Jūsų gydytojas stebės jus, kol vartosite šį vaistą.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją. Tai taip pat taikoma šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, padedate mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25°C temperatūroje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui. Jį rasite ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie bus tinkamai sunaikinti ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra atorvastatinas.

Kiekvienoje 10 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg atorvastatino (kaip atorvastatino kalcio trihidrato).

Kiekvienoje 20 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg atorvastatino (kaip atorvastatino kalcio trihidrato).

Kiekvienoje 40 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 40 mg atorvastatino (kaip atorvastatino kalcio trihidrato).

Kiekvienoje 80 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 80 mg atorvastatino (kaip atorvastatino kalcio trihidrato).

Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:

Tabletės šerdis: kalcio karbonatas, laktozės monohidratas, mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natriis, hidroksipropilceliuliozė, polisorbitas 80, magnio stearatas

Tabletės danga: hipromeliozė 2910 (E464), makrogolis 8000 (E1521), titano dioksidas (E171) ir talkas (E553b).

Kaip atrodo Atorvastatine Accord ir kas yra pakuotėje?

Atorvastatine Accord 10 mg plėvele dengta tabletė: Baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, plėvele dengtos tabletės, kurių skersmuo yra apie 5,6 mm ir vienoje pusėje yra įspaudas „FU1“, o kitoje pusėje nėra įspaudo.

Atorvastatine Accord 20 mg plėvele dengta tabletė: Baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, plėvele dengtos tabletės, kurių skersmuo yra apie 7,1 mm ir vienoje pusėje yra įspaudas „FU2“, o kitoje pusėje nėra įspaudo.

Atorvastatine Accord 40 mg plėvele dengta tabletė: Baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, plėvele dengtos tabletės, kurių skersmuo yra apie 9,6 mm ir vienoje pusėje yra įspaudas „FU3“, o kitoje pusėje nėra įspaudo.

Atorvastatine Accord 80 mg plėvele dengta tabletė: Baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, plėvele dengtos tabletės, kurių skersmuo yra apie 12,1 mm ir vienoje pusėje yra įspaudas „FU4“, o kitoje pusėje nėra įspaudų.

Atorvastatine Accord yra tiekiamas OPA/Alu/PVC-Alu lizdinių plokštelių pakuotėse po 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ir 100 plėvele dengtų tablečių. Ligoninių pakuotės po 50, 84, 100, 200 (10 x 20) arba 500 plėvele dengtų tablečių.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra tiekiami į rinką.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Leidimo turėtojas
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nyderlandai

Gamintojas
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomiarska 50,95-200 Pabianice, Lenkija

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nyderlandai

Accord Healthcare Single Member S.A.
64-asis km Nacionalinis kelias Atėnai,
Lamia, Schimatari, 32009, Graikija

Įregistruota registre pagal

Atorvastatine Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės RVG 118716
Atorvastatine Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės RVG 118717
Atorvastatine Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės RVG 118718
Atorvastatine Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės RVG 118719

Šis vaistas yra registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje (Šiaurės Airijoje) šiais pavadinimais:

Valstybės narės pavadinimas	Vaisto pavadinimas
Austrija	Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės

	<p>Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Kipras	<p>Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Danija	<p>Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Vokietija	<p>Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Suomija	<p>Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Airija	<p>Atorvastatin 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatin 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>
Italija	<p>Atorvastatina Accord</p>
Nyderlandai	<p>Atorvastatina Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatina Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatina Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės</p> <p>Atorvastatina Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės</p>

Norvegija	Atorvastatin Accord
Švedija	Atorvastatin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin Accord 40 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin Accord 80 mg plėvele dengtos tabletės
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)	Atorvastatin 10 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin 20 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin 40 mg plėvele dengtos tabletės Atorvastatin 80 mg plėvele dengtos tabletės

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2025 m. rugpjūčio mėn.