

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Atrovent 20 mikrogrammaa/annos, aerosoli, liuos ipratropiumbromidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla. jos heillä on samat oireet kuin sinulla.

Onko sinulla jokin kohta 4:ssä mainituista haittavaikutuksista? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä tai apteekkiin. Tämän pakkausselosteen sisältö:

Mitä Atrovent

1. Mikä on Atrovent Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen sen kanssa?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen sen kanssa?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Sisältöpakkauksesta ja muista tiedoista

1. Atrovent kuuluu keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden ryhmään.

Yksi inhalaatio sisältää 21 mikrogrammaa ipratropiumbromidia, mikä vastaa

20 mikrogrammaa vedetöntä ipratropiumbromidia. Atrovent kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan 'antikolinergisiksi keuhkoputkia laajentaviksi lääkkeiksi'. Se toimii seuraavasti.

Inhalaation jälkeen vaikuttava aine ipratropiumbromidi auttaa rentouttamaan hengitysteiden ympärillä olevia lihaksia. Tämä laajentaa hengitysteitä ja helpottaa hengittämistä.

Atroventia voidaan käyttää hengitysteiden ahtauman lievittämiseen, kuten (kroonisessa) keuhkoputkentulehduksessa, keuhkoputkentulehduksessa emfyseeman kanssa tai astmassa.

Atroventia voidaan käyttää hengitysteiden ahtauman lievittämiseen, kuten (kroonisessa) keuhkoputkentulehduksessa, bronkiitti. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?

2. Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löydät

kohdasta 6. Olet allerginen aineille, jotka muistuttavat ipratropiumbromidia (atropiinin kaltaiset aineet).

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät kohta 6. Olet allerginen aineille, jotka muistuttavat ipratropiumbromidia (atropiinin kaltaiset aineet).

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?
Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos käytön jälkeen tätä lääkettä koet epänormaalin kouristuksen henkitorven ympärillä (paradoksaalinen bronkospasmi). Tämä voi olla hengenvaarallista, sinun tulee lopettaa lääkkeen käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä lääkäriisi saadaksesi toisen tavanhoitaa oireitasi.

Jos sinulla on kohonnut silmänpaine (glaukooma). Silmäkipu tai näön hämärtyminen, värillisten renkaiden näkeminen tai kuvat yhdessä punasilmäisyyden kanssa silmän turvotuksen seurauksena voivat olla merkkejä kohonneesta silmänpaineesta (glaukooma). Jos näitä oireita esiintyy yhdessä, on välitön lääkärin apu tarpeen.

Älä suihkuta Atroventia silmiin tai niiden ympärille. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee silmät välittömästi kylmällä hanavedellä muutaman minuutin ajan. Jos suihkutettaessa tuotetta joutuu vahingossa silmään, voi pupillien laajeneminen (mydriaasi) ja näön hämärtyminen esiintyä, mikä voi kestää useita tunteja. Jos tähän liittyy silmän punoitus, kipu tai epämiellyttävä tunne silmässä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos sinulla on eturauhasen sairaus (eturauhasen liikakasvu) tai virtsateiden tukos.

Jos sinulla on kystinen fibroosi (limatauti). Antikolinergisten lääkkeiden (ipratropiumbromidi) käytön yhteydessä voit olla herkempi ruoansulatuskanavan vaivoille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Atrovent 20 mikrogrammaa/annos, aerosoli, liuoksen lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Atrovent ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa toimintaan. Lääkkeet, joissa näin voi tapahtua:

- Tietythengitysteitä laajentavien lääkkeiden luokat (beeta-adrenergiset, ksantiinijohdannaiset) voivat vahvistaa Atroventin hengitysteitä laajentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden aikaisesta käytöstä ei ole tähän mennessä tunnettuja haitallisia vaikutuksia. Kysy neuvoa lääkäriiltäsi tai apteekistasi ennen lääkkeen käyttöä.

Imetyksen aikaisesta käytöstä ei ole riittävästi tietoa mahdollisten haitallisten vaikutusten arvioimiseksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Atroventin vaikutuksesta ajokykyyn ei ole tietoa. Ajoneuvoja ajettaessa ja koneita käytettäessä on otettava huomioon mahdollisuus haittavaikutuksiin, kuten huimaukseen ja silmäongelmiin, kuten pupillien laajenemiseen, silmän linssin tarkentamisvaikeuksiin (mukautumishäiriö) ja näön hämärtymiseen. Ole varovainen, kunnes tiedät, miten reagoit Atroventiin.

Atrovent-aerosoli sisältää alkoholia

Tämä lääke sisältää 8 mg alkoholia (etanolia) per inhalaatio. Määrä per inhalaatio tässä lääkkeessä vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tässä lääkkeessä on pieni määrä alkoholia. Tämä on niin vähäinen, ettet huomaa sitä.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkärisi tai apteekkisi on sinulle kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Annostus määritetään yksilöllisesti, hoidon aikana potilaan tulee olla lääkärin valvonnassa.

Suosittelun annostus on, ellei toisin ole määrätty:

Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset: 3-4 kertaa päivässä kaksi inhalaatiota. Yleensä ei tule käyttää enempää kuin 12 inhalaatiota päivässä.

Vaikutus alkaa muutamassa minuutissa ja kestää maksimissaan 6 tuntia. Käytä Atroventia joka päivä, aina samaan aikaan päivästä. Tämä antaa parhaan vaikutuksen. Kiinteät ajankohdat auttavat myös muistamaan, milloin sinun tulee inhaloida.

Atroventia käytetään pitkäaikaisten hengitystiesairauksien hoitoon. Siksi Atroventia tulee käyttää pidemmän aikaa.

Hoidon onnistumiseksi on tärkeää, että käytät aerosolia oikein.

Ennen kuin käytät suihkepulloa ensimmäistä kertaa, tulee säiliötä painaa kahdesti. Jos et ole käyttänyt suihkepulloa yli kolmeen päivään, tulee säiliötä painaa kerran ennen käyttöä.

Ennen jokaista käyttöä tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:

Antotapa: Poista suukappaleen suojus

1. sta. Pidä inhalaattoria peukalon ja etusormen välissä siten, että suihkepullo osoittaa ylöspäin (peukalo alla, etusormi ylhäällä)..
2. Aseta inhalaattori suuhun siten, että huulet ympäröivät suukappaleen
3. ja suihkepullo osoittaa ylöspäin (katso kuva 1).
4. Hengitä nyt mahdollisimman syvään sisään suun kautta ja paina samalla kerran voimakkaasti suihkepulloa. Pidätä hengitystä muutaman sekunnin ajan, poista suukappale ja hengitä ulos. Toista tämä menettely
5. kohdasta kolme, jos toinen inhalaatio on määrätty.
6. Toista tämä toimenpide jatka kohdasta kolme, jos toinen inhalaatio on määrätty.
7. Aseta suojakorkki takaisin suukappaleeseen.

Huom. Kun käytät Atroventia ensimmäistä kertaa, voit kokeilla sitä ensin peilin edessä, jos se tuntuu hankalalta.

Koska sumutepullo ei ole läpinäkyvä, ei ole mahdollista te nähdä, milloin se on tyhjä.

Sumutepullo sisältää 200 inhalaatiota. 200 inhalaation jälkeen voi vaikuttaa siltä, että

sumutepullossa on vielä vähän nestettä. Sinun tulee kuitenkin vaihtaa inhalaattori uuteen. Näin varmistat, että saat jokaisella annoksella oikean määrän lääkettä. On erittäin tärkeää pitää suukappale puhtaana. Jos et tee sitä säännöllisesti, suukappale voi tukkeutua eikä se enää toimi. Jotkut potilaat luulevat silloin virheellisesti, että sumutepullo on tyhjä. Puhdista suukappale siksi vähintään kerran viikossa.

Puhdistaaksesi suukappaleen, poista ensin suojakorkki ja sumutepullo suukappaleesta. Huuhtelee sitten suukappale lämpimällä vedellä. Tee tämä, kunnes et enää näe lääkettä ja/tai likaa (kuva 2).

Puhdistaaksesi suukappaleen, poista ensin suojakorkki ja suihkepullo suukappaleestaruista suukappale ja anna sen kuivua ilmassa; älä käytä lämmityselementtiä (esim. hiustenkuivaajaa) kuivaamiseen. Aseta säiliö ja suojakorkki takaisin, kun suukappale on kuiva.

Tarkista nyt metallisäiliö. Jopa normaalissa käytössä ulostuloputken reiät voivat tukkeutua. Hienon neulan avulla putki voidaan helposti avata. Huom. Suukappale on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Atroventin kanssa varmistaaksesi, että saat aina oikean määrän lääkettä. Suukappaletta ei tule käyttää muiden annosaerosolien kanssa. Et saa käyttää Atroventia myöskään toisen suukappaleen kanssa.

Jos huomaat, että Atrovent vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi. tulla rikkaaksi.

N.B. Suukappale on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Atroventin kanssa varmistaakseen, että saat aina oikean määrän lääkettä. Suukappaletta ei tule käyttää muihin annosaerosoliteihin. Et saa käyttää Atroventia toisen suukappaleen kanssa.

Jos huomaat, että Atrovent vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Äkillisten tai nopeasti pahenevien hengitysvaikeuksien tapauksessa sinun on välittömästi otettava yhteys lääkäriin.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Yliannostuksen jälkeen ei ole havaittu erityisiä oireita. Jos sinulla on yliannostuksen yhteydessä oireita, voit ottaa yhteyttä lääkäriisi.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos olet unohtanut inhaloinnin, voit tehdä sen vielä. Jos on kuitenkin melkein aika seuraavalle inhaloinnille, voit jättää unohtuneen inhaloinnin väliin ja jatkaa lääkärisi annostusohjeen mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseksi unohtuneen annoksen.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Älä lopeta Atroventin käyttöä omatoimisesti. Keskustele aina lääkärisi kanssa, jos harkitset lopettamista. Jos lopetat lääkärisi kanssa neuvoteltuasi, voivat oireet, joita sinulla oli ennen Atrovent-hoitoa, palata.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikkei kaikille niitä tule.

Haittavaikutuksia voi esiintyä:

yleensä (esiintyy alle 1:llä 10:stä potilaasta) joskus (esiintyy alle 1:llä 100:sta potilaasta)

harvoin (esiintyy alle 1:llä 1000:sta potilaasta)

Haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmittäin.

Immuunijärjestelmä

Immuunijärjestelmä

Joskus: Yliherkkyys ja vakava yliherkkyysreaktio (anafylaksia).

Hermosto

Usein: Päänsärky ja huimaus.

Silmät

Joskus: Näön hämärtyminen, kohonnut silmänpaine (glaukooma) (katso myös: milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa), silmäkipu, pupillien laajeneminen (mydriaasi), värillisten renkaiden näkeminen (visuaaliset halot), verestävät silmät (konjunktivaalinen hyperemia) ja sarveiskalvon turvotus (sarveiskalvoedeema).

Harvoin: Vaikeus tarkentaa silmän linssiä (akommodaatiohäiriö).

Sydän

Joskus: Sydämentykytys (korkeammilla annoksilla), säännöllinen, mutta erittäin nopea sydämen supistuminen (eteisvärinä) ja sydämen rytmihäiriöt.

Harvoin: Nopeutunut syke.

Hengityselimistö ja rintakehän sairaudet

Yleinen: Yskä ja kurkun ärsytys.

Harvinainen: Hengitysteiden ahtautuminen kuten inhalaation seurauksena (bronkospasmi), äänihuulten kouristus (laryngospasmi), kurkun turvotus ja kuiva kurkku.

Ruoansulatuselimistö

Yleinen: Kuiva suu, ruoansulatushäiriöt ja pahoinvointi.

Joskus: Ripuli, ummetus, oksentelu, suun limakalvon tulehdus (stomatiitti), nesteiden kertyminen suuhun ja makumuutokset.

Ihosairaudet

Joskus: Kutina (pruritus), ihottuma, äkillinen nesteiden kertyminen ihoon ja limakalvoihin (esim. kurkku tai kieli), hengitystienielemisvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma (angioedeema).

Harvoin: Ihottuma, johon liittyy voimakasta kutinaa ja paukamien muodostumista (urtikaria).

Jos sinulla on akuutti paikallinen turvotus kielen, huulten ja kasvojen alueella, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Munuaisten ja virtsateiden häiriöt

Joskus: Virtsan pidättyminen. Virtsateiden tukkeutumisen yhteydessä on noudatettava varovaisuutta (katso myös: milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa).

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan, verkkosivusto: www.fimea.fi. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Säilytä alle 30°C.

Suojaa suoralta valolta, ct auringonvalolta, kuumuudelta ja jäätymiseltä.

Suihkepullo on paineen alainen eikä sitä saa avata väkisin tai vahingoittaa. Avaaminen on vaarallista ja tekee sisällön välittömästi käyttökelvottomaksi. Suihkepulloa ei saa altistaa lämpötiloilylei 50°C (esim. keskuslämmityksessä tai uunin päällä).

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se on löydettävissä pakkauksesta 'käytettävä ennen' tai 'EXP'. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä. on viimeinen käyttöpäivä.

eivätkä ne päädy ympäristöön. eivätkä päädy ympäristöön.

6. Mitä aineita tämä valmiste sisältää?

Tämän valmisteen vaikuttava aine on ipratropiumbromidi.

Vaikuttava aine tässä valmisteessa on ipratropiumbromidi.

Toinen sitruunahappo (E 330), puhdistettu vesi, absoluuttinen alkoholi ja ponneaine (HFA 134a). Miltä Atrovent 20 mikrogrammaa/annos, aerosoli, liuos näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Atrovent-aerosolipakkaus sisältää suihkepullon suukappaleella, jossa on 10

Atrovent-aerosolipakkaus sisältää suukappaleella varustetun sumutepullon, jossa on 10 ml inhalaatioratkaisu, vastaa 200 inhalaatiota.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Boehringer Ingelheim bv
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Puh.: 0800-2255889

Valmistaja
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Rekisteröity numerolla RVG 26834

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty helmikuussa 2022

Transtoyou