

Prospect: informații pentru utilizator

Atrovent 20 micrograme/doză, aerosol, soluție bromură de ipratropiu

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.

Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți efecte secundare menționate la punctul 4? Sau aveți un efect secundar care nu este menționat în acest prospect? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect:

1. Ce este Atrovent 20 micrograme/doză, aerosol, soluție și pentru ce se utilizează?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Ce este Atrovent 20 micrograme/doză, aerosol, soluție și pentru ce se utilizează acest medicament?

Atrovent face parte din categoria bronhodilatatoarelor.

O inhalare conține 21 micrograme de bromură de ipratropiu, corespunzătorcu 20 micrograme de bromură de ipratropiu anhidră.

Atrovent aparține grupului de medicamente numite 'bronhodilatatoare anticolinergice'.

Acționează după cum urmează.

După inhalare, substanța activă bromura de ipratropiu contribuie la relaxareamușchilor din jurul căilor respiratorii. Astfel, căile respiratorii se pot dilata și puteți respira mai ușor.

Atrovent poate fi utilizat pentru ameliorarea unei îngustări a căilor respiratorii, cum ar fi în cazul bronșitei (cronice), bronșitei cu emfizem sau astm.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în rubrica 6. Sunteți alergic la substanțe care sunt similare cu bromura de ipratropiu (substanțe de tip atropină).

Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Dacă după utilizarea acestui medicament experimentați un spasm anormal al mușchilor din jurul traheei (bronhospasm paradoxal). Acest lucru poate fi amenințător pentru viață, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui medicament. Contactați apoi medicul pentru o altă metodă de tratament al simptomelor dumneavoastră.

Dacă aveți presiune intraoculară crescută (glaucom). Durerea oculară sau vederea încețoșată, inele colorate sau imagini în combinație cu ochi roșii din cauza umflării ochiului pot fi semne ale unei presiuni intraoculare crescute (glaucom). Dacă apare o combinație a acestor simptome, este necesar un sfat medical imediat.

Nu pulverizați Atrovent în sau în jurul ochilor. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, clătiți imediat ochii cu apă rece de la robinet timp de câteva minute. Dacă la pulverizare accidental ajunge produs în ochi, poate apărea dilatarea pupilelor (midriază) și vederea încețoșată, care poate dura câteva ore. Dacă acest lucru este însoțit de roșeață a ochiului, durere sau o senzație neplăcută în ochi, trebuie să consultați imediat un medic.

Dacă aveți o afecțiune a prostatei (hiperplazie prostatică) sau o obstrucție a căilor urinare.

Dacă aveți fibroză chistică (mucoviscidoză). La utilizarea anticolinergicilor (bromură de ipratropiu), puteți fi mai sensibil la probleme gastrointestinale.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați pe lângă Atrovent 20 micrograme/doză, aerosol, soluție și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Spuneți acest lucru medicului sau farmacistului. Atrovent și alte medicamente pot influența efectele reciproce. Medicamentele pentru care acest lucru este valabil:

Medicamente din anumite

- Medicamente din anumite sarcini și alăptarea

Sarcină și alăptare

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați? Luați atunci legătura cu medicul sau farmacistul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

Despre utilizarea în timpul sarcinii nu sunt cunoscute efecte adverse până în prezent. Cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră înainte de a utiliza un medicament.

Despre utilizarea în timpul alăptării nu există suficiente date pentru a evalua posibila nocivitate.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu sunt cunoscute date despre efectul Atrovent asupra capacității de a conduce vehicule. La conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor trebuie să se țină cont de posibilitatea apariției efectelor secundare, inclusiv amețeli și probleme oculare, cum ar fi dilatarea pupilelor, dificultăți de focalizare a cristalinului (tulburări de acomodare) și vedere încețoșată. Fiți precaut până când știți cum reacționați la Atrovent.

Atrovent aerosol conține alcool

Acest medicament conține 8 mg alcool (etanol) per inhalare. Cantitatea per inhalare din acest medicament corespunde cu mai puțin de 1 ml de bere sau 1 ml de vin.

Există o cantitate mică de alcool în acest medicament. Este atât de puțin încât nu veți observa nimic.

3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Luați legătura cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Dozajul este stabilit individual, în timpul tratamentului pacientul trebuie să fie sub supraveghere medicală.

Doza recomandată este, cu excepția cazului în care este prescris altfel:

Adulți și copii de la 6 ani: 3 până la 4 ori pe zi câte două inhalări. În general, nu trebuie utilizate mai mult de 12 inhalări pe zi.

Efectul apare în câteva minute și durează maxim 6 ore. Utilizați Atrovent în fiecare zi, întotdeauna la aceleași ore ale zilei. Acest lucru oferă cel mai bun efect. Orele fixe vă ajută, de asemenea, să vă amintiți când trebuie să inhalați.

Atrovent este utilizat pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii de lungă durată. De aceea, Atrovent trebuie utilizat pe o perioadă mai lungă.

Pentru succesul tratamentului, este important să utilizați aerosolul corect.

Înainte de a folosi spray-ul pentru prima dată, trebuie să apăsați de două ori rezervorul. Dacă nu ați folosit spray-ul mai mult de trei zile, trebuie să apăsați o dată rezervorul înainte de utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, trebuie respectate următoarele reguli:

Mod de administrare:

1. Scoateți capacul de protecție de pe piesa bucală ..
2. Expirați cât mai profund posibil.
3. Expiră cât mai profund posibil.
4. Inspirați acum cât mai profund posibil prin gură și apăsați simultan o dată ferm spray-ul. Țineți respirația câteva secunde, scoateți piesa bucală și expirați. Repetați această procedură
5. ură de la punctul trei, dacă este prescrisă o a doua inhalare.
6. Repetați această procedură continuați de la punctul trei, dacă a fost prescrisă o a doua inhalare.
7. Puneți capacul de protecție înapoi pe piesa bucală.

N.B. Când utilizați Atrovent pentru prima dată, dacă vi se pare dificil, puteți încerca mai întâi în fața oglinzii.

Deoarece recipientul nu este transparent, nu este posibil să vedeți când este gol. Recipientul conține 200 de inhalări. După 200 de inhalări, poate părea că mai există puțin lichid în recipient. Totuși, trebuie să înlocuiți inhalatorul cu unul nou. Astfel, veți fi sigur că la fiecare puf primiți cantitatea corectă de medicament. Este foarte important să mențineți piesa bucală curată. Dacă nu o curățați regulat, piesa bucală se poate înfunda și nu va mai funcționa. Unii pacienți cred în mod eronat că recipientul este gol. Curățați piesa bucală cel puțin o dată pe săptămână.

Pentru a curăța piesa bucală, îndepărtați mai întâi capacul de protecție și recipientul de pe piesa bucală. Clătiți apoi piesa bucală cu apă caldă. Faceți acest lucru până când nu mai vedeți medicament și/sau murdărie (figura 2).

Scuturați piesa bucală și lăsați-o să se usuce la aer; nu folosiți un element de încălzire (de ex. uscător de păr) pentru uscare. Puneți recipientul și capacul de protecție înapoi când piesa bucală este uscată.

Verificați acum recipientul metalic. Chiar și în cazul utilizării normale, orificiile din tubul de evacuare se pot înfunda. Cu ajutorul unui ac fin, tubul poate fi desfundat cu ușurință.

N.B. Piesa bucală este special concepută pentru utilizarea cu Atrovent pentru a vă asigura că primiți întotdeauna cantitatea corectă de medicament. Piesa bucală nu trebuie utilizată cu alte aerosoli cu doză măsurată. De asemenea, nu trebuie să utilizați Atrovent cu o altă piesă bucală. Dacă observați că Atrovent este prea puternic sau prea slab, consultați medicul sau farmacistul.

În caz de dificultăți respiratorii bruște sau care se agravează rapidă fi direcționat.

N.B. Piesa bucală este special concepută pentru utilizarea cu Atrovent pentru a vă asigura că primiți întotdeauna cantitatea corectă de medicament. Prin urmare, piesa bucală nu trebuie utilizată pe alte doze de aerosoli. Nu trebuie să utilizați Atrovent cu o altă piesă bucală.

Dacă observați că Atrovent este prea puternic sau insuficient, consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

În caz de dificultăți respiratorii bruște sau care se agravează rapid trebuie să consultați imediat un medic.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Nu au fost observate simptome specifice după supradozaj. Dacă aveți simptome în caz de supradozaj, puteți consulta medicul dumneavoastră.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Dacă ați uitat o inhalare, o puteți face totuși. Totuși, dacă este aproape timpul pentru următoarea inhalare, puteți sări peste inhalarea uitată și să continuați conform prescripției medicului dumneavoastră. Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Nu opriți utilizarea Atrovent din proprie inițiativă. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră dacă intenționați să opriți. Dacă opriți în urma consultării cu medicul dumneavoastră, simptomele pe care le-ați avut înainte de tratamentul cu Atrovent, pot reveni.

4. Posibile reacții adverse

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează.

Reacțiile adverse pot apărea:

frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 pacienți) uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 pacienți)

rar (apar la mai puțin de 1 din 1000 pacienți)

Reacțiile adverse sunt clasificate pe organe.

Sistem imunitar

Sistem imunitar

Uneori: Hipersensibilitate și reacție de hipersensibilitate severă (anafilaxie).

Sistem nervos

Frecvent: Durere de cap și amețeli.

Ochi

Uneori: Vedere încețoșată, presiune intraoculară crescută (glaucom) (vezi și: când trebuie să fiți extra precaut cu acest medicament), durere oculară, dilatarea pupilelor (midriază), vedere de inele colorate (halouri vizuale), ochi în sânge (hiperemie conjunctivală) și acumulare de lichid în corneea (edem cornean).

Rar: Dificultăți de focalizare a cristalinului (tulburare de acomodare).

Inimă

Uneori: Palpitații (la doze mai mari), contracții regulate, dar foarte rapide ale inimii (fibrilație atrială) și aritmii cardiace.

Rar: Ritmul cardiac accelerat.

Respiratoriu și sistem și afecțiuni toracice

Frecvent: Tuse și iritație a gâtului.

Rar: Îngustarea căilor respiratorii ca urmare a inhalării (bronhospasm), spasm al corzilor vocale (laringospasm), umflarea gâtului și gât uscat.

Sistemul gastrointestinal

Frecvent: Gură uscată, tulburări gastrointestinale și greață.

Ocazional: Diaree, constipație, vărsături, inflamația mucoasei bucale (stomatită), retenție de lichide în gură și modificări ale gustului.

Afecțiuni cutanate

Ocazional: Mâncărime (prurit), erupții cutanate, acumulare bruscă de lichid în piele și mucoase (de exemplu, gât sau limbă), respirație dificilă de respirație și/sau mâncărime și erupție cutanată (angioedem).

Rareori: Erupție cutanată cu mâncărime intensă și formare de umflături (urticarie).

Dacă aveți reacția adversă de umflare acută localizată a limbii, buzelor și feței, trebuie să consultați imediat un medic.

Afectiuni renale și ale tractului urinar

Ocazional: Reținerea urinei. În caz de obstrucție a tractului urinar este necesară prudență (vezi și: când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Puteți raporta reacțiile adverse direct prin Centrul Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb, site-ul: www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A se păstra departe de vederea și accesul copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se proteja de direct lumina soarelui, căldură și îngheț.

Recipientul sub presiune nu trebuie deschis sau deteriorat cu forța. Deschiderea este periculoasă și face conținutul imediat inutilizabil.

Recipientul nu trebuie expus la temperaturi peste 50°C (de exemplu, pe calorifer sau sobă).

Nu mai utilizați acest medicament după data de expirare. te găsiți pe cutie după 'nu utilizați după' sau 'EXP'. Acolo este indicată o lună și un an. Ultima zi a aceleiluni este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse într-un mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este bromura de ipratropiu.

Celelalte substanțe (excipienți) din acest medicament sunt acid citric (E 330), apă purificată, alcool absolut și gaz propulsor (HFA 134a).

Cum arată Atrovent 20 micrograme/doză, aerosol, soluție și cât conține un ambalaj?

Un ambalaj de aerosol Atrovent conține un recipient cu piesă bucală cu 10 ml soluție pentru inhalare, corespunzător cu 200 de inhalări.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Boehringer Ingelheim bv

Basisweg 10

1043 AP Amsterdam

Tel.: 0800-2255889

Producător
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Germania

Înregistrat în registru sub RVG 26834

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în februarie 2022

Transtoyou