

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Augmentin 625 mg tabletid
ko-amoksiklav (amoksitsilliin ja klavulaanhape)

Lugege kogu seda infolehte hoolikalt enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- See ravim on määratud ainult teile (või teie lapsele). Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad kui teil.
- Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on Augmentin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Augmentini võtmist
3. Kuidas Augmentini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Augmentini säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Augmentin ja milleks seda kasutatakse

Augmentin on antibiootikum, mis toimib bakterite hävitamise teel, mis põhjustavad infektsioone. See sisaldab kahte erinevat ravimit, mida nimetatakse amoksitsilliiniks ja klavulaanhappeks. Amoksitsilliin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse "penitsilliinideks", mida saab mõnikord töö lõpetamisest peatada (muuta mitteaktiivseks). Teine aktiivne komponent (klavulaanhape) takistab selle juhtumist.

Augmentini kasutatakse täiskasvanutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:

- keskkõrva- ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid
- hingamisteede infektsioonid
- kuseteede infektsioonid
- naha ja pehmete kudede infektsioonid, sealhulgas hambainfektsioonid
- luu- ja liigesinfektsioonid.

2. Mida on vaja teada enne Augmentini võtmist

Ärge võtke Augmentini:

- kui olete allergiline amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)
- kui teil on kunagi olnud raske allergiline reaktsioon mõnele teisele antibiootikumile. See võib hõlmata nahalöövet või näo või kurgu turset.
- kui teil on kunagi olnud maksaprobleeme või kollatõbe (naha kollasus) antibiootikumi võtmise ajal.

Ärge võtke Augmentini, kui mõni ülaltoodud kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, rääkige enne Augmentini võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti või apteekriga enne Augmentini võtmist, kui teil on:

- näärmepalavik
- teid ravitakse maksa- või neeruprobleemide tõttu
- te ei erita regulaarselt uriini.

Kui te pole kindel, kas mõni ülaltoodud kehtib teie kohta, rääkige enne Augmentini võtmist oma arsti või apteekriga.

Mõnel juhul võib teie arst uurida, millist tüüpi bakterid põhjustavad teie infektsiooni. Sõltuvalt tulemustest võidakse teile anda erineva tugevusega Augmentini või mõni muu ravim.

Tingimused, millele peate tähelepanu pöörama

Augmentin võib mõningaid olemasolevaid seisundeid halvendada või põhjustada tõsisemaid kõrvaltoimeid. Nende hulka kuuluvad allergilised reaktsioonid, krambid (hoogud) ja jämesoole põletik. Peate Augmentini võtmise ajal teatud sümptomitele tähelepanu pöörama, et vähendada probleemide riski. Vaadake jaotist „Tingimused, millele peate tähelepanu pöörama” jaotises 4.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui teil tehakse vereanalüüse (näiteks punaste vereliblede seisundi testid või maksafunktsiooni testid) või uriinianalüüse (glükoosi jaoks), andke arstile või õele teada, et te võtate Augmentini. Seda seetõttu, et Augmentin võib mõjutada nende testide tulemusi.

Teised ravimid ja Augmentin

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või võite kasutada mingeid muid ravimeid.

- Kui te võtate allopurinooli (kasutatakse podagra raviks) koos Augmentiniga, on tõenäolisem, et teil tekib allergiline nahareaktsioon.
- Kui te võtate probenetsiidi (kasutatakse podagra raviks), võib teie arst otsustada kohandada teie Augmentini annust.
- Kui verehüüvete tekke vältimiseks mõeldud ravimeid (näiteks varfariin) võetakse koos Augmentiniga siis võib olla vaja täiendavaid vereanalüüse.
- Augmentin võib mõjutada, kuidas metotreksaat (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste raviks) toimib.
- Augmentin võib mõjutada, kuidas mükofenolaatmofetiil (ravim, mida kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks) toimib.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, arvate, et võite olla rase või plaanite last saada, küsige enne selle ravimi võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Augmentin võib põhjustada kõrvaltoimeid mõjusid ja sümptomid võivad muuta teid sõidukijuhtimiseks kõlbmatuks.

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te ei tunne end hästi.

Augmentin sisaldab naatriumi

- See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas Augmentini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kui te pole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed, kes kaaluvad 40 kg ja rohkem

Tavaline annus on:

- 1 tablett kolm korda päevas

Lapsed, kes kaaluvad alla 40 kg

Alla 6-aastaseid lapsi tuleks eelistatavalt ravida Augmentini suukaudse suspensiooni või kotikestega.

Küsige oma arstilt või apteekrilt nõu, kui annate Augmentini tablette lastele, kes kaaluvad alla 40 kg. Tabletid ei sobi lastele, kes kaaluvad alla 25 kg.

Neerude ja maksa probleemidega patsiendid

- Kui teil on neeruprobleeme, võib annust muuta. Teie arst võib valida teise tugevuse või teise ravimi.
- Kui teil on maksa probleemid võib teil olla sagedamini vereanalüüse, et kontrollida, kuidas teie maks töötab.

Kuidas Augmentini võtta

- Võtke koos toiduga.
- Neelake tabletid tervelt koos klaasi veega.
- Tablette saab kergemaks neelamiseks murda mööda murdejoont. Peate võtma mõlemad tableti osad korraga.
- Jagage annused päeva jooksul ühtlaselt, vähemalt 4-tunniste vahedega. Ärge võtke 2 annust 1 tunni jooksul.
- Ärge võtke Augmentini kauem kui 2 nädalat. Kui tunnete end endiselt halvasti, peaksite uuesti arsti juurde minema.

Kui võtate rohkem Augmentini kui peaksite

Kui olete võtnud liiga palju Augmentini, võivad sümptomid hõlmata kõhuärritust (iiveldus, oksendamise või kõhulahtisus) või krampe. Rääkige oma arstiga nii kiiresti kui võimalik. Võtke kaasa ravimi karp või pudel, et arstile näidata.

Kui unustate Augmentini võtta

- Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui meelde tuleb.
- Te ei tohiks järgmist annust võtta liiga vara, vaid oodake umbes 4 tundi enne järgmise annuse võtmist. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate Augmentini võtmise

Jätkake Augmentini võtmist kuni ravi lõpuni, isegi kui tunnete end paremini. Iga annus on vajalik, et aidata infektsiooni vastu võidelda. Kui mõned bakterid ellu jäävad võivad need põhjustada infektsiooni tagasituleku.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpool loetletud kõrvaltoimed võivad selle ravimiga esineda.

Tingimused, millele peate tähelepanu pöörama

Allergilised reaktsioonid:

- nahalööve
- veresoonte põletik (vaskuliit), mis võib olla nähtav punaste või lillade tõstetud laikudena nahal, kuid võib mõjutada ka teisi kehaosi
- palavik, liigesevalu, paistes lümfisõlmed kaelas, kaenlaalustes või kubemes
- turse, mõnikord näo või kõri piirkonnas (angioödeem), põhjustades hingamisraskusi
- kollaps
- valu rinnus allergiliste reaktsioonide kontekstis, mis võib olla allergiast põhjustatud südameinfarkti sümptom (Kounis sündroom)

Võtke kohe ühendust arstiga, kui teil tekib mõni neist sümptomitest. Lõpetage Augmentini võtmine.

Jämesoole põletik

Jämesoole põletik, mis põhjustab vesist kõhulahtisust tavaliselt vere ja limaga, kõhuvalu ja/või palavik.

Ravimist põhjustatud enterokoliidi sündroom (DIES)

DIES on peamiselt teatatud lastel, kes saavad amoksitsilliini/klavulaanhapet. See on teatud tüüpi allergiline reaktsioon, mille peamine sümptom on korduv oksendamine (1-4 tundi pärast ravimi manustamist). Edasised sümptomid võivad hõlmata kõhuvalu, letargiat, kõhulahtisust ja madalat vererõhku.

Äge pankrease põletik (äge pankreatiit)

Kui teil on tugev ja pidev valu kõhupiirkonnas, võib see olla ägeda pankreatiidi tunnus.

Võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga, et saada nõu, kui teil esinevad need sümptomid.

Väga sagedased kõrvaltoimed

Need võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st

- kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sagedased kõrvaltoimed

Need võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st

- soor (candida - pärmseene infektsioon tupes, suus või nahavoltides)
- iiveldus, eriti suurte annuste võtmisel

- kui see mõjutab, võtke Augmentin koos toiduga
- oksendamine
- kõhulahtisus (lastel).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st

- nahalööve, sügelus
- tõusnud sügelev lööve (nõgestõbi)
- seedehäired
- pearinglus
- peavalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmned teie vereanalüüsides:

- mõnede maksa toodetud ainete (ensüümide) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st

- nahalööve, mis võib villida ja näeb välja nagu väikesed sihtmärgid (keskel tumedad laigud, mida ümbritseb heledam ala, servas tumeda ringiga - multiformne erüteem) kui märkate mõnda neist sümptomitest, võtke kiiresti ühendust arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmned teie vereanalüüsides:

- verehüübimises osalevate rakkude vähesus
- valgete vereliblede vähesus.

Sagedus teadmata

Sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata.

- Allergilised reaktsioonid (vt eespool)
- Jämesoole põletik (vt eespool)
- Aju ja seljaaju ümbritsevate membraanide põletik (aseptiline meningiit)

Tõsised nahareaktsioonid:

- ulatuslik lööve villide ja naha koorumisega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom) ja raskem vorm, mis põhjustab ulatuslikku naha koorumist (rohkem kui 30% kehapinnast - toksiline epidermaalne nekrolüüs)
- ulatuslik punane nahalööve väikeste mädaga täidetud villidega (bulloosne eksfoliativne dermatiit)
- punane, ketendav lööve nahaaluste punnide ja villidega (eksanteemne pustuloos).
- gripilaadsed sümptomid koos lööbe, palaviku, paistes lümfisõlmede ja ebanormaalsete vereanalüüsides tulemustega (sealhulgas suurenenud valgevereliblede (eosinofiilia) ja maksaensüümide sisaldus) (Ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)).
- punane lööve, mida tavaliselt nähakse mõlemal tuharal, reite ülaosas, kaenlaalustes, kaelal (Sümmeetriline ravimiga seotud intertrigiinne ja fleksuraalne eksanteem (SDRIFE)).

Võtke kohe ühendust arstiga, kui teil tekib mõni neist sümptomitest.

- lööve villidega, mis on paigutatud ringikujuliselt keskse koorikuga või nagu pärlikee (lineaarne IgA haigus)
- maksa põletik (hepatiit)
- kollatõbi, mis on põhjustatud bilirubiini (aine, mida toodetakse maksas) sisalduse suurenemisest veres, mis võib muuta teie naha ja silmavalged kollaseks
- neerutorukeste põletik
- veri hüübib aeglasemalt
- hüperaktiivsus
- krambid (inimestel, kes võtavad suuri annuseid Augmentini või kellel on neeruprobleemid)
- must keel, mis näeb välja karvane.

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmned teie vere- või uriinianalüüsides:

- valgeveriblede arvu tugev vähenemine
- punaste veriblede vähene arv (hemolüütiline aneemia)
- kristallid uriinis, mis põhjustavad ägedat neerukahjustust.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Kollase Kaardi skeemi kaudu aadressil:

www.mhra.gov.uk/yellowcard või otsides Google Play või Apple App Store'ist MHRA Yellow Card.

Kõrvaltoimetest teatades aitate kaasa rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

Kuidas Augmentini säilitada

5. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 - Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu (EXP), mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 - Ärge hoidke üle 25
 - oC. Kotis olevad tabletid tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul pärast koti avamist.
 - Hoida originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest.
 - Ärge kasutage, kui tabletid on katki või kahjustatud.
 - Ärge visake ravimeid ära kanalisatsiooni või olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
 - Pakendi sisu ja muu teave

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Augmentin sisaldab

- Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape. Iga tablett sisaldab amoksitsilliintrihiidraati, mis vastab 500 mg amoksitsilliinile, ja kaaliumklavulanaati, mis vastab 125 mg klavulaanhappele.
- Muud koostisosad on: Tableti südamik - magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, kolloidne veevaba ränidioksiid, mikrokristalne tselluloos.
- Kilekate - titaandioksiid (E171), hüpromelloos, makrogool (4000, 6000) ja silikoonõli (dimetikoon).

Kuidas Augmentin välja näeb ja pakendi sisu

Augmentin 625 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad, ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on süvendatud "AC" ja poolitusjoon.

Need on pakendatud:

- blisterpakenditesse, mis on karbis. Iga pakend sisaldab 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 või 500 tabletti.
- blisterpakenditesse, mis on kotis, karbis. Kott sisaldab kuivatusaine pakikest. Kuivatusaine tuleb hoida kotis ja seda ei tohi süüa. Iga pakend sisaldab 14, 20 või 21 tabletti.

Kõiki pakendi suurusi ei pruugita turustada.

Müügiloa omanik ja tootja Müügiloa

Turundus Luba Omandaja:

Beecham Group plc, 79 New Oxford Street, London, WC1A 1DG, Ühendkuningriik

Tootja:

Glaxo Wellcome Tootmine, Z.I. de la Peyenniere, 53100 Mayenne Cedex, Prantsusmaa.

Muud formaadid

Selle infolehe kuulamiseks või Braille'i kirjas, suures kirjas või audiona koopia saamiseks helistage tasuta:

0800 198 5000 (ainult Ühendkuningriigis)

Palun olge valmis andma järgmist teavet:

Tootenimi Augmentin 625 mg tabletid

Viitenumber 00038/0362

Seda teenust pakub Kuninglik Pimedate Inimeste Instituut.

Seda infolehte uuendati viimati jaanuaris 2025.

Kaubamärgid kuuluvad GSK ettevõtete grupile või on neile litsentsitud.

© 2025 GSK ettevõtete grupp või selle litsentsiandja.

Nõuanded/meditsiiniline haridus

Antibiootikume kasutatakse bakterite põhjustatud infektsioonide raviks. Neil ei ole mõju viiruste põhjustatud infektsioonide vastu.

Mõnikord ei allu bakterite põhjustatud infektsioon antibiootikumikuurile. Üks levinumaid põhjuseid on see, et infektsiooni põhjustavad bakterid on võetud antibiootikumi suhtes resistentsed. See tähendab, et nad suudavad ellu jääda ja isegi paljuneda vaatamata antibiootikumile.

Bakterid võivad muutuda antibiootikumide suhtes resistentseks mitmel põhjusel.

Antibiootikumide ettevaatlik kasutamine võib aidata vähendada bakterite resistentsuse tekkimise tõenäosust.

Kui teie arst määrab teile antibiootikumikuuri, on see mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Järgmistele nõuannetele tähelepanu pööramine aitab vältida resistentsete bakterite teket, mis võivad antibiootikumi toime peatada.

1. On väga oluline, et te võtaksite antibiootikumi õige annuse, õigel ajal ja õige arvu päevade jooksul. Lugege etiketi juhiseid ja kui te millestki aru ei saa, küsige oma arstilt või apteekrilt selgitust.
2. Te ei tohiks võtta antibiootikumi, kui see ei ole spetsiaalselt teile määratud, ja te peaksite seda kasutama ainult selle infektsiooni raviks, milleks see määrati.
3. Te ei tohiks võtta antibiootikume, mis on määratud teistele inimestele, isegi kui neil oli infektsioon, mis oli sarnane teie omaga.
4. Te ei tohiks anda antibiootikume, mis on teile määratud, teistele inimestele.
5. Kui teil jääb antibiootikumi üle pärast seda, kui olete kuuri vastavalt arsti juhistele lõpetanud, peaksite ülejäänud viima apteeki nõuetekohaseks hävitamiseks.