

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Augmentin 625 mg tabletės
ko-amoksiklav (amoksicilinas ir klavulano rūgštis)

Perskaitykite visą šį lapelį atidžiai prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Laikykite šį lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas tik jums (ar jūsų vaikui). Nedalinkite jo kitiems. Jis gali jiems pakenkti, net jei jų ligos požymiai tokie patys kaip jūsų.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Tai apima bet kokį galimą šalutinį poveikį, nenurodytą šiame lapelyje. Žr. 4 skyrių.

Kas yra šiame lapelyje

1. Kas yra Augmentin ir kam jis vartojamas
2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Augmentin
3. Kaip vartoti Augmentin
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Augmentin
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Augmentin ir kam jis vartojamas

Augmentin yra antibiotikas, kuris veikia naikindamas bakterijas, sukeliančias infekcijas. Jis sudarytas iš dviejų skirtingų vaistų, vadinamų amoksicilinu ir klavulano rūgštimi. Amoksicilinas priklauso vaistų grupei, vadinamai „penicilinais“, kuri kartais gali nustoti veikti (tapti neaktyvi). Kitas aktyvus komponentas (klavulano rūgštis) neleidžia tam įvykti.

Augmentin yra naudojamas suaugusiems ir vaikams gydyti šias infekcijas:

- vidurinės ausies ir sinusų infekcijos
- kvėpavimo takų infekcijos
- šlapimo takų infekcijos
- odos ir minkštųjų audinių infekcijos, įskaitant dantų infekcijas
- kaulų ir sąnarių infekcijos.

2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Augmentin

Nevartokite Augmentin:

- jei esate alergiškas amoksicilinui, klavulano rūgščiai, penicilinui ar bet kuriai kitai šio vaisto sudedamajai daliai (išvardytai 6 skyriuje)
- jei kada nors turėjote sunkią alerginę reakciją į bet kurį kitą antibiotiką. Tai gali apimti odos bėrimą ar veido ar gerklės patinimą.
- jei kada nors turėjote kepenų problemų ar geltą (odos pageltimą) vartojant antibiotiką. Nevartokite Augmentin, jei bet kuris iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka. Jei nesate tikri, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku prieš vartodami Augmentin.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku prieš vartodami Augmentin, jei:

- sergate liaukų karštine
- jums gydomos kepenų ar inkstų problemos
- nešlapinatės reguliariai.

Jei nesate tikri, ar bet kuris iš aukščiau išvardytų punktų jums tinka, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku prieš vartodami Augmentin.

Kai kuriais atvejais jūsų gydytojas gali ištirti bakterijų tipą, kuris sukelia jūsų infekciją. Priklausomai nuo rezultatų, jums gali būti paskirta kitokia Augmentin stiprumo dozė arba kitas vaistas.

Būklės, į kurias reikia atkreipti dėmesį

Augmentin gali pabloginti kai kurias esamas būkles arba sukelti rimtų šalutinių poveikių. Tai apima alergines reakcijas, traukulius (priepuolius) ir storosios žarnos uždegimą. Jūs turite atkreipti dėmesį į tam tikrus simptomus, kol vartojate Augmentin, kad sumažintumėte bet kokių problemų riziką. Žr. „Būklės, į kurias reikia atkreipti dėmesį“ 4 skyriuje.

Kraujo ir šlapimo tyrimai

Jei atliekate kraujo tyrimus (pvz., raudonųjų kraujo kūnelių būklės ar kepenų funkcijos tyrimus) arba šlapimo tyrimus (dėl gliukozės), praneškite gydytojui ar slaugytojai, kad vartojate Augmentin. Taip yra todėl, kad Augmentin gali paveikti šių tyrimų rezultatus.

Kiti vaistai ir Augmentin

Pasakykite savo gydytojui ar vaistininkui, jei vartojate, neseniai vartojote ar galite vartoti kitus vaistus.

- Jei vartojate alopurinolį (naudojamą podagrai gydyti) kartu su Augmentin, gali būti didesnė tikimybė, kad turėsite alerginę odos reakciją.
- Jei vartojate probenecidą (naudojamą podagrai gydyti), jūsų gydytojas gali nuspręsti koreguoti jūsų Augmentin dozę.
- Jei vaistai, padedantys sustabdyti kraujo krešulius (pvz., varfarinas), vartojami kartu su Augmentin tada gali prireikti papildomų kraujo tyrimų.
- Augmentin gali paveikti, kaip veikia metotreksatas (vaistas, naudojamas vėžiui ar reumatinėms ligoms gydyti).
- Augmentin gali paveikti, kaip veikia mikofenolato mofetilis (vaistas, naudojamas transplantuotų organų atmetimui išvengti).

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Jei esate nėščia ar žindote kūdikį, manote, kad galite būti nėščia arba planuojate turėti kūdikį, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Augmentin gali turėti šalutinių poveikių ir simptomai gali padaryti jus netinkamais vairuoti. Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, jei nesijaučiate gerai.

Augmentin sudėtyje yra natrio

- Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje tabletėje, tai yra, iš esmės „be natrio“.

3. Kaip vartoti Augmentin

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Jei nesate tikri, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Suaugusieji ir vaikai, sveriantys 40 kg ir daugiau
Įprasta dozė yra:

- 1 tabletė tris kartus per dieną

Vaikai, sveriantys mažiau nei 40 kg

Vaikai iki 6 metų turėtų būti gydomi Augmentin geriamąja suspensija arba paketėliais.

Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką patarimo, kai duodate Augmentin tabletes vaikams, sveriantiems mažiau nei 40 kg. Tabletės netinka vaikams, sveriantiems mažiau nei 25 kg.

Pacientai, turintys inkstų ir kepenų problemų

- Jei turite inkstų problemų, dozė gali būti pakeista. Gydytojas gali pasirinkti kitą stiprumą arba kitą vaistą.
- Jei turite kepenų problemų jums gali būti dažniau atliekami kraujo tyrimai, siekiant patikrinti, kaip veikia jūsų kepenys.

Kaip vartoti Augmentin

- Vartokite su maistu.
- Nurykite tabletes užsigerdami stikline vandens.
- Tabletes galima perlaužti per įpjovimo liniją, kad būtų lengviau nuryti. Abi tabletes dalis turite išgerti vienu metu.
- Dozes paskirstykite tolygiai per dieną, bent 4 valandų intervalu. Nevartokite 2 dozių per 1 valandą.
- Nevartokite Augmentin ilgiau nei 2 savaites. Jei vis dar jaučiatės blogai, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Jei išgėrėte daugiau Augmentin nei turėtumėte

Jei išgėrėte per daug Augmentin, požymiai gali būti skrandžio sutrikimas (pykinimas, vėmimas ar viduriavimas) arba traukuliai. Kuo greičiau pasitarkite su gydytoju. Parodykite gydytojui vaisto pakuotę ar buteliuką.

Jei pamiršote išgerti Augmentin

- Jei pamiršote išgerti dozę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite.
- Jūs neturėtumėte vartoti kitos dozės per anksti, bet palaukite apie 4 valandas prieš vartodami kitą dozę. Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei nustojate vartoti Augmentin

Tęskite Augmentin vartojimą, kol baigsite gydymą, net jei jaučiatės geriau. Jums reikia kiekvienos dozės, kad padėtumėte kovoti su infekcija. Jei kai kurios bakterijos išgyvena, jos gali sukelti infekcijos atsinaujinimą.

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne visi jį patiria. Toliau nurodytas šalutinis poveikis gali pasireikšti vartojant šį vaistą.

Būklės, į kurias reikia atkreipti dėmesį

Alerginės reakcijos:

- odos bėrimas
- kraujagyslių uždegimas (vaskulitas), kuris gali būti matomas kaip raudonos arba violetinės iškilusios dėmės ant odos, bet gali paveikti ir kitas kūno dalis
- karščiavimas, sąnarių skausmas, patinę limfmazgiai kakle, pažastyje ar kirkšnyje
- patinimas, kartais veido ar gerklės (angioedema), sukeliantis kvėpavimo sunkumus
- kolapsas
- krūtinės skausmas alerginių reakcijų kontekste, kuris gali būti alergijos sukeltos širdies infarkto simptomas (Kounis sindromas)

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų. Nutraukite Augmentin vartojimą.

Storosios žarnos uždegimas

Storosios žarnos uždegimas, sukeliantis vandeningą viduriavimą dažniausiai su krauju ir gleivėmis, pilvo skausmu ir/arba karščiavimu.

Vaistų sukeltas enterokolito sindromas (DIES)

DIES dažniausiai buvo praneštas vaikams, vartojantiems amoksiciliną/klavulano rūgštį. Tai tam tikra alerginė reakcija, kurios pagrindinis simptomas yra pasikartojantis vėmimas (1-4 valandos po vaisto vartojimo). Kiti simptomai gali būti pilvo skausmas, letargija, viduriavimas ir žemas kraujospūdis.

Ūmus kasos uždegimas (ūminis pankreatitas)

Jei jaučiate stiprų ir nuolatinį skausmą pilvo srityje, tai gali būti ūminio pankreatito požymis.

Kreipkitės į gydytoją kuo greičiau, jei pasireiškia šie simptomai.

Labai dažnas šalutinis poveikis

Šis poveikis gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 žmonių

- viduriavimas (suaugusiesiems).

Dažnas šalutinis poveikis

Šis poveikis gali pasireikšti iki 1 iš 10 žmonių

- pienligė (kandidozė - mielių infekcija makštyje, burnoje ar odos raukšlėse)
- pykinimas, ypač vartojant dideles dozes
- jei pasireiškia, vartokite Augmentin su maistu
- vėmimas
- viduriavimas (vaikams).

Nedažnas šalutinis poveikis

Šis poveikis gali pasireikšti iki 1 iš 100 žmonių

- odos bėrimas, niežulys

- iškilęs niežtintis bėrimas (dilgėlinė)
- nevirškinimas
- galvos svaigimas
- galvos skausmas.

Nedažni šalutiniai poveikiai, kurie gali pasireikšti jūsų kraujo tyrimuose:

- kai kurių kepenų gaminamų medžiagų (fermentų) padidėjimas.

Reti šalutiniai poveikiai

Šie gali paveikti iki 1 iš 1000 žmonių

- odos bėrimas, kuris gali pūslėti ir atrodo kaip maži taikiniai (tamsūs centriniai taškai, apsupti šviesesne sritimi, su tamsiu žiedu aplink kraštą - daugiaformė eritema) jei pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, skubiai kreipkitės į gydytoją.

Reti šalutiniai poveikiai, kurie gali pasireikšti jūsų kraujo tyrimuose:

- mažas kraujo krešėjime dalyvaujančių ląstelių skaičius
- mažas baltųjų kraujo kūnelių skaičius.

Dažnis nežinomas

Dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis.

- Alerginės reakcijos (žr. aukščiau)
- Storosios žarnos uždegimas (žr. aukščiau)
- Smegenų ir nugaros smegenų dangalų uždegimas (aseptinis meningitas)

Sunkios odos reakcijos:

- platus bėrimas su pūslėmis ir odos lupimusi, ypač aplink burną, nosį, akis ir lytinius organus (Stevenso-Johnsono sindromas), ir sunkesnė forma, sukianti didelį odos lupimąsi (daugiau nei 30% kūno paviršiaus - toksinė epidermio nekrolizė)
- platus raudonas odos bėrimas su mažomis pūslėmis, turinčiomis pūlių (buliozinis eksfoliacinis dermatitas)
- raudonas, žvynuotas bėrimas su gumbeliais po oda ir pūslėmis (egzanteminė pustuliozė).
- gripo simptomai su bėrimu, karščiavimu, patinusiomis liaukomis ir nenormaliais kraujo tyrimų rezultatais (įskaitant padidėjusį baltųjų kraujo kūnelių (eozinofiliją) ir kepenų fermentus) (Vaistų reakcija su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS)).
- raudonas bėrimas, dažniausiai matomas abiejose sėdmens pusėse, viršutinėse vidinėse šlaunų dalyse, pažastyse, kakle (Simetrinis vaistų sukeltas intertrigininis ir lankstinis egzantema (SDRIFE)).

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų.

- bėrimas su pūslėmis, išsidėsčiusiomis ratu su centriniu šašu arba kaip perlų vėrinys (linijinė IgA liga)
- kepenų uždegimas (hepatitas)
- gelta, kurią sukelia padidėjęs bilirubino kiekis kraujyje (medžiaga, gaminama kepenyse), dėl kurios jūsų oda ir akių baltymai gali tapti geltoni
- inkstų kanalėlių uždegimas
- kraujas ilgiau kreša
- hiperaktyvumas

- traukuliai (žmonėms, vartojantiems dideles Augmentin dozes arba turintiems inkstų problemų)
- juoda liežuvis, kuris atrodo plaukuotas.

Šalutiniai poveikiai, kurie gali pasireikšti jūsų kraujo ar šlapimo tyrimuose:

- smarkus baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimas
- mažas raudonųjų kraujo kūnelių skaičius (hemolizinė anemija)
- kristalai šlapime, sukeltantys ūminį inkstų pažeidimą.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Tai apima bet kokį galimą šalutinį poveikį, nenurodytą šiame lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per Geltonosios kortelės schemą adresu:

www.mhra.gov.uk/yellowcard arba ieškodami MHRA Yellow Card „Google Play“ arba „Apple App Store“.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Kaip laikyti Augmentin

5. Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 - Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui (EXP), kuris nurodytas ant dėžutės. Galiojimo data nurodo paskutinę to mėnesio dieną.
 - Nelaikykite aukštesnėje kaip 25
 - oC temperatūroje. Tabletės, tiekiamos maišeliuose, turi būti sunaudotos per 30 dienų nuo maišelio atidarymo.
 - Laikykite originalioje pakuotėje, kad apsaugotumėte nuo drėgmės.
 - Nenaudokite, jei tabletės yra suskilusios ar pažeistos.
 - Nesunaikinkite vaistų per nuotekas ar buitinį atliekų konteinerį. Paklauskite savo vaistininko, kaip išmesti vaistus, kurių nebenaudojate. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 - Pakuotės turinys ir kita informacija

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kas yra Augmentin sudėtyje

- Veikliosios medžiagos yra amoksicilinas ir klavulano rūgštis. Kiekvienoje tabletėje yra amoksicilino trihidrato, atitinkančio 500 mg amoksicilino, ir kalio klavulanato, atitinkančio 125 mg klavulano rūgšties.
- Kiti ingredientai yra: Tabletės šerdis - magnio stearatas, natrio krakmolo glikolatas A tipo, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, mikrokristalinė celiuliozė.
- Plėvelės dangalas - titano dioksidas (E171), hipromeliozė, makrogolis (4000, 6000) ir silikono aliejus (dimetikonas).

Kaip atrodo Augmentin ir pakuotės turinys

Augmentin 625 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos arba beveik baltos, ovalios formos, su įspaudu „AC“ ir linija vienoje pusėje.

Jos supakuotos į:

- lizdines plokšteles, įdėtas į dėžutę. Kiekvienoje pakuotėje yra 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 arba 500 tablečių.
- lizdines plokšteles maišelyje, įdėtame į dėžutę. Maišelyje yra sausiklio pakelis. Sausiklis turi būti laikomas maišelyje ir negali būti valgomas. Kiekvienoje pakuotėje yra 14, 20 arba 21 tabletė.

Ne visos pakuotės gali būti parduodamos.

Rinkodaros Leidimo Turėtojas ir Gamintojas

Rinkodaros Leidimas Turėtojas:

Beecham Group plc, 79 New Oxford Street, London, WC1A 1DG, Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Glaxo Wellcome Production, Z.I. de la Peyenniere, 53100 Mayenne Cedex, Prancūzija.

Kiti formatai

Norėdami klausytis arba užsisakyti šio lapelio kopiją Brailio raštu, dideliu šriftu ar garso formatu, skambinkite nemokamai:

0800 198 5000 (tik JK)

Prašome būti pasiruošus pateikti šią informaciją:

Produkto pavadinimas Augmentin 625 mg tabletės

Nuorodos numeris 00038/0362

Tai paslauga, teikiama Karališkojo Nacionalinio Aklyjų Instituto.

Šis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2025 m. sausį.

Prekių ženklai priklauso arba yra licencijuotos GSK įmonių grupei.

© 2025 GSK įmonių grupė arba jos licencijos turėtojas.

Patarimai/medicininis švietimas

Antibiotikai naudojami bakterijų sukeltoms infekcijoms gydyti. Jie neturi poveikio virusų sukeltoms infekcijoms.

Kartais bakterijų sukelta infekcija nereaguoja į antibiotikų kursą. Viena iš dažniausių priežasčių, kodėl taip nutinka, yra ta, kad bakterijos, sukeliančios infekciją, yra atsparios vartojamam antibiotikui. Tai reiškia, kad jos gali išgyventi ir net daugintis nepaisant antibiotiko.

Bakterijos gali tapti atsparios antibiotikams dėl daugelio priežasčių. Atsargus antibiotikų vartojimas gali padėti sumažinti tikimybę, kad bakterijos taps jiems atsparios.

Kai jūsų gydytojas paskiria antibiotikų kursą, jis skirtas tik jūsų dabartinei ligai gydyti. Laikydami šių patarimų padėsite išvengti atsparių bakterijų atsiradimo, kurios galėtų sustabdyti antibiotiko veikimą.

1. Labai svarbu, kad vartotumėte antibiotiką tinkama doze, tinkamu laiku ir tinkamą dienų skaičių. Perskaitykite instrukcijas etiketėje ir jei ko nors nesuprantate, paprašykite gydytojo ar vaistininko paaiškinti.
2. Neturėtumėte vartoti antibiotiko, nebent jis būtų paskirtas būtent jums, ir turėtumėte jį naudoti tik tam infekcijai gydyti, kuriai jis buvo paskirtas.
3. Neturėtumėte vartoti antibiotikų, kurie buvo paskirti kitiems žmonėms, net jei jie turėjo infekciją, kuri buvo panaši į jūsų.
4. Neturėtumėte duoti antibiotikų, kurie buvo paskirti jums, kitiems žmonėms.
5. Jei jums liko antibiotikų, kai baigėte kursą, kaip nurodė gydytojas, turėtumėte likučius nunešti į vaistinę tinkamam utilizavimui.

Transtoyou