

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Augmentin 625 mg Tabletter co-amoksiklav (amoksisillin og klavulansyre)

Les hele dette pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, fordi det inneholder viktig informasjon for deg.

- Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er forskrevet kun til deg (eller ditt barn). Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine.
- Hvis du opplever bivirkninger, kontakt lege eller apotek. Dette inkluderer eventuelle bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

Hva dette pakningsvedlegget inneholder

1. Hva Augmentin er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Augmentin
3. Hvordan du bruker Augmentin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Augmentin
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Augmentin er og hva det brukes mot

Augmentin er et antibiotikum og virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det inneholder to forskjellige legemidler kalt amoksisillin og klavulansyre. Amoksisillin tilhører en gruppe legemidler kalt "penicilliner" som noen ganger kan bli stoppet fra å virke (gjort inaktiv). Den andre aktive komponenten (klavulansyre) forhindrer at dette skjer.

Augmentin brukes hos voksne og barn til å behandle følgende infeksjoner:

- mellomøre- og bihuleinfeksjoner
- luftveisinfeksjoner
- urinveisinfeksjoner
- hud- og bløtvevsinfeksjoner inkludert tanninfeksjoner
- bein- og leddinfeksjoner.

2. Hva du trenger å vite før du tar Augmentin

Ikke ta Augmentin:

- hvis du er allergisk mot amoksisillin, klavulansyre, penicillin eller noen av de andre ingrediensene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
- hvis du noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på et annet antibiotikum. Dette kan inkludere hudutslett eller hevelse i ansiktet eller halsen.
- hvis du noen gang har hatt leverproblemer eller gulsott (gulfarging av huden) når du tok et antibiotikum.

Ikke ta Augmentin hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med legen din eller apoteket før du tar Augmentin.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med legen din eller apoteket før du tar Augmentin hvis du:

- har kysseesyke
- blir behandlet for lever- eller nyreproblemer
- ikke tisser regelmessig.

Hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder for deg, snakk med legen din eller apoteket før du tar Augmentin.

I noen tilfeller kan legen din undersøke hvilken type bakterier som forårsaker infeksjonen din. Avhengig av resultatene, kan du få en annen styrke av Augmentin eller et annet legemiddel.

Tilstander du må være oppmerksom på

Augmentin kan forverre noen eksisterende tilstander eller forårsake alvorlige bivirkninger. Disse inkluderer allergiske reaksjoner, kramper (anfall) og betennelse i tykktarmen. Du må være oppmerksom på visse symptomer mens du tar Augmentin, for å redusere risikoen for problemer. Se 'Tilstander du må være oppmerksom på' i avsnitt 4.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal ta blodprøver (som tester for røde blodlegemer eller leverfunksjonstester) eller urinprøver (for glukose), informer legen eller sykepleieren om at du tar Augmentin. Dette er fordi Augmentin kan påvirke resultatene av disse typene tester.

Andre legemidler og Augmentin

Fortell legen din eller apoteket hvis du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler.

- Hvis du tar allopurinol (brukt mot urinsyregikt) sammen med Augmentin, er det mer sannsynlig at du får en allergisk hudreaksjon.
- Hvis du tar probenecid (brukt mot urinsyregikt), kan legen din bestemme seg for å justere dosen din av Augmentin.
- Hvis legemidler for å forhindre blodpropp (som warfarin) tas sammen med Augmentin kan det være nødvendig med ekstra blodprøver.
- Augmentin kan påvirke hvordan metotreksat (et legemiddel brukt til å behandle kreft eller revmatiske sykdommer) virker.
- Augmentin kan påvirke hvordan mykofenolatmofetil (et legemiddel brukt for å forhindre avstøtning av transplanterte organer) virker.

Graviditet, amming og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn, spør legen din eller apoteket om råd før du tar dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Augmentin kan ha bivirkninger effekter og symptomene kan gjøre deg uegnet til å kjøre. Ikke kjør eller bruk maskiner med mindre du føler deg bra.

Augmentin inneholder natrium

- Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vil si i hovedsak 'natriumfritt'.

3. Hvordan ta Augmentin

Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Sjekk med legen din eller apoteket hvis du er usikker.

Voksne og barn som veier 40 kg og over

Vanlig dose er:

- 1 tablett tre ganger daglig

Barn som veier mindre enn 40 kg

Barn som er 6 år eller yngre bør helst behandles med Augmentin mikstur eller poser.

Spør legen din eller apoteket om råd når du gir Augmentin tabletter til barn som veier mindre enn 40 kg. Tablettene er ikke egnet for barn som veier mindre enn 25 kg.

Pasienter med nyre- og leverproblemer

- Hvis du har nyreproblemer kan dosen bli endret. En annen styrke eller et annet legemiddel kan bli valgt av legen din.
- Hvis du har lever problemer kan du få hyppigere blodprøver for å sjekke hvordan leveren din fungerer.

Hvordan ta Augmentin

- Ta med et måltid.
- Svelg tablettene hele med et glass vann.
- Tablettene kan deles langs delestreken for å gjøre dem lettere å svelge. Du må ta begge delene av tablettene samtidig.
- Fordel dosene jevnt utover dagen, med minst 4 timers mellomrom. Ikke ta 2 doser i løpet av 1 time.
- Ikke ta Augmentin i mer enn 2 uker. Hvis du fortsatt føler deg uvel, bør du gå tilbake til legen.

Hvis du tar mer Augmentin enn du skal

Hvis du har fått i deg for mye Augmentin, kan tegn inkludere urolig mage (kvalme, oppkast eller diaré) eller kramper. Snakk med legen din så snart som mulig. Ta med medisinpakken eller flasken for å vise legen.

Hvis du glemmer å ta Augmentin

- Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det.
- Du bør ikke ta neste dose for tidlig, men vent omtrent 4 timer før du tar neste dose. Ikke ta en dobbel dose for å kompensere for en glemt dose.

Hvis du slutter å ta Augmentin

Fortsett å ta Augmentin til behandlingen er ferdig, selv om du føler deg bedre. Du trenger hver dose for å bekjempe infeksjonen. Hvis noen bakterier overlever kan de forårsake at infeksjonen kommer tilbake.

Hvis du har flere spørsmål om bruken av denne medisinen, spør legen din eller apoteket.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, selv om ikke alle får dem. Bivirkningene nedenfor kan oppstå med dette legemidlet.

Tilstander du må være oppmerksom på

Allergiske reaksjoner:

- hudutslett
- betennelse i blodkar (vaskulitt) som kan være synlig som røde eller lilla hevede flekker på huden, men kan påvirke andre deler av kroppen
- feber, leddsmerter, hovne kjertler i halsen, armhulen eller lysken
- hevelse, noen ganger i ansiktet eller halsen (angioødem), som forårsaker pustevansker
- kollaps
- brystmerter i sammenheng med allergiske reaksjoner, som kan være et symptom på allergiutløst hjerteinfarkt (Kounis syndrom)

Kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av disse symptomene. Slutt å ta Augmentin.

Betennelse i tykktarmen

Betennelse i tykktarmen, som forårsaker vannaktig diaré vanligvis med blod og slim, magesmerter og/eller feber.

Legemiddelindusert enterokolittsyndrom (DIES)

DIES er hovedsakelig rapportert hos barn som får amoksisillin/klavulansyre. Det er en viss type allergisk reaksjon med det ledende symptomet gjentatt oppkast (1-4 timer etter legemiddeladministrasjon). Ytterligere symptomer kan omfatte magesmerter, sløvhet, diaré og lavt blodtrykk.

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt)

Hvis du har sterke og vedvarende smerter i mageregionen, kan dette være et tegn på akutt pankreatitt.

Kontakt legen din så snart som mulig for råd hvis du får disse symptomene.

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan påvirke mer enn 1 av 10 personer

- diaré (hos voksne).

Vanlige bivirkninger

Disse kan påvirke opptil 1 av 10 personer

- trøske (candida - en soppinfeksjon i skjeden, munnen eller hudfolder)
- kvalme, spesielt ved høye doser
- hvis påvirket, ta Augmentin med et måltid
- oppkast
- diaré (hos barn).

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan påvirke opptil 1 av 100 personer

- hudutslett, kløe

- hevet kløende utslett (elveblest)
- fordøyelsesbesvær
- svimmelhet
- hodepine.

Uvanlige bivirkninger som kan vises i blodprøvene dine:

- økning i noen stoffer (enzymer) produsert av leveren.

Sjeldne bivirkninger

Disse kan påvirke opptil 1 av 1000 personer

- hudutslett, som kan danne blemmer, og ser ut som små målskiver (mørke sentrale flekker omgitt av et blekere område, med en mørk ring rundt kanten - erythema multiforme) hvis du merker noen av disse symptomene, kontakt lege umiddelbart.

Sjeldne bivirkninger som kan vises i blodprøvene dine:

- lavt antall celler involvert i blodkoagulasjon
- lavt antall hvite blodceller.

Frekvens ikke kjent

Frekvens kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data.

- Allergiske reaksjoner (se ovenfor)
- Betennelse i tykktarmen (se ovenfor)
- Betennelse i membranene som omgir hjernen og ryggmargen (aseptisk meningitt)

Alvorlige hudreaksjoner:

- et utbredt utslett med blemmer og avskalling av huden, spesielt rundt munnen, nesen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnson syndrom), og en mer alvorlig form, som forårsaker omfattende avskalling av huden (mer enn 30% av kroppsoverflaten - toksisk epidermal nekrolyse)
- utbredt rødt hudutslett med små pussfylte blemmer (bulløs eksfoliativ dermatitt)
- et rødt, skjellende utslett med knuter under huden og blemmer (eksantematøs pustulose).
- influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne kjertler og unormale blodprøveresultater (inkludert økte hvite blodlegemer (eosinofili) og leverenzzymer) (Legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).
- et rødt utslett som vanligvis sees på begge sider av baken, øvre indre lår, armhuler, nakke (Symmetrisk legemiddelrelatert intertriginøst og fleksuralt eksantem (SDRIFE)).

Kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av disse symptomene.

- utslett med blemmer arrangert i en sirkel med sentral skorpe eller som en perlesnor (lineær IgA-sykdom)
- betennelse i leveren (hepatitt)
- gulsott, forårsaket av økning i blodet av bilirubin (et stoff produsert i leveren) som kan gjøre huden din og det hvite i øynene gult
- betennelse i rørene i nyrene
- blodet tar lengre tid å koagulere
- hyperaktivitet
- kramper (hos personer som tar høye doser av Augmentin eller som har nyreproblemer)

- svart tunge som ser hårete ut.

Bivirkninger som kan vises i blod- eller urinprøver:

- alvorlig reduksjon i antall hvite blodlegemer
- lavt antall røde blodlegemer (hemolytisk anemi)
- krystaller i urinen som fører til akutt nyreskade.

Rapportering av bivirkninger

Hvis du får noen bivirkninger, snakk med legen din eller apoteket. Dette inkluderer eventuelle mulige bivirkninger som ikke er oppført i dette pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger

direkte via Yellow Card Scheme på:

www.mhra.gov.uk/yellowcard eller ved å søke etter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

Ved å rapportere bivirkninger effekter dette legemidlet. Hvordan oppbevare Augmentin
Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn.

5. Hvordan oppbevare Augmentin

- Oppbevar ikke over 25
- Ikke bruk denne medisinen etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken. Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i den måneden.
- Tabletter levert i poser bør brukes innen 30 dager etter at posen er åpnet. Oppbevar i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
- Bruk ikke hvis tablettene er skadet eller ødelagt.
- Kast ikke legemidler i avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør apoteket ditt hvordan du kaster legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene vil bidra til å beskytte miljøet.
- Innholdet i pakningen og annen informasjon
- Ikke kast medisiner i avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør apoteket ditt om hvordan du skal kaste medisiner du ikke lenger bruker. Disse tiltakene vil bidra til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og annen informasjon

Hva Augmentin inneholder

- De aktive stoffene er amoksisillin og klavulansyre. Hver tablett inneholder amoksisillintrihydrat tilsvarende 500 mg amoksisillin og kaliumklavulanat tilsvarende 125 mg klavulansyre.
- De andre ingrediensene er: Tablettkjerne - magnesiumstearat, natriumstivelsesglykolat type A, kolloidal vannfri silika, mikrokrySTALLINSK cellulose.
- Filmdrasjering - titandioksid (E171), hypromellose, makrogol (4000, 6000) og silikonolje (dimetikon).

Hvordan Augmentin ser ut og innholdet i pakken

Augmentin 625 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, ovale tabletter preget med "AC" og en delestrek på den ene siden.

De er pakket i:

- blisterpakninger, pakket i en eske. Hver pakke inneholder 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 eller 500 tabletter.

- blisterpakninger inne i en pose, pakket i en eske. Posen inneholder en tørkemiddelpose. Tørkemiddelet må holdes inne i posen og må ikke spises. Hver pakke inneholder 14, 20 eller 21 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Markedsføring Autorisasjon Innehaver og Produsent

Markedsføring Autorisasjon Innehaver:

Beecham Group plc, 79 New Oxford Street, London, WC1A 1DG, Storbritannia

Produsent:

Glaxo Wellcome Produksjon, Z.I. de la Peyenniere, 53100 Mayenne Cedex, Frankrike.

Andre formater

For å lytte til eller be om en kopi av dette pakningsvedlegget i blindeskrift, stor skrift eller lyd, vennligst ring gratis:

0800 198 5000 (kun Storbritannia)

Vennligst vær klar til å gi følgende informasjon:

Produktnavn Augmentin 625 mg Tabletter

Referansenummer 00038/0362

Dette er en tjeneste levert av Royal National Institute of Blind People.

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert i januar 2025.

Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK-gruppen av selskaper.

© 2025 GSK-gruppen av selskaper eller dets lisensgiver.

Råd/medisinsk utdanning

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier. De har ingen effekt mot infeksjoner forårsaket av virus.

Noen ganger reagerer ikke en infeksjon forårsaket av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligste årsakene til at dette skjer er fordi bakteriene som forårsaker infeksjonen er resistente mot antibiotikaen som tas. Dette betyr at de kan overleve og til og med formere seg til tross for antibiotikaen.

Bakterier kan bli resistente mot antibiotika av mange grunner. Å bruke antibiotika forsiktig kan bidra til å redusere sjansen for at bakterier blir resistente mot dem.

Når legen din foreskriver en antibiotikakur, er det ment å behandle kun din nåværende sykdom. Å følge rådene nedenfor vil bidra til å forhindre fremveksten av resistente bakterier som kan stoppe antibiotikaen fra å virke.

1. Det er veldig viktig at du tar antibiotikaen i riktig dose, til riktig tid og i riktig antall dager. Les instruksjonene på etiketten, og hvis du ikke forstår noe, spør legen din eller apoteket om å forklare.

2. Du bør ikke ta en antibiotika med mindre den er foreskrevet spesifikt for deg, og du bør kun bruke den til å behandle infeksjonen den ble foreskrevet for.
3. Du bør ikke ta antibiotika som er foreskrevet for andre personer, selv om de hadde en infeksjon som var lignende din.
4. Du bør ikke gi antibiotika som ble foreskrevet for deg til andre personer.
5. Hvis du har noe antibiotika igjen når du har tatt kuren som anvist av legen din, bør du ta resten til et apotek for riktig avhending.

Transtoyou