

Prospect: Informații pentru utilizator

Augmentin 625 mg Comprimat
co-amoxiclav (amoxicilină și acid clavulanic)

Citiți tot acest prospect cu atenție înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament v-a fost prescris numai dumneavoastră (sau copilului dumneavoastră). Nu-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă simptomele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt menționate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce conține acest prospect

1. Ce este Augmentin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Augmentin
3. Cum să luați Augmentin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Augmentin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Augmentin și pentru ce se utilizează

Augmentin este un antibiotic și acționează prin distrugerea bacteriilor care cauzează infecții. Conține două medicamente diferite numite amoxicilină și acid clavulanic. Amoxicilina aparține unui grup de medicamente numite „peniciline” care uneori poate fi oprit din funcționare (făcut inactiv). Celălalt component activ (acidul clavulanic) împiedică acest lucru să se întâmple.

Augmentin este utilizat la adulți și copii pentru a trata următoarele infecții:

- infecții ale urechii medii și sinusurilor
- infecții ale tractului respirator
- infecții ale tractului urinar
- infecții ale pielii și țesuturilor moi, inclusiv infecții dentare
- infecții ale oaselor și articulațiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Augmentin

Nu luați Augmentin:

- dacă sunteți alergic la amoxicilină, acid clavulanic, penicilină sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale acestui medicament (enumerat la secțiunea 6)
- dacă ați avut vreodată o reacție alergică severă la orice alt antibiotic. Aceasta poate include o erupție cutanată sau umflarea feței sau a gâtului.
- dacă ați avut vreodată probleme hepatice sau icter (îngălbenirea pielii) când ați luat un antibiotic.

Nu luați Augmentin dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Augmentin.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Augmentin dacă:

- aveți febră glandulară
- sunteți tratat pentru probleme hepatice sau renale
- nu urinați regulat.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Augmentin.

În unele cazuri, medicul dumneavoastră poate investiga tipul de bacterie care cauzează infecția dumneavoastră. În funcție de rezultate, vi se poate administra o concentrație diferită de Augmentin sau un alt medicament.

Condiții la care trebuie să fii atent

Augmentin poate agrava unele condiții existente sau poate provoca efecte secundare grave. Acestea includ reacții alergice, convulsii (crize) și inflamația intestinului gros. Trebuie să fii atent la anumite simptome în timp ce iei Augmentin, pentru a reduce riscul oricăror probleme. Vezi 'Condiții la care trebuie să fii atent' în Secțiunea 4.

Teste de sânge și urină

Dacă faci teste de sânge (cum ar fi teste de status al globulelor roșii sau teste de funcție hepatică) sau teste de urină (pentru glucoză), informează medicul sau asistenta că iei Augmentin. Acest lucru se datorează faptului că Augmentin poate afecta rezultatele acestor tipuri de teste.

Alte medicamente și Augmentin

Spune-i medicului sau farmacistului dacă folosești, ai folosit recent sau s-ar putea să folosești orice alte medicamente.

- Dacă iei alopurinol (utilizat pentru gută) cu Augmentin, este mai probabil să ai o reacție alergică a pielii.
- Dacă iei probenecid (utilizat pentru gută), medicul tău poate decide să ajusteze doza de Augmentin.
- Dacă medicamentele pentru a ajuta la oprirea cheagurilor de sânge (cum ar fi warfarina) sunt luate cu Augmentin atunci pot fi necesare teste de sânge suplimentare.
- Augmentin poate afecta modul în care funcționează metotrexatul (un medicament utilizat pentru a trata cancerul sau bolile reumatice).
- Augmentin poate afecta modul în care funcționează micofenolatul de mofetil (un medicament utilizat pentru a preveni respingerea organelor transplantate).

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă ești gravidă sau alăptezi, crezi că ai putea fi gravidă sau plănuiești să ai un copil, cere sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Augmentin poate avea efecte secundare și simptomele pot face să nu fiți apt pentru a conduce.

Nu conduceți sau nu folosiți utilaje decât dacă vă simțiți bine.

Augmentin conține sodiu

- Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic 'fără sodiu'.

3. Cum să luați Augmentin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Verificați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu greutatea de 40 kg și peste

Doza uzuală este:

- 1 comprimat de trei ori pe zi

Copii cu greutatea mai mică de 40 kg

Copiii cu vârsta de 6 ani sau mai puțin ar trebui tratați de preferință cu suspensie orală sau plicuri de Augmentin.

Întrebați medicul sau farmacistul pentru sfaturi când administrați comprimate de Augmentin copiilor cu greutatea mai mică de 40 kg. Comprimatele nu sunt potrivite pentru copiii cu greutatea mai mică de 25 kg.

Pacienți cu probleme renale și hepatice

- Dacă aveți probleme renale, doza ar putea fi modificată. O altă concentrație sau un alt medicament poate fi ales de medicul dumneavoastră.
- Dacă aveți probleme hepatice este posibil să aveți teste de sânge mai frecvente pentru a verifica cum funcționează ficatul dumneavoastră.

Cum să luați Augmentin

- Luați cu o masă.
- Înghițiți comprimatele întregi cu un pahar de apă.
- Comprimatele pot fi rupte de-a lungul liniei de marcare pentru a le face mai ușor de înghițit. Trebuie să luați ambele părți ale comprimatului în același timp.
- Spațiați dozele uniform pe parcursul zilei, la cel puțin 4 ore distanță. Nu luați 2 doze într-o oră.
- Nu luați Augmentin mai mult de 2 săptămâni. Dacă încă vă simțiți rău, ar trebui să mergeți înapoi la medic.

Dacă luați mai mult Augmentin decât ar trebui

Dacă aveți prea mult Augmentin, semnele pot include un stomac deranjat (senzație de greață, vărsături sau diaree) sau convulsii. Discutați cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Luați cutia sau flaconul de medicament pentru a-l arăta medicului.

Dacă uitați să luați Augmentin

- Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți.
- Nu ar trebui să luați următoarea doză prea curând, dar așteptați aproximativ 4 ore înainte de a lua următoarea doză. Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă opriți administrarea Augmentin

Continuați să luați Augmentin până când tratamentul este finalizat, chiar dacă vă simțiți mai bine. Aveți nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la combaterea infecției. Dacă unele bacterii supraviețuiesc ele pot cauza revenirea infecției.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre utilizarea acestui medicament, întrebați medicul sau farmacistul.

4. Posibile efecte secundare

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, deși nu toată lumea le manifestă. Reacțiile adverse de mai jos pot apărea cu acest medicament.

Condiții la care trebuie să fiți atent

Reacții alergice:

- erupție cutanată
- inflamația vaselor de sânge (vasculită) care poate fi vizibilă ca pete roșii sau purpurii ridicate pe piele, dar poate afecta și alte părți ale corpului
- febră, dureri articulare, glande umflate la nivelul gâtului, axilei sau inghinal
- umflare, uneori a feței sau a gâtului (angioedem), cauzând dificultăți de respirație
- colaps
- durere toracică în contextul reacțiilor alergice, care poate fi un simptom al infarctului cardiac declanșat de alergie (Kounis sindrom)

Contactați imediat un medic dacă aveți oricare dintre aceste simptome. Opriți administrarea Augmentin.

Inflamația intestinului gros

Inflamația intestinului gros, cauzând diaree apoasă diaree Sindromul de enterocolită indusă de medicamente (DIES)

Sindromul de enterocolită indusă de medicamente (DIES)

DIES a fost raportat în principal la copii care primesc amoxicilină/acid clavulanic. Este un anumit tip de reacție alergică cu simptomul principal de vărsături repetate (1-4 ore după administrarea medicamentului). Alte simptome ar putea include dureri abdominale, letargie, și tensiune arterială scăzută. și tensiune arterială scăzută.

Inflamație acută a pancreasului (pancreatită acută)

Dacă aveți dureri severe și persistente în zona stomacului, aceasta ar putea fi un semn de pancreatită acută.

Contactați medicul dumneavoastră cât mai curând posibil pentru sfaturi dacă aveți aceste simptome.

Efecte secundare foarte frecvente

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

- diaree (la adulți).

Efecte secundare frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane

- candidoză (candida - o infecție fungică a vaginului, gurii sau pliurilor pielii)
- greață, mai ales la administrarea de doze mari
- dacă sunteți afectat, luați Augmentin cu o masă
- vărsături
- diaree (la copii).

Efecte secundare mai puțin frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 100 de persoane

- erupție cutanată, mâncărime
- erupție cutanată cu mâncărime (urticarie)
- indigestie
- amețeală
- dureri de cap.

Efecte secundare mai puțin frecvente care pot apărea în analizele de sânge:

- creșterea unor substanțe (enzime) produse de ficat.

Efecte secundare rare

Acestea pot afecta până la 1 din 1000 de persoane

- erupție cutanată, care poate forma vezicule și arată ca niște ținte mici (pete întunecate centrale înconjurată de o zonă mai palidă, cu un inel întunecat la margine - eritem multiform)
dacă observați oricare dintre aceste simptome, contactați urgent un medic.

Efecte secundare rare care pot apărea în analizele de sânge:

- număr scăzut de celule implicate în coagularea sângelui
- număr scăzut de globule albe.

Frecvență necunoscută

Frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

- Reacții alergice (vezi mai sus)
- Inflamația intestinului gros (vezi mai sus)
- Inflamația membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării (meningită aseptică)

Reacții cutanate grave:

- o erupție cutanată extinsă cu vezicule și descuamare a pielii, în special în jurul gurii, nasului, ochilor și organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson), și o formă mai severă, care cauzează descuamarea extinsă a pielii (mai mult de 30% din suprafața corpului - necroliză epidermică toxică)
- erupție cutanată roșie extinsă cu vezicule mici care conțin puroi (dermatită exfoliativă buloasă)
- o erupție roșie, solzoasă cu umflături sub piele și vezicule (exantematosis pustuloasă).
- simptome asemănătoare gripei cu erupție cutanată, febră, ganglioni umflați și rezultate anormale ale testelor de sânge (inclusiv creșterea numărului de globule albe (eozinofilie) și enzime hepatice) (Reacție la Medicament cu Eozinofilie și Simptome Sistemice (DRESS)).

- o erupție roșie frecvent întâlnită pe ambele părți ale feselor, coapselor superioare interioare, axilelor, gâtului (Exantemă Intertriginoasă și Flexurală Simetrică Indusă de Medicament (SDRIFE)).

Contactați imediat un medic dacă aveți oricare dintre aceste simptome.

- erupție cu vezicule aranjate în cerc cu crustă centrală sau ca un șir de perle (boala IgA liniară)
- inflamația ficatului (hepatită)
- icter, cauzat de creșterea bilirubinei în sânge (o substanță produsă în ficat) care poate face ca pielea și albul ochilor să pară galbene
- inflamația tuburilor din rinichi
- sângele se coagulează mai greu
- hiperactivitate
- convulsii (la persoanele care iau doze mari de Augmentin sau care au probleme renale)
- limbă neagră care arată păroasă.

Efecte secundare care pot apărea în testele de sânge sau urină:

- reducere severă a numărului de globule albe
- număr scăzut de globule roșii (hemolitic anemie)
- cristale în urină care duc la leziuni renale acute.

Raportarea efectelor secundare

Dacă aveți orice efecte secundare, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. Acest lucru include orice

posibile efecte secundare care nu sunt listate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta efectele secundare

direct prin intermediul schemei Yellow Card la:

www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutând MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.

Raportând efectele secundare efecte acestui medicament. Cum să păstrați Augmentin acest medicament.

5. Cum să depozitați Augmentin
 - Nu depozitați la temperaturi de peste 25
 - Nu utilizați acest medicament după data de expirare (EXP) care este indicată pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a acelei luni.
 - Nu depozitați la temperaturi de peste 25 Păstrați în ambalajul original pentru a proteja de umiditate.
 - Nu utilizați dacă comprimatele sunt ciobite sau deteriorate.
 - Nu aruncați niciun medicament prin apă uzată sau deșeuri menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului
 - Conținutul ambalajului și alte informații
 - Nu aruncați medicamentele prin apele uzate sau deșeurile menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele pe care nu le mai utilizați. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul pachetului și alte informații

Ce conține Augmentin

- Substanțele active sunt amoxicilina și acidul clavulanic. Fiecare comprimat conține amoxicilină trihidrat echivalentă cu 500 mg amoxicilină și clavulanat de potasiu echivalent cu 125 mg de acid clavulanic.
- Celelalte ingrediente sunt: Miezul comprimatului - stearat de magneziu, glicolat de amidon de sodiu tip A, silice coloidală anhidră, celuloză microcristalină.
- Film de acoperire - dioxid de titan (E171), hipromeloză, macrogol (4000, 6000) și ulei de silicon (dimeticonă).

Cum arată Augmentin și conținutul ambalajului

Comprimatele filmate Augmentin 625 mg sunt albe până la aproape albe, de formă ovală, imprimate cu „AC” și o linie de rupere pe o parte.

Sunt ambalate în:

- blistere, închise într-o cutie. Fiecare pachet conține 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 sau 500 de comprimate.
- blistere într-un plic, închise într-o cutie. Plicul conține un săculeț desicant. Desicantul trebuie păstrat în plic și nu trebuie consumat. Fiecare pachet conține 14, 20 sau 21 de comprimate.

Nu toate dimensiunile de pachete pot fi comercializate.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și Producătorul

Deținătorul Autorizației Deținător:

Beecham Group plc, 79 New Oxford Street, Londra, WC1A 1DG, Regatul Unit

Producător:

Glaxo Wellcome Producție, Z.I. de la Peyrenniere, 53100 Mayenne Cedex, Franța.

Alte formate

Pentru a asculta sau a solicita o copie a acestui prospect în Braille, tipărire mare sau audio, vă rugăm să sunați gratuit la:

0800 198 5000 (doar în Marea Britanie)

Vă rugăm să fiți pregătit să oferiți următoarele informații:

Numele produsului Augmentin 625 mg Comprimate

Număr de referință 00038/0362

Acesta este un serviciu oferit de Institutul Național Regal pentru Persoane Nevăzătoare.

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în ianuarie 2025.

Mărci comerciale sunt deținute de sau licențiate către grupul de companii GSK.

© 2025 grupul de companii GSK sau licențiatorul său.

Consiliere/educație medicală

Antibioticele sunt utilizate pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii. Ele nu au efect împotriva infecțiilor cauzate de viruși.

Uneori, o infecție cauzată de bacterii nu răspunde la un tratament cu un antibiotic. Unul dintre cele mai comune motive pentru care acest lucru se întâmplă este că bacteriile care cauzează infecția sunt rezistente la antibioticul care este administrat. Acest lucru înseamnă că ele pot supraviețui și chiar se pot înmulți în ciuda antibioticului.

Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din multe motive. Utilizarea atentă a antibioticelor poate ajuta la reducerea șansei ca bacteriile să devină rezistente la ele.

Când medicul dumneavoastră prescrie un tratament cu un antibiotic, acesta este destinat să trateze doar boala dumneavoastră actuală. Acordarea atenției la următoarele sfaturi va ajuta la prevenirea apariției bacteriilor rezistente care ar putea împiedica funcționarea antibioticului.

1. Este foarte important să luați antibioticul la doza corectă, la momentele potrivite și pentru numărul corect de zile. Citiți instrucțiunile de pe etichetă și dacă nu înțelegeți ceva, cereți medicului sau farmacistului să vă explice.
2. Nu ar trebui să luați un antibiotic decât dacă a fost prescris special pentru dumneavoastră și ar trebui să-l utilizați doar pentru a trata infecția pentru care a fost prescris.
3. Nu ar trebui să luați antibiotice care au fost prescrise pentru alte persoane chiar dacă au avut o infecție care era similară cu a dumneavoastră.
4. Nu ar trebui să dați antibioticele care v-au fost prescrise altor persoane.
5. Dacă vă rămâne vreun antibiotic după ce ați urmat tratamentul așa cum v-a indicat medicul, ar trebui să duceți restul la o farmacie pentru eliminare corespunzătoare.