

Prospect: informații pentru pacient

Campral, comprimate gastrorezistente 333 mg
acamprosat

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a lua acest medicament, deoarece conține informații importante

informații pentru dumneavoastră. Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.

- Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect?
- Aveți vreuna dintre reacțiile adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? medicul dumneavoastră sau farmacistul dumneavoastră..

prospectului de la acest prospect:

1. Ce este Campral și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să luați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se administrează acest medicament?
4. Posibile efecte secundare.
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Campral și pentru ce se utilizează acest medicament?

Campral este un medicament din grupa medicamentelor utilizate în dependența de alcool. Campral reduce pofta de alcool.

Campral este prescris în tratamentul alcoolismului cronic și servește ca suport pentru consilierea psiho-socială pentru a preveni recidiva consumului de alcool. Tratamentul cu Campral este început imediat după cura de dezintoxicare.

2. Când nu trebuie să luați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

În caz de probleme renale severe..

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

În timpul perioadei de dezintoxicare fizică. Nu are sens să

În timpul perioadei de sevraj fizic. Nu are rost să Campral în această perioadă, deoarece nu va avea efect. –

La copii sau vârstnici.

În caz de probleme renale: la pacienții cu probleme renale moderate poate fi necesară ajustarea dozei.

În caz de probleme hepatice severe probleme hepatice

La pacienții cu dependență de alcool pot apărea simptome de depresie și gânduri suicidare. În cazul apariției acestor simptome, contactați imediat medicul dumneavoastră. Membrii familiei și rudele trebuie să solicite imediat sfatul medical în cazul apariției acestor simptome.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente.

Luați pe lângă

Campral și alte medicamente în, spuneți medicului recent făcut sau există posibilitatea să luați alte medicamente în viitorul apropiat? Spuneți-i medicului sau farmacistului dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe care le puteți obține fără rețetă.

La ce trebuie să fiți atenți cu mâncarea, băuturile și alcoolul?

Alimentele influențează cantitatea de acamprosaat care este absorbită în organism. Totuși, Campral trebuie luat în timpul mesei deoarece este mai bine tolerat.

Utilizarea simultană a Campral și alcool nu are ca rezultat interacțiuni.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Efectul Campral asupra sarcinii nu este cunoscut. De aceea, Campral trebuie utilizat în timpul sarcinii doar după o evaluare atentă a beneficiilor și riscurilor.

Efectul Campral asupra alăptării nu este cunoscut, de aceea Campral nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Până în prezent, nu au fost observate efecte nocive în studiile pe animale. Nu se știe dacă Campral are efect asupra fertilității la oameni.

Campral conține propilenglicol

Acest medicament conține 4,2 mg de propilenglicol per tabletă.

Campral conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per tabletă, ceea ce înseamnă că este, în esență, 'fără sodiu'.

3. Cum se administrează acest medicament?

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie doza. Urmați cu strictețe sfatul medicului dumneavoastră când luați Campral. Consultați medicul sau farmacistul în caz de îndoială. Doza obișnuită este:

Pentru adulții cu greutatea de până la 60 kg, doza este de 4 tablete de Campral pe zi. Luați tabletele în timpul mesei, după cum urmează:
2 tablete dimineața, 1 tabletă la prânz și 1 tabletă seara.

Pentru adulții cu greutatea de peste 60 kg, doza este de 6 tablete pe zi. Luați tabletele în timpul mesei, după cum urmează:
2 tablete dimineața, 2 tablete la prânz și 2 tablete seara.

La pacienții cu probleme renale moderate, poate fi necesară ajustarea dozei. Doza inițială este următoarea:

1 tabletă dimineața, 1 tabletă la prânz și 1 tabletă seara (în timpul mesei).

Discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Nu mestecați.

Dacă observați că Campral este prea puternic sau prea slab, consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Durata recomandată a tratamentului este de 1 an. Tratamentul cu Campral trebuie început cât mai curând posibil după perioada de sevraj. Dacă totuși consumați alcool pe termen scurt, continuați să luați Campral.

Ați luat prea mult din acest medicament?

Dacă ați luat prea mult Campral, contactați imediat medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Diareea poate indica o supradoză.

Ați uitat să luați acest medicament?

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată, ci luați următoarea doză la ora obișnuită.

Dacă încetați să luați acest medicament

Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră dacă intenționați să opriți utilizarea Campral.

4. Posibile reacții adverse

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează. Reacții adverse pot:

- apărarea foarte frecvent (la mai mult de 1 din 10 pacienți);
- apărarea frecvent (la mai mult de 1 din 100, dar la mai puțin de 1 din 10 pacienți);
- apărarea uneori (la mai mult de 1 din 1.000, dar la mai puțin de 1 din 100 pacienți);
- apărarea rar (la mai mult de 1 din 10.000, dar la mai puțin de 1 din 1.000 pacienți);
- foarte rar apar (la mai puțin de 1 din 10.000 de pacienți).

Următoarele reacții adverse apar foarte frecvent:

Diaree

Următoarele reacții adverse apar frecvent:

Durere abdominală, greață, vărsături, flatulență, mâncărime, erupție cutanată cu pete și umflături (erupție maculopapulară), insensibilitate sexuală (frigiditate) sau impotență, scăderea dorinței sexuale (libido)

Următoarele reacții adverse apar uneori:

Creșterea dorinței sexuale (libido)

Foarte rar apar:

Reacții de hipersensibilitate, inclusiv erupție cutanată cu mâncărime intensă și formare de umflături (urticarie), acumulare bruscă de lichid în piele și mucoase (de exemplu, gât sau limbă), dificultăți de respirație și/sau mâncărime și erupție cutanată, adesea ca reacție alergică (angioedem) sau scădere bruscă a tensiunii arteriale, paloare, neliniște, puls rapid și slab, piele umedă, conștiență redusă din cauza unei dilatări vasculare bruște ca urmare a unei hipersensibilități severe la anumite substanțe (reacții anafilactice).

Dacă una dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să vă adresați medicului sau farmacistului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul Centrului Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb, site web: www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister după „EXP”.

Aceasta include o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele pe calea apei sau a deșeurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este acamprosat.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt crosprovidonă, celuloză microcristalină, silicat de magneziu, glicolat de amidon de sodiu, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, rășină de poliacrilat, talc și propilenglicol.

Cum arată Campral și ce conține un ambalaj?

Campral este un comprimat acoperit, rezistent la sucul gastric. Comprimatele sunt albe și rotunde și sunt ambalate în cutii cu 7 blistere (PVC/PVDC Aluminiu) a câte 12 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață
Merck BV
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk

Producător
Merck Santé s.a.s.
Semoy 45400
Franța

Înregistrat în registru sub: RVG 18220

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în februarie 2021

Transtoyou